

CATALOGUS  
STIRPIUM

I N

*Exteris Regionibus*

A nobis Observatarum,


Quæ vel non omnino vel parcè admodum

I N

A N G L I A

Sponte proveniunt.

---



---

L O N D I N I :

Anno Domini M<sup>o</sup>CCXXXVIII.



STIRPUM  
CATALOGUS


Exteris Regionibus

Quae vel non omnino vel parce admodum  
A nobis Observantur

IN

ANGLIA

Sponte proveniunt



LONDINI

Anno Domini MDCCLXXVII



## P R Æ F A T I O.

**Q**UO plus minus abhinc annis plantarum indagandarum studio in transmarinas regiones profectus Germaniæ utriusque, Italiæ, Galliæ bonam partem peragravi. Cujus itineris quis fructus fuerit, quem nunc exhibeo Stirpium exoticarum Catalogus, Amice Lector, te certiore faciet. An tibi titulos & nomina nuda perlegere jucundum futurum sit nescio; mihi certe Plantas ipsas liberas & spontis suæ quales eas alma tellus è benigno suo sinu effundit, contemplanti incredibilis quedam voluptas oborta est: nec minus gaudebam (ut cum Clusio loquar) nova aliqua stirpe primum inventa quàm si amplissimum thesaurum offendissem: Cumq; plurimas quotidie vel mihi antea incognitas, vel Britannicæ nostræ hospites obvias haberem, magnum me operæ pretium perigrinando fecisse ratus, in Hispaniam quoque profectiorem meditabar: verùm prætextu belli, Anglis omnibus publico programme Regis Galliæ è finibus suis excedere iussis, Hispanicum iter minus tutum fore ratus, in patriam reversus sum. Liceat jam mihi pauca quedam de Plantis in genere à me observata Præfationis loco Catalogo præmittere.

I. Quo ad meridiem & Solis cursum propius accedas cò plures plantarum species sponte oriri animadvertes.



madvertes. Quamvis enim Regionēs frigide & Septentrionales suas quoque stirpes peculiāres obtineant, paucissimæ tamen eæ sunt si cum earum multitudine conferantur quæ in temperatis & calidioribus tantum proveniunt. Cui accedit quod juga, vertices aut etiam latera montium in Regionibus calidis, cum frigidiorum depressis, planis & sylvestris aeris temperamento quodammodo conveniant, quo fit ut easdem fere stirpes producant, adeoque, ne plantæ quidem Septentrionales Meridionalibus defint.

II. Huc etiam facit quod secundo in loco à nobis observatum fuit: Montes scilicet excelsos quorum vertices maximam anni partem nivibus operiuntur varietate specierum præcipue abundare. Alpes certè quæ Italiam à Gallia & Germania dividunt inexhausto plantarum penu Botanicorum scrutiniis in hunc usque diem sufficiunt, magna adhuc nondum proditarum residua multitudine. Quod tanta soli fertilitas dicam an luxuria nivibus debeat extra controversiam est, seu quia velut veste imposita radices foveat & ab injuriis cæli & frigoris vehementiā defendat, sive quod sale nitroso, quo abundare creditur, terram letificet & fecundet.

III. Arborea nonnullæ in aliis regionibus humiles perpetuè & pusillæ fruticum mensuram non excedunt; in aliis eximiam magnitudinem & staturam assequuntur, cum utrobique spontis suæ sint. Hujusmodi sunt Lentiscus, Arbutus, Juniperus, Buxus, &c. Præterea sunt quæ apud nos satæ & in hortis cultæ teneræ & molles perpetuè manent, adeo ut ad herbarum genus pertinere videantur; quæ tamen ubi sponte exeunt in frutices satis crassos & lignosos adolescunt, quod in Ricino & Tragio observavimus.

IV. Ejus-



IV. Ejusdem generis arbores aut etiam herbae in aliis Regionibus vel succos fundunt, vel fructus spurios edunt, in aliis minimè. Sic Fraxinus v. g. in Calabria Manna exudat, cum alibi nè in Italia quidem id faciat. Lentiscus in sola insula Chio Mastichen fundit, ut Bellonius & Hermolaus affirmant: certè in Italia & Gallia Narbonensi, ubi tamen copiosissima est, vel nullam vel paucissimam præbet. Idem observatur in Ferula, Panace Heracleo, Aloe aliisque. Quod ad fructus spurios attinet, Quercus in Italia, Illyrico, Hispania aliisque; temperatioribus Gallas edit, cum in Britannia & frigidioribus nullus unquam auditus sit Gallarum proventus.

Difficilis quæstio est, an Plantæ quæpiam nullo semine prævio sponte è terra oriantur: (1.) Quod ad imperfectas vulgò dictas, Fungos, Tubera & id genus attinet, manifestum est eas ex semine non nasci cum nullum gignant. (2.) Ob eandem rationem submarinæ omnes Algæ, Fuci, Coralia, Alcyonia, &c. sponte oriri censendæ sunt, cum nullum in iis semen hætenus animadversum fuerit; quod tamen imprimis mirum videtur, cum earum innumeræ ferè species & ingens ubique proventus sit. (3.) Perfectiores quoque quamvis plerumque; Semini ortum debeant, nonnunquam tamen spontis suæ esse magnum nobis argumentum suppeditat viscus arboribus innatus, etiam in prona seu aversa ramorum parte. Unde omnino fabulosum esse constat quod de ejus ortu Veteres prodiderunt, quodque Proverbio illi, Turdus malum ipse sibi cacat, originem dedisse perhibetur.

Nec minùs anceps & difficilis quæstio est, An Plantæ aliquæ degenerent & speciem mutant? Cui

ut aliqua in parte satisfaciam, dico primò, pro diversis speciebus minimè habendas esse quæcunque ex ejusdem plantæ semine vulgò oriuntur, quæque speciem suam iterum non propagant, quantumvis accidentibus nonnullis, v. g. floris colore, petalorum gemina aut multiplici serie, aliisve accidentibus à nobis in Præfatione Catalogi Plantarum Angliæ recensitis differant. Cùm enim numerus specierum in natura certus sit & determinatus, floris autem colore, multiplicitate, &c. variantium multitudo novis quotannis exorientibus infinita, meritò eas à specierum gradu & dignitate removemus. Nam si hæc sufficerent ad specificam distinctionem inducendam, certè Æthiops quoq; ab Europæo, Juvenus niger ab albo, rubro variòve specie differret; quod nemo, ut opinor, sanæ mentis unquam concesserit. Hinc Tuliparum, Anemonarum, Caryophyllorum, Auricularum, &c. inexplicabilis varietas ad tres quatuorve species facilè reducitur, cùm reliqua diversitas quæ in floris colore, plenitudine, geminatione, &c. consistit, merè accidentalis sit minimèque specifica, cæli aut soli, alimentive differentis imputanda. Quid quod Plantæ hæ in eodem loco (ut alibi monuimus) diutiùs relictæ & neglectæ paulatim degenerent, florum gratiâ, seu quæ in colorum pulchritudine, seu quæ in petalorum numero spectatur, pereunte, & ad sylvestrium tandem formam & ingenium redeant.

Ob easdem rationes nec figura, color sapòrve fructus seu pericarpium in Pomis & Pyris essentialem & specificam differentiam arguunt. Quòd scilicet fructus his accidentibus diversi ex eodem semine oriantur, quòdque constanti naturæ lege speciem suam semine iterum non propagent. Alque hinc obiter monere convenit, varietates seu species novas vulgò creditas Pomorum & Pyrorum ab insitione  
(quantumvis



PRÆFATIO.

(quantumvis magna cum fiducia id affirmant arcanorum jactatares) frustra sperari, cum, Fructum perpetuò surculi naturam sequi, mihi pro certo & infallibili in Horticultura axioma semper fuerit, verum quas habemus differentias semini deberi & ex semine novas indies obtineri posse. Quod adeò verum est, ut varietates etiam in floribus, foliis, caulibus superius memoratas (quamvis vel translatione iterata de loco in locum, vel irrigando aquâ colore aliquo imbuta nonnunquam effici posse, Lauremburgio, in iis quæ ipse expertus est, Authori αἰωνίῳ aliisq; affirmantibus fidem non denegaverim) frequentius tamen faciliusque ex semine in terram pinguem & opulentam aut alio quovis modo à naturali & solita diversam projecto oriri minimè dubium sit. Quantam autem vim & efficaciam habeat ad hæc effecta producenda alimentorum diversitas in domesticis & mansuetis animalibus patet. Cum enim fera in plerisq; speciebus eisdem colores servent in universum omnia, mansueta & domestica coloribus infinitum variant, nec coloribus tantum sed & carnis sapore aliisq; accidentibus. Cæli soliq; diversitas quid in hoc genere possit pluribus exemplis facile esset demonstrare. Hinc in Septentrionalibus frigidis & montibus altissimis maximam anni partem nivibus obtectis Ursi, Vulpes, Lepores, Perdices, Corvi albi non pauci reperiuntur, quæ in temperatioribus rarissimè occurrunt & pro monstris ferè habentur. Hinc in Anglia nostra boves Lancastrenses v. g. mirum quantum à Suffexianis cornuum pulchritudine totâq; specie externâ, à Wallicis & Scoticis magnitudine differant. Idem est & de ovibus, quæ in montosis & sterilibus adeò parum magnitudine proficiunt ut pro quinque solidis singulæ veneant; in pinguibus verò & temperatis in eam molem excrescunt, ut



duas etiam libras nostræ monetæ valeant. Quòd si animalia isthæc mutuo transferas, Septentrionalia sci. aut montosa in locum Meridionalium campesiumve, & vice versa, prosapiam suam non diu retinent, verum paulatim degenerant & ad indigenarum mensuram & indolem accedunt.

Dico secundò, Dari interdum in plantis veram specierum transmutationem omnino concedendum esse, ni testibus auctoritatibus & gravibus imprimis scriptoribus omnem fidem derogare velimus. Nam Wormius Musei lib. 2. cap. 7. pag. 150. asserit se habere bordeum quod Hermaphroditicum vocat, quia in una spica & bordeum & secale continet, cujus descriptionem videsis loco citato. Johnsonus quoque apud Gerardum lib. 1. cap. 46. pag. 65. sibi ostensum refert à D. Goodyer spicam Tritici albi, circa cujus mediam partem tria aut quatuor grana avenacea undiq; perfecta enata sunt. Et biennio abhinc affirmavit mihi, cùm Oxonii essem, Jacobus Bobertus filius, è semine Primulæ veris majoris sibi exortas primulam vulgarem, & Primulam pratensem inodoram luteam. Observandum autem est, transmutationem hanc dari tantum inter species cognatas & ejusdem generis participes.





# A



Bies fœmina, five 'Ελάτη θήλεια *J. B.* Abies *Park.* Abies & Abies mas *Ger.* Nos enim has non distinguimus, quamvis *C. Baubinus* quoq; *Bellonium* & *Dodonæum* secutus præter Piceam duas faciat Abietis species, nimirum I, i. e. conis sursum spectantibus, five marem, & II, i. e. albam five fœminam. Hac de re fusiùs differentem vide *J. Baubinum* qui nec *Bellonium* nec *Dodonæum* Abietem distinctè novisse demonstrat.. *The Female Fir-Tree.* In Sueviæ & Baviaræ sylvis primùm observavimus, postea in Alpibus copiosè. Quæ de Abiete annotavimus vide in *Cat. Ang.*

† Abies mas *Theophr.* Picea Latinorum, five Abies mas *Theophrasti J. B.* Picea *Park.* Picea major *Ger.* P. major I, five Abies rubra *C. B.* Hæc est quam vulgò in Anglia *The Fir-tree* vocant, inque hortis & areis colunt. Cum priore, sed copiosius multò.

Abrotanum fœmina vulgare *Park.* fœm. foliis teretibus *C. B.* Chamæcyparissus *J. B.* *Ger.* Common Lavender Cotton. Circa oppidum *S. Cyriaci* in Etruria copiosè, atq; indè incipiendo ad Statum usq; Ecclesiasticum seu territorium Papæ secus vias.

N. Ventris lumbricos sumptum interimit, quotidiano experimento muliercularum, tum semen, tum etiam herba. Folia sicca ad sistenda alba fœminarum profluvia conferre scribit *Matthiolus.*

Abrotanum fœmina villosis & incanis foliis *C. B.* Seriphium *Dioscoridis* Abrotani fœm. facie *Ad. Lob.* In Gallo-provincia, montis celsi *D. Magdalena* cryptâ celebris acclivibus *Lobelio* & nobis observatum. Fragrantius mihi visum est vulgari Abrotano fœm. alioquin ei persimile.

Abrotanum fœmina foliis Ericæ *C. B.* *Park.* Chamæcyparissus unguentaria *J. B.* In collibus saxosis circa molendina *Nemausi.*

† Abrotanum inodorum *Lob.* campestre *C. B.* *Ger.* *Park.* Artemisia tenuifolia five leptophyllos, aliis Abrotanum sylvestre *J. B.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi ad vias & in sterilioribus ubiq; ferè. Hanc speciem & in Anglia nuper observavimus, v. *Cat. Ang.*

Abinthium arborescens *Lob. Park.* arborescens *Lobelii J. B.* Abrotanum fœm. arborescens *Ger.* Abr. latifolium arborescens



tens *C. B. Italis & Siculis Herba bianca. Tree-Worm-wood.* In Sicilia, Regno Neapolitano, & insularum adjacentium rupibus maritimis.

*Absinthium Ponticum & Romanum* quibusdam *J. B. Ait Cæsalpinus* in collibus argillofis agro Senensi frequens esse: quod & nos verum comperimus cum Florentiâ Romanam iremus.

*Absinthium Seriphium Narbonense Park. Seriph. tenuifolium maritimum Narbon. J. B. Seriph. Gallicum C. B. Propæ Portum Liburnum* in Italia atque etiam juxta Monspelium ad maris litus & alibi.

*Absinthium tenuifolium Austriacum Ger. Park. Austr. tenuifolium J. B. Ponticum tenuifolium Austriacum C. B.* Ad vias non longè à Vienna Austriæ quâ ad Neapolin Austriacam itur. De Absinthii facultatibus consule *Cat. Ang.*

*Acacia altera trifolia Ger. II, sive trifolia C. B. secunda, seu altera Dioscoridis Park. altera Dioscoridis notior Europæa, folio Cytisi, facie & siliquis Genistæ-sparti spinosi Lob. Aspalathus secunda trifolia, quæ Acacia secunda Matthiolo trifolia J. B.* In Sicilia propæ Messanam; Italia circa Neapolin, & Gallo-provincia circa Tolonam portum.

*Acanthus sativus Lob. Ger. Park. sativus vel mollis Virgilii C. B. Carduus Acanthus, sive Branca ursina J. B. Brankursine, or Bear's-breech.* In Italiæ meridionalibus circa Baias & Neapolin, itémque in Sicilia copiosè.

N. Est è 5 herbis emollientibus. Usus potissimum externus est in clysteribus aliisq; paregoricis quarumcunque formularum & ut plurimum in cataplasmatibus. *Schrod.* Prodest etiam, auctore Dodonæo, tabidis, sanguinem spuentibus, ex alto delapsis, ictu aliquo aut conatu supra vires læsis, non minus quàm Symphyti majoris radices, quas substantiâ, lento succo, & qualitate proximè refert.

2. Acanthi folia ob figuræ venustatem & elegantiam veteres Architecti columnarum capitulis inculpere solebant. Frondibus Acanthi (inquit Vitruvius, lib. 4. cap. 1.) Columnas Corinthiacas coronabant.

*Acanthium Illyricum Park. Illyric. purpureum Ger. Spina tomentosa altera spinosior C. B. Carduus* quibusdam dictus *Acanthium Illyricum, aliis verò Onopordon J. B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi frequens occurrit.

*Acarna flore purpureo rubente patulo C. B. Park. Acanthoides parva Apula Col.* In Sicilia propæ Messanam, Italia propæ Florentiam, & Gallia Narbonensi propæ Monspelium, in arenosis.

*Acarna major caule folioso C. B. Park. Acarnæ similis flore purpureo, Chamaeleon Salmanticensis Clusio J. B.* Propæ montem



montem S. Lupi non longè ab oppidulo S. *Lupian* dicto, itémque juxta vias non longè ab oppidulo *Vic* in valle Frontigniana.

*Acer acutioribus foliis Gesn. hont. III.* five montanum tenuissimis & acutis foliis *C. B.* *Aceris* majoris varietas altera *J. B.* In montibus Stiriae & in Alpibus Sabaudicis propè Genevam.

† *Acer majus Ger. emac. ma. latifolium, Sycomorus* falsò dictum *Park. maj.* multis falsò *Platanus J. B. I.* seu montanum candidum *C. B. The Sycamore-tree, or greater Maple.* In montibus propè Genevam.

*Acer majus folio rotundiore minúsque laciniato. An Acer II, i. e. montanum flavum five crispum C. B?* Observavimus primò in Hetruriae sylvis non longè à Viterbo, postea etiam in montibus Genevæ vicinis.

*Acer trifolium C. B. Creticum trifolium Park. Monspeulanum Lugd. J. B.* In sylva Valena propè montem S. Lupi; itémque in collibus juxta, *Castelneuf* pagum Monspelio propinquum. Invenimus etiam propè Gratianopolin, in rupibus juxta pontem quem transimus eundo à la fontaine que brusle.

N. Radix, prodente Plinio, contusa è vino jecinoris doloribus utilissimè imponitur.

*Acetosa montana maxima v. Oxalis maxima.*

*Acetosa Ocymi facie Neapolitana C. B. Neapolitana Ocymi folio Park. Ocymi facie Neapolitana βυκεφάνηρος Col.* In Sicilia & Regno Neapolitano, in Vineis & arenosis frequentissima.

*Achillea v. Millefolium.*

*Acini pulchra species J. B. Clinopodium IV, five montanum C. B. Austriacum Clus. Park.* In ascensu montis Juræ variis in locis. *Stone Basil.*

*Aconitum lycoctonum Napello simile Neubergense, foliis latioribus, flore purpureo J. B. An Aconitum Napello simile sed minus, cæruleum, præcocius ejusdem?* Hanc plantam in sepibus non longè à Memminga Sueviæ urbe observavimus.

*Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente J. B. II, five lycoctonum luteum C. B. lut. Ponticum serotinum Park. luteum Ponticum Ger. Yellow Wolf-bane.* In colle *La Bastie*, aliisque montibus Genevæ vicinis copiosè.

N. Facultate est hominibus aliisque animalibus exitiali & perniciosa. Semen ejus aut radix in pulverem redacta, & oleo temperata ut unguentum indè fiat, illitu pediculos ac furfures enecat & abstergit. *Trag.*

## CATALOGUS STIRPIUM

*Aconitum hyemale* Ger. *Park.* hyem. *Belgarum Lob.* I, five unifolium luteum bulbosum C. B. *Ranunculus* cum flore in medio folio, radice tuberosâ J. B. *Anemone Bononiensis* nonnullis dicitur, quoniam circa Bononiam & per totam etiam Lombardiam copiosissimè provenit, mensis Februarii initio florens.

*Aconitum pardalianches* v. Thora.

*Aconitum racemosum* v. Christophoriana.

† *Adiantum ἀνεβριχον* five furcatum *Thal.* *Filix saxatilis Tragi.* J. B. *Park.* saxat. V, five corniculata C. B. In rupium fissuris propè Rhenum Fl. invenimus etiam in Italia. Tho. Willifellus nuper in Scotia. v. *Cat. Ang.*

*Adiantum* five *Capillus Veneris* J. B. verum, five *Capillus Veneris* verus *Park.* I, seu foliis *Coriandri* C. B. *Capillus Veneris* verus Ger. *Black Maiden-bair.* In humidis & umbrosis rupibus & puteis, in Gallia Narbonensi & Italia vulgare.

N. Pulmonum renūmq; vitiis medetur; hepatis & lienis obstructions referat; Urinam & menses ciet. *Schrod.* Verum de ejus virtutibus & usu integrum libellum scripsit Gallicè Petrus Formius M. D. *Montspeliensis.*

*Ægilops Narbonensis Lob.* *Festuca* five *Æg.* *Narbonensis Park.* *Festuca Italica* Ger. *Gramen Festucae* XIV, five *Festuca altera capitulis duris* C. B. In Sicilia, Italia, & Gallia Narbonensi vulgarissima.

*Ageratum purpureum Dalechampii* J. B. *purpureum Park.* *ferratum Alpinum* C. B. In rupibus ad radices montis Salevæ & in ascensu montis Juræ propè Genevam; Utrobique copiosè.

*Ageratum Septentrionalium Lob.* vulgare, five *Costus hortorum minor* *Park.* foliis ferratis C. B. *Ager* plerisq; *Herba Julia* quibusdam J. B. *Balsamita foemina* five *Ageratum* Ger. *Maudlin Tanj.* In Etruria circa *Liburnum*, *Florentiam*, &c. itēmq; circa *Montspelum* in Gallia Narbonensi abundè. *Trago* & *Matth.* *Eupatorium Mesuae* dicitur.

N. 1. Substantiæ tenuis est, saporis aromatici, attenuat, extergit, putredini resistit; Hepaticum est, laxat alvum quā blandissimè. Extrinsecus ciet urinam, uterūmq; emollit (suffitu) *Schrod.*

2. E foliis hujus & *Ophioglossi* contusis inque oleo olivarum bullitis, addito ceræ, resinæ siccae & *Terebinthinæ* tantillo, unguentum five emplastrum efficitur sarcoticum præstantissimum, Gerardo sæpius probatum.

*Agnus castus* *Offic.* *Ag.* folio non ferrato J. B. *Vitex* foliis angustioribus *Cannabis* modo dispositis C. B. *Vitex* five *Agnus*



Agnus castus Ger. Vitex five Agnus castus folio angusto Park. The Chaste Tree. In Sicilia & Regno Neapolitano satis frequens. Agnum castum Officinæ ineptè appellant, non advertentes castum nihil aliud esse quàm expositionem Agni.

N. 1. Calef. & secat, insigniter discutit, menses ciet, appetitus Venereos cohibet, semen imminuit. Schröd. Plurimas ei virtutes ascribunt Veteres, quos consulat qui velit.

2. Athenis Thesmophoriis Cereris sacro mulieres castitatem custodientes foliis Viticis cubitus sibi sternere solebant, unde ei Ἀγνυς nomen,

Alzoon v. Sedum.

Alaternus major seu prior Park. Bourgespine Monspelienfium, Alaternus Plinii Clusio & Anguillarae Lob. Spina Burgi Monspelienfium J. B. Philyca elatior C. B. In Italia præcipuè ad mare inferum, necnon circa Monspelium in collibus saxosis. Foliorum figurâ & incisuris multum variat.

Alcea pentaphyllea Park. Pentaphylli folio vel cannabina J. B. V, five cannabina C. B. fruticosa cannabina Ger. In aggeribus fossarum circa Monspelium.

Alcea villosa J. B. VIII, five hirsuta C. B. minor villosa Park. In vinetis circa Monspelium, & in sepibus non procul Genève.

Alchimilla minor quinquefolia C. B. v. Pentaphyllum.

Alcyonium 4 Dioscoridis v. Bursa marina.

Alcyonium 5 Dioscoridis, five Auricula marina Cas. Fungus auricularis Cæsalpini C. B. In rupibus aquâ marinâ testis propè Portum Liburnum & alibi juxta Italiam & Siciliam.

Alkekengi Lon. Halicacabum five Alkakengi vulgare Park. Solanum bacciferum II, five vesicarium, quod folliculi vesicæ inflatæ similes, vel ut Plin. l. 21. c. 31. quoniam vesicæ & calculis profit, C. B. halicacabum Ger. hal. vulgare J. B. Primò in sylvosis in insula Danubii juxta Viennam Austriae; deinde in Italia propè Romam in scrobibus invenimus.

N. Hujus baccae nephriticæ, diureticæ ac lithontripticæ insignes sunt. Usus præcip. in calculo renum & vesicæ, in ictero (baccae & folia) in sanguine coagulato. Schröd. Sumi autem possunt vel vino infusæ, vel in sero lactis aut Zythogalo decoctæ, vel in pulverem redactæ in quovis liquore.

Allium Alpinum v. Victorialis.

Allium



## CATALOGUS STIRPIUM

Allium sphærocephalum purpureum sylvestre *J. B.* Allium seu Moly montanum purpureum elegantissimo flore *Clus. pan.* An Allium IV, sive sphæriceum folio latiore *C. B.*? In Germania.

Allium sylv. bicornè purpureum proliferum *J. B.* ubi accurata ejus habetur & figura & descriptio. Al. montanum II, sive mont. bicornè angustifolium flore purpurascēte *C. B.* Moly montanum 2 *Clusii Ger.* In Germania inter Lodeshemium & Basileam.

Allium sylv. bicornè flore obsoleto *C. B.* bicornè proliferum flore intus albescēte, cum striâ purpurascēte externè *J. B.* Genevæ inter segetes freq.

Allium sylv. perpusillum v. Moly moschatum.  
Aloe vulgaris *C. B. J. B.* vulg. sive semper vivum marinum *Ger. Park.* In Sicilia & Melita insulis, in muris & tectis.

N. 1. Succus hujus plantæ, Aloe dictus, vim præter purgantem obtinet & exiccantem, calefacientemque; pro-ritat hæmorrhoidas & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, arcet putredinem, astringit, consolidat, exterget, adeoque vulnerarium est insigne. *Schröd.*

2. Aloe penè sola medicamentorum quæ alvum solvunt; confirmat etiam stomachum, adeo non infestat vi aliqua contrariâ. *Plin. Galen. &c.*

3. Quod frequens Aloes usus hæmorrhoidum venas aperiat, ego (inquit *Fuchsius*) milies observavi; & vos ex 100 eorum qui Aloe ad externendas feces utuntur videbitis 90 hæmorrhoidarum fluxum pati; omisso verò Aloes usu venas illas claudi.

4. Cæterum tria Aloes genera in Officiis habentur, (1.) *Socotrina*, omnium optima & purissima, ab insula *Socotora* unde advehitur dicta. (2.) *Hepatica*, colorem hepatis referens, priore impuriore. (3.) *Caballina*, quæ est Aloes crassamentum, seu pars impuriore, arenosa & sordibus conspurcata, ideoque caballis seu equis exhibenda. His addit *Schroderus* (4.) *Lucidam*, adeo depuratam ut transparent sit: Alii non distinguunt *Socotrinam* ab *Hepatica*, ut neque *Lucidam* à *Socotrinâ*; adeoque duo tantum genera faciunt, *Hepaticam* scilicet & *Caballinam*.

Alopecuros *Ger.* genuina *Park.* Gramen Alopecuroidei spicâ rotundiore *C. B.* Gr. Alopecuros spicâ breviori *J. B.* *Fox-tail.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensiy præsertim in arenosis, ut v. g. propè oppidum *Frontignanum*, circa *Baias*, &c.

Alfine baccifera *Ger.* scandens baccifera *C. B.* repens baccifera *Park.* Cacubalum quibusdam vel Alfine baccifera *J. B.*

*J. B.* In sepibus, primò non longè à Francofurto ad Moenum, postea in Italia quoq; & Gallia Narbonensi observavimus.

*Alfinae folio crasso, an Alfina foetida Fabii Columnae Dioscoridea J. B.?* Primò se nobis obtulit in Liguria circa Portum Veneris, deinde alibi etiam tum in Italia, tum Sicilia.

+ *Alfinae foliis hederaceis Rutae modo divisis Læ. recta triphyllos, sive laciniata Park. IV. sive triphyllos caerulea C. B. folio profundè secto, flore purpureo seu violaceo J. B.* Inter segetes propè Lovanium. Hanc nuper in Anglia invenit T. Willisellus, v. *Cat. Ang.*

*Alfinae folio oblongo serrato, flore caeruleo J. B. item Eri-nos Columnae minor ejusdem.* Rapunculus minor foliis incisus *C. B.* In muris & siccioribus Messanae & Monspeli. Nos cum primùm hanc vidimus ad speculum Veneris retulimus.

*Alfina maxima Lugd. max. Hist. Lugdunensis J. B. Alf. oblongo folio C. B.* In sylvis ad latera montium Jurae & Salevae propè Genevam.

*Alfina muscosa quibusdam J. B. tenuifolia muscosa C. B.* Locis humidis ad fontes & aquarum scaturigines in montibus Stiriae, itémque; in Jura & Saleva mox dictis. Flos hujus tetrapetalos est.

*Althaea frutex Clusii Ger. Alth. frutescens folio rotundiore incano C. B. Alth. arborescens J. B.* Haec eadem non est cum *Althaea Olbii Ad.* licet Lobelius velit, sed diversa, ut rectè Clusius; quamvis & hanc quoq; speciem circa Olbinum Gallo-provinciae observaverimus spontaneam. Foliis est Malvae vulgaris rotundis, at incanis; flore majore incarnato. In rupibus non longè à specu Frontignana & propè Tolonam.

*Alypum montis Ceti, sive Herba terribilis Narbonensium Ad. Al. Monspeliensium sive Herba terribilis Park. Al. Monspelianum, sive Frutex terribilis J. B. Thymelaea foliis acutis, capitulo Succisæ, sive Alypum Monspeliensium C. B.* Titulus locum designat v. g. Promontorium Ceti propè Frontignanam. Invenimus etiam non minùs copiose in collibus saxosis juxta S. Chamas Gallo-provinciae oppidum.

*Alyssum minus v. Thlaspi minus.*

*Amarantus luteus v. Stoechas citrina.*

*Ambrosia Ger. maritima C. B. hortensis Park. Ambrosia quibusdam J. B.* In maritimis Etruriae arenosis.

*Amelanchier Læ. v. Diospyros.*



## CATALOGUS STIRPIUM

*Ammi vulgare* Ger. *vulgatius* Lob. *Park. majus* C. B. *vulgare majus* latioribus foliis, semine minus odore *J. B.* In Sicilia & Italia in hortis, vineis & pinguioribus arvis interdum nimis frequens. Hujus differentiam observavimus foliis magis incis. *Matth.*

N. 1. Semen Ammeos veri (quod ab hoc diversum est) partium est tenuium, incidit, aperit, disc. Hinc convenit in dolore colico & uterino, in mensibus & urina obstructis, in inflatione ventriculi, usq; præcipue interni est, hinc & externi. *Schrad.*

2. Mirifice prodest mulierum sterilitati, si in pulverem contritum propinetur manè drachmæ pondere ex vino meraco vel carniū jure, tribus ante cibum horis, &c. Remedium est præstantiss. & pluries expertum. *Matth.*

*Amygdalus* Ger. *Park.* Am. dulcis & amara *J. B.* *sativa* C. B. *The Almond-tree.* In Italia & Gallia Narbonensi in agris, non tamen ut puto sponte.

N. 1. Amygdalæ dulces multum nutriunt, corpus pinguefaciunt, humorum acrimoniam leniunt, semen genitale augment, unde tabidis & macilentis conveniunt. Adhibentur autem præcipue in emulsionibus, *Matth.*

2. Amygdalæ (inquit Galenus & experientia confirmat) nihil prorsus habent facultatis adstringentis; unde non audiendi sunt qui in febribus lactis Amygdalini dicti usum ideo vetant, ne scilicet alvum astringat. *Matth.*

3. Sunt qui sibi persuadent non tutum esse cremoris Amygdalini usum febricitantibus & iis qui stomachum biliosum habent, quia ob unctuositatem suam facile inflammatur, choleram auget & vapores ad caput mittit. Nos in cremore unctuositatem illam non observavimus, nec quicquam nocumentorum jam dictorum, licet in febribus & calidis morbis saepe usi sumus, & utamur ipsi indies etiam in nostro corpore. *J. B.* quem adi. Bauhino nostra quoq; experientia suffragatur. *Matth.*

4. Oleum Amygdalarum dulcium pulmoni & pectori utilissimum esse nostrâ experientia multorum commodo sæpissime exploratum: *J. B.* & paulo post, Est sanè medicamentum verè *εὐρθεῖον*, & ad multa efficax, blandum, gratum & veluti quidam typus aliorum oleorum ejusdem generis; scimus quid possit in colico dolore ab induratis fecibus, ab humore acri, in quibus tutò & maximo successu multoties exhibuimus. Sed recenter oportet esse expressum. Dos. à ℥iij. ad ℥ss vel per se, vel in jure carniū. In constipata alvo mitè, tutum & probatum medicamentum etiam renum dolore divexatis. Est etiam insignè anodynum & unicū propemodum infantium medicamen;

camen : quibus etiam recens natis exhibetur ad tormina ventris compescenda cum Saccharo penidiato ad 3ij.

5. Magma reliquum post expressionem olei ad extersionem manuum & faciei, & cutis lævigationem quovis sapone præstantius est.

6. Amygdalæ amaræ calidæ sunt & siccæ, atten. aper. exterg. diureticæ sunt, obstructioni jecoris, lienis, mesenterii, uteriq; conferunt. Extrinsecus lentigines tollunt si masticatæ illinantur, capitis dolori subveniunt (in frontalibus.) *Schrod.*

7. Am. amaræ ebrietatem arcere dicuntur. Novimus tamen (inquit J. B.) qui amuletum illud in usu habentes nihilo fecius à Baccho vincuntur, &c.

8. Amygdalas amaras vulpeculis si comedantur lethales esse tradunt. Marcellus Virgilius in fele pestiferam earum vim expertus est : Jo. Lutzius in gallinis, quæ ex usu magmatis post olei expressionem projecti mortuæ sunt. *J. B.*

Anagyris *Lob.* foetida *C. B. Park. Ger.* vera foetida *J. B.* In montibus prope Messanam & alibi tum in Italia, tum etiam in Sicilia.

Anagyris *Ger.* non foetida major vel Alpina *C. B.* non foetida five Laburnum majus *Park.* Laburnum, arbor trifolia Anagyridi similis *J. B.* In montibus Jurâ & Salevâ prope Genevam & alibi in Alpibus Sabaudicis.

N. 1. Folia Anag. foetidæ trita & imposita tumores reprimunt : sicca in passo pota menses & secundas movent, foetum mortuum ejiciunt. Semen commanducatum vomitus movet. Hæc ex Veteribus, nam Officinis nostris in usu non est. Quod vomitiones faciant tum semen, tum folia omnes consentiunt.

2. Accidit interdum, ut capræ & oves in Creta fame vexatæ, hujus folia depascant, licet odoris sit ingratisimi, & postea ex harum lacte caseus conficiatur : quod si fortè ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim excitentur tum vehementissimi vomitus, tum fluxus ventris ; & cum hoc sæpissimè accadat, multi in discrimen vitæ veniunt : quam ob causam frutex hic omnibus sit exosus. *Bellus.*

3. Quod Laburni flores apes non attingant, Plinius eumq; secuti recentiores Botanici affirmant. Sæpenumero autem Laburnum ob ligni duritiem & nigrorem pro Ebena vœnit ex quo pulchræ fiunt pectinum thecæ. *J. B.*

Anchusa angustifolia *C. B.* lignosior angustifolia *Lob. Park.* minor lignosior *J. B.* Libanotidis species Rondeletio *ejusdem* : bis enim describit hanc plantam. In collibus sterilibus agri Monspelienfis, *aux Garigues*, propè *Castelneuf*, &c.



*Anchusa lutea* *J. B. Ger.* major floribus luteis *C. B. lutea* major *Park.* In agris sterilioribus non longè à Lugduno quàm Genevam iter est.

*Anchusa Monspeliaca* *J. B.* itémq; minor seu Alcibiadion & *Onochiles ejusdem.* IV, sive puniceis floribus *C. B. Anchusa Alcibiadion* *Ger.* minor purpurea *Park.* In colle arenoso inter Gramontiam sylvam & Castrum novum, non longè à Monspelio.

N. Plurimas virtutes *Anchusæ* tribuunt Veteres, quos consule. Radix oleo soluta rubro colore tingit: petroleo infusa & illita præstans est ad vulnera recentia & puncturas. *Park.*

*Androsace Matthioli* *Ger.* *Androsaces Matthioli* sive Fungus petreus marinus, sive Umbilicus marinus *J. B. And. Matth.* sive *Cotyledon marina*, & *Umbilicus marinus* *Park.* *Androsaces Chamæ conchæ* innascens vel minor *C. B.* In fundo stagni marini Volcarum, inter Promontorium Ceti & *Balleruch* copiosissimè & alibi in eodem stagno.

*Androsæmum foetidum* *Park.* capitulis longissimis filamentis donatis *C. B.* Ruta hypericoides quibusdam, Sicilianæ affinis sive *Tragium* *J. B.* In Sicilia & Calabria ad aquarum rivos & scaturigines, ubi in satis magnum fruticem adolefcit.

*Anemone sylv. alba* major *C. B. magna alba*, plurima parte anni florens *J. B. sylv. latifolia alba*, sive tertia *Matthioli* *Park.* In Germania superiore.

*Anemone tuberosa* radice *Ger. tenuifolia* simplici flore tertia, sive *Oenanthes foliis*, flore violaceo hexaphyllo *C. B. An Italica* latiusculis spinosis foliis 3 Clusii *J. B?* Itinere à Lericio ad Massam Liguriæ copiosam vidimus, postea & alibi in Italia.

*Anisum Lob. Ger. Park. J. B. An. herbariis* *C. B.* In insula Meliteni magno proventu feritur.

N. 1. Semen attenuat, discutit, commanducatum halitum oris emendat; diureticum est, calculos pellit; lac auget, pulmonicum ac stomachicum imprimis audit. Hinc usus præcip. in tussi & orthopnoea; in ructu & inflatione ventriculi, torminibus intestinorum, &c. Oleum ejus aut Quintessentiam ad phrenesin & morbum comitalem commendat Parkinsonus.

2. Nos in doloribus ventriculi à flatibus & pituitosis humoribus ortis oleum Anisi magni facimus, exhibitum cum juseulo, modò paucae dentur guttulæ, tres sc. aut quatuor, quod tum in nobismet ipsis tum in aliis sumus experti. Colicos cruciatus quos non potuit sanare [aliis remediis] oleo Chymico Anisi sanavit Heurnius. *J. B.*

3. Infantibus

3. Infantibus *Di.* exhibitum blandè per superiora ac inferiora faburram ventriculi intestinorumque ejicit. *Schrod.*

4. Cæteris flatum discutientibus medicamentis gratius est ventriculo, minus habet acrimoniæ & plus suavitatis.

5. Piusunt hoc in panem ex quo Biscoctum parant: quin & spiritibus illis tenuibus, è quibus generosiores & aquas vitæ dictas eliciunt, leviter contusum ante destillationem infunditur, ad gratum saporem iis iterata destillatione exaltandis conciliandum.

6. Anisum Melitenses Cuminum dulce appellant, unde *C. Bauhinus* deceptus Cuminum dulce Melitensium pro distincta specie Cumini habuit.

*Anonis* viscosa spinis carens lutea major *C. B.* lutea non spinosa, *Dalechampio* natrix *J. B.* Natrix *Plinii* sive *Anonis* non spinosa lutea major *Park.* Primò illam observavimus in arenosis insulæ istius exiguæ Promontorio Siciliæ *Pachyno* dicto nuper impetu maris abruptæ; deinde ad fluvium *Arve* propè *Genevam*; tandem circa *Monspelim* copiosè.

*Anonis* non spinosa parva procumbens lutea. In arenosis maris litoribus propè *Cataniam* Siciliæ copiosè.

*Anonis* non spinosa purpurea supina minima. In sterilibus *Calabriæ* juxta mare. Has duas plantas nondum descriptas putamus.

*Anonis* pusilla fruticans *Cherleri J. B.* Trifoliis affinis. In collibus sterilibus *Narbonensis Gallia* inter *Ilices*, *Thymos* aliòsq; frutices multa.

*Anonymus* flore *Coluteæ Clus.* *Chamæbuxus* flore *Coluteæ Ger. C. B.* *Chamæbuxus* sive *Chamæpyxos* quibusdam *J. B.* *Pseudo-chamæbuxus Park.* Primò observavimus in sylvis *Constantiam* inter & *Scaphusiam*, deinde in planitie quadam propè *Augustam Vindelicorum*, tandem non longè à *Tiguro Helvetiæ* plurimam, mense *Mai*o florentem.

*Anthyllis* leguminosa purpurascente flore *Clus.* Loto affinis flore subrubente *C. B.* In agrorum marginibus circa *Liburnum portum* & alibi in pascuis *Italiae*.

*Anthyllis* altera herbariorum *Park v.* *Chamæpitys moschata.* marina incana, &c. *v.* *Paronychia.*

leguminosa *Hispanica v.* *Trifolium Halicacabum*, & *Auricula muris.*

*Antirrhinum luteum Ger.* luteo flore *C. B.* flore luteo grandi *Cam.* flore subluteo *Dod.* Circa *Messanam* in muris: unde *Petrus Castellus* in *Catalogo* suo *Messanense* illud appellat. Invenimus insuper in rupibus non procul à *Petra sancta* *Hetruriæ* oppido.

*Antirrhinum purpureum Ger.* majus alterum folio longiore *C. B.* vulgare *J. B.* In aggeribus fossarum & ad sepes propè *Monspelim* abundè.



## CATALOGUS STIRPIUM

*Antirrhinum minus* flore carneo, rictu striato. In Italia & Sicilia.

*Anthora* flore luteo *Aconiti* *J. B.* *Anthora Park.* *Aconitum saluterum* seu *Anthora C. B.* *Anthora* five *Aconitum saluterum Ger.* In monte Jura circa verticem *Thuri*, & alibi in istius montis jugis.

N. 1. Radix insigniter amara est: venenis omnibus adversari dicitur, & peculiariter radici *Thoræ*. Addit *Guainerius* magnæ etiam esse adversus pestem efficaciam, cui subscribit *Matth.* *Solerius* non modò per inferiorem ventrem, sed & per superiora largas ait *Anthoræ* radices expurgationes moliri: modum esse ad quantitatem *Phaseoli* in jussulo aut vino.

2. Considerent lectores (inquit *J. B.*) an radix purgans conveniat commorhis à viperis & cane rabido, itémq; peste laborantibus. Quis tandem credat radicem purgantem auxiliari omnibus cordis affectibus?

*Aparine* semine *Coriandri* saccharati *Park.* In insula ad *Prom.* *Pachynum* & alibi in Sicilia.

*Aphyllanthes Monspeliensis* *J. B.* *Lob.* *Caryophyllus* cæruleus *Monspeliensis C. B.* *Park.* In collibus juxta *Castelneuf*, aliisq; sterilioribus *Monspelio* vicinis.

*Aphyllanti* affinis, &c. *v.* *Scabiosa*.

*Apium montanum nigrum* *J. B.* VI, five *montanum folio ampliore C. B.* ejusdem *Ap.* VIII, seu *montanum nigrum*: ejusdem *Daucus* VI, seu *montanus Apii folio minor*, ex sententia fratris *J. Bauhini*; adeóq; ex una planta tres facit. *Apium montanum vulgatus* & *Apium montanum Parisiensium Park.* *Oreoselinum Ger.* In Germaniæ montosis, & ad latera montis *Juræ* non procul *Genevâ*.

*Apium peregrinum v.* *Daucus tertius Dioscoridis.*

*Apocynum latifolium amplexicaule* *J. B.* *v.* *Scammonea Monspeliaca.*

*Arbor Judæ Lob. Ger. Park.* *Judaica arbor* *J. B.* *Siliqua sylv. rotundifolia C. B.* Primò observavimus in collibus *Romæ* vicinis, *Tyberi* fluvio imminentibus; deinde in *Apenninis* montibus.

*Arbutus Ger. Park.* *Arb. Comarus Theophrasti* *J. B.* *Arb.* five *Unedo Lob.* *Arb. folio serrato C. B.* In *Siciliæ*, *Italiæ* & *Galliæ Narbonensis* sylvis plurima.

N. 1. *Arbuti* fructus, memæcylum Græcis dictus, ventriculo incommodus est & capitis dolorem inducit. Mihi sanè quoties comedi (inquit *J. Bauhinus*) dolorem causarunt ventriculi hi fructus. Ego sine ulla noxa multos edi. *Clus.* & revera sapore sunt non ingrato.

2. *Amatus*

2. Amatus ex Arbuti foliis & floribus aquam vitreis organis elici tradit, eamque servari tanquam sacratissimum adversus pestem & venena antidotum. Matthiolus pulverem ossis de corde cervi ei admiscet.

3. Scribit Bellonius in montis Athos, tantopere priscis celebrati, vallibus Arbutos (qui ut plurimum aliis locis fruticent) in vastæ magnitudinis arbores evadere. Juba author est quinquagenum cubitorum altitudine in Arabia nasci. *Plin.*

*Arisarum latifolium Park. Ger. latifolium quibusdam J. B. latifolium alterum C. B.* In aggeribus sepium & umbrosis, itinere inter Massam & Lucam copiosum vidimus: postea etiam in Gallo-provincia non longè à Tolona portu, ad montium latera.

*Aristolochia rotunda Lob. Ger. J. B. rotunda vulgatio Park. rotundo flore ex purpura nigro C. B.* In Italia passim ad sepes & in aggeribus fossarum.

*Aristolochia polyrrhizos J. B. Arist. Pistolochia dicta C. B. Pistolochia Ger. Pistolochia vulgatio Park.* In arvis propè *Sellam novam* agri Monspeliensis, sub oleis.

*Aristolochia Saracenica Ger. Ar. clematidis Park. Ar. clematidis recta C. B. clematidis vulgaris J. B.* Circa Monspelim in vineis, fossis & aggeribus plus fati luxuriat.

N. *Aristolochia* utraq; cephalica, hepatica & pulmonica inprimis est; attenuat, aperit. Hinc prodest ad tartaream mucilaginem resolvendam expectorandamque; ad menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena discutienda. Insuper longæ infusio ad scabiem exiccandam vel vulgo hîc usitatissima est. Extrinsicè adhibetur usu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera. Rotunda tenuiorum est partium quàm longa, adeoq; efficacior, & in primis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima. *Schrod.* Aiunt & radici huic vim purgatricem inesse.

*Armeria prolifera Ger. Caryophyllus prolifer Park. sylvestris prolifer C. B. Betonica coronaria squamosa sylv. J. B.* In Italia, Sicilia, Germania, Gallia fati frequens.

*Armeria rubra Ger. Betonica coronaria five Caryophyllus sylv. vulgatissimus J. B. Caryophyllus sylv. vulgaris latifolius C. B.* Cum priore & magis etiam vulgaris.

*Artemisia tenuifolia v. Abrotanum inodorum.*

*Arum venis albis C. B. magnum, rotundiore folio Park. majus Veronense Lob.* Primò in insulis circa Venetias nobis conspectum, etiam Novembri mense virens, foliis viridibus, vulgaris duplo majoribus, venis albis; vidimus & alibi in Lombardia.



## CATALOGUS STIRPIUM

*Asarum* *Lob. Ger. C. B. J. B.* vulgare *Park.* In sylvis ad latera montis Juræ, quæ ascenditur ad verticem *Dole* dictum copiosè. Vidimus & in Bavaria.

N. Crassam pituitam & utramq; bilem per vomitum ac nonnunquam per secessum violenter expurgat. Diureticum est & emmenagogum insigne. Epar, lienem, vesicamq; fellis aperit. Hinc utile est in arthritide, hydrope, febribus, præcipuè tertiana ac quartana, ictero, &c. Folia exhibentur n. 6, 7, 8, vel 9, infusa aut cocta & expressa.

*Asclepias* *Lob. flore albo Ger. Park. C. B.* *Ascl.* five *Vincetoxicum* multis, floribus albicantibus *J. B.* Per Germaniam, Italiam, Galliam Narbonensem in dumetis & ad sepes ubiq; ferè.

N. Alexipharmaca est ac sudorifera insignis. Usus præcip. in peste aliisq; venenosis affectibus, in obstructionibus mensium, in torminibus intestinorum, in palpitatione cordis ac lipothymia, in hydrope. Semen commendatur ad calculum. Extrinsecus usus tam florum quàm radicum & seminis est in ulceribus sordidis ac malignis purificandis, ad ictus insectorum venenatorum, in tumoribus mammarum, &c. *Schrod.* Facultatibus cum *Aristolochia longa* convenit ex sententia *Tragi.* De vi ejus ad hydropem vide *J. B. & Trag.*

*Aspalathus* 2 *Monspeliensis J. B.* alter *Monspeliensis Park.* *Genista-spartium* spinosum majus I, flore luteo *C. B.* In aridis & sterilibus saxosis collibus circa *Monspelim*, *Nemaufum* & alibi in *Gallia Narbonensi.*

*Asparagus marinus J. B.* marinus crassiore folio *Park. marit. crassiore folio C. B. palustris Ger. λεῖο* five *palustris Galeno.* In palustribus propè marinum *Volcarum* stagnum, non longè à *Monspelio.* Hæc planta mihi non visa est specie differre ab *Asparago sativo*, sicut nec *sylvestris* ab eo differt aliter quàm culturâ. Quæ ad *Asparagum* annotavimus vide in *Cat. Ang.*

*Asparagus petræus* five *Corruda Ger. petræus, five Corruda aculeata Park.* *Asparagus foliis acutis C. B. Corruda J. B.* In Italia ad sepes & in dumetis frequens. Provenit quoq; circa *Monspelim* in *Linguadocia.*

*Asparagus sylv. aculeatus Ger. aculeatus, spinis horridus C. B. spinosus, five Corruda spinis horrida Park.* In insula *Promontorio Pachyno* adjacente, & alibi in maritimis *Siciliæ.*

*Asparagus sylv. spinosus Clusii Ger. aculeatus tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum C. B.* Ad mare propè *Tauromenium* in *Sicilia.* Harum specierum meminit *J. Bauhinus* in capite de *Corruda.*

*Asperula*

Asperula flore cæruleo *Ger. Park.* cærulea arvensis *C. B.* Rubra cærulea erectior elatiôrve *J. B.* In monte Salevâ inter segetes ; itémq; propè Neapolin Austriæ & Monspelium.

† Asphodelus bulbosus Dodonæi, sive Ornithogalum spicatum flore virente *J. B.* Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus *C. B.* Asphodelus bulbosus *Ger.* Inter segetes unâ circiter leucâ à Geneva versùs Salevam montem. Hanc *T. Willifellus* in Anglia invenit. vide *Cat. Ang.*

† Asphodelus luteus *Ger. J. B.* lut. minor *Park.* luteus & flore & radice *C. B.* In insula ad Promont. Pachynum & alibi in Sicilia.

*N. 1.* Asphodeli Veteribus frequens in medicina usus fuit. Videfis Dioscoridem, Plinium & Galenum, qui plurimas ei facultates assignant. Recentioribus nunc dierum ferè neglectus est : sunt tamen qui radices ejus ad icterum commendant.

8. Hastulæ regiæ caulis seu scapus totus Græcis *anthericos* dicebatur, uti Latinis, teste Plinio, *albus*. Sunt & qui eo nomine semen Asphodeli significari voluerint.

Asphodelus major ramosus flore albo *J. B.* major albus ramosus *Park.* albus ramosus mas *C. B.* ramosus *Ger.* In montibus Messanæ imminentibus, atq; etiam in collibus saxosis agri Monspelienfis.

Asphodelus minor *Clus.* albus non ramosus *C. B.* non ramosus *Ger.* In Sicilia circa Syracusas & alibi.

Asphodelus minor foliis fistulosis *v.* Phalangium Cretæ Salonenfis.

Lancastræ verus *Ger. emac. v.* Pseudo-asphodelus.

Aster Atticus Italorum flore purpureo *Park.* Italorum *Lob.*

*Ger.* Atticus cæruleus vulgaris *C. B.* Att. purpureo & albo flore *J. B.* In asperis Germaniæ collibus secus Rhenum & alibi copiosè.

Aster Atticus *Ger. Cæs.* Atticus luteus verus *Park.* luteus foliis ad florem rigidis *C. B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi ubiq; obviis.

Aster montanus luteus Salicis glabro folio. *C. B.* montanus foliis salicis *Park. Ger.* Conyza media Monspelienfis, quibusdam Asteris Attici genus, folio glabro rigido *J. B.* In collibus juxta *Castelnau* & alibi in vicinia Monspelii. Eundem observavimus in Germania juxta Rhenum ex adverso Manhemii ; & in sylvis supra Neapolim Italiæ, versùs Camaldulensium cœnobium.

Aster purpureus montanus *J. B.* Alpinus cæruleo magno flore *Park.* Atticus cæruleus III, sive montanus cæruleus magno flore, foliis oblongis *C. B.* Aster 7 *Clusii Ger.* In summis



## CATALOGUS STIRPIUM

jugis montis Juræ, itémque in montibus maximo Carthusianorum cœnobio imminentibus.

Asteri montano purpureo similis *J. B.* Videtur *J. Bauhinus* describere plantam quam inveni in montibus sylvosis max. Carthusianorum cœnobio vicinis, quamvis per omnia non respondeat Figura aut Descriptio; & quid mirum? cùm sicca jam delineata & descripta fuerit.

After Tripolii flore *C. B.* minor angustifolius *Park.* Atticus Monspelienfis purpureus, angustioribus foliis *J. B.* minor Narbonensis Tripolii flore, Linariæ folio *Lob.* In prato juxta molendinum *Castri novi*, inq; sylva Valena & alibi propè Monspelium.

After supinus *Park.* luteus supinus Clusii *Ger.* Ast. luteus supinus spinosus *J. B.* perperàm spinosum appellat. Ast. luteus XII, five supinus *C. B.* Circa Massiliam ad maris litus.

After montanus X, five luteo magno flore *C. B.* montanus 3 *Ger.* Britannica conyzoides, quibusdam After Pannonicus Clusio *J. B.* In Germania ad Rhenum; inq; Italia ad margines fossarum inter Liburnum & Pisas. Semper in aquosis.

After luteus lanuginosus *Park.* hirsutus *Ger.* luteus V, five hirsuto Salicis folio *C. B.* An After luteus XI, five luteus montanus villosus magno flore *C. B.*? After montanus flore luteo magno hirsutus, quibusdam Oculis Christi *J. B.*? In montosis medio circiter itinere inter Genevam & Lugdunum. Huic non adeò dissimilis est figura Asteris angustifolii lutei apud *J. Bauhinum*.

Astragalus Monspelianus *J. B.* Securidaca II, five lutea minor corniculis recurvis *C. B.*? An potius Astragalus V, seu villosus floribus globosis *ejusdem*? Certè Astragalus Monspelianus *J. B.* diversus est ab Hedysaro seu Securidaca minore, proinde reprehendit Lobelium, quòd non adverterit Astragalum Monspelienfium diversum esse à Securidaca minore. Verùm Monspelienfes, cùm ibi essemus Anno 1665. ostenderunt nobis Securidacam minorem pro suo Astragalo: Astragalum autem Monspeffulanum *J. B.* nondum vidimus.

Astragalus Monspeliano candidior, & Onobrychis quorundam *J. B.* An Astrag. V, seu villosus floribus globosis *C. B.*? qui Astragalum Monspelianum Clusii huc refert. purpureus *Lugd.* In rupibus montis Salevæ Genevam spectantibus copiose.

Astragalus quidam montanus vel Onobrychis aliis *J. B.* Onobrychis X, seu floribus Viciæ majoribus cæruleo-purpurascentibus, vel foliis Tragacanthæ *C. B.* In altissimo vertice montis Juræ *Thuri* dicto.

Astragalus

*Atragalus major* Fuchſio v. *Orobſus ſylvaticus*.

*Aſtrantia nigra* *Lob. nigra*, ſive *Veratrum nigrum* *Dioſcoridis*  
*Dod. Ger. Helleborus niger* *Saniculæ folio major* *Park. C.B.*  
*Sanicula* ſemina quibuſdam, aliis *Helleborus niger* *J. B.*  
In ſylvis quibuſdam non longè à *Monachio* *Bavariæ*; necnon  
in *Salvæ* pratis montofiſis urbi *Genevæ* viciniſ.

N. Hujus radici vim per alvum purgatricem *Helleboro*  
albo ſimilem ſed mitiorem multò inefſe *Gefnerus* primùm ſe  
expertum refert.

*Atractylis* *Lob. Ger. lutea C. B. flore luteo* *Park. vera flore*  
*luteo J. B.* In *Italia* & *Gallia Narbonenſi* ad vias & in  
agrorum marginibus ubiq; ferè.

N. Hujus folia ſuccum ſanguineum præbent, quemad-  
modum *Theophraſtus* de *Atractylide* refert, qui tamen tuſis  
& expreſſis non elicitur, ſed avulſis dum adhuc tenera ſunt  
& ſucco prægnantia, ſponte è venis effluit; quo modo etiam  
ex *Aloes* plantæ foliis ſe *Aloen puriſſimam* & optimam *Ne-*  
*apoli* collegiſſe ſcribit *F. Columna*.

*Atriplex marina* *Ger. maritima J. B. maritima laciniata C. B.*  
*marina repens* *Park.* In litoribus arenofiſis maris *Mediterra-*  
*nei* nuſquam non occurrit. A noſtrati a. *maritima* omnino  
diverſa eſt.

*Avicularia Sylvi* *J. B. v. Speculum Veneris*.

*Avicularia muris Camerarii J. B. Anthyllis leguminofa ma-*  
*rina Bætica vel Cretica, ſive Auricula muris Camerarii*  
*Park. Loto affinis IV, ſive hirsutiſ circinatis ſiliquis C.B.*  
In inſula ad *Promont. Pachynum*, ubi arx præſidio *Hiſpa-*  
*nico* tenetur, & alibi in *Sicilia*.

*Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimo J. B. In*  
*monte Thuri* non procul à *Genevâ*.

*Auricula Urſi flore purpureo Ger. A. U. ſive Primula veriſ*  
*Alpina flore rubente J. B. Sanicula Alpina purpurea C. B.*  
Primò invenimus in *Alpibus* non longè à *Pontieba* vico qui  
ab ea parte *Limes* eſt *Ditionis Venetianæ*: poſtea etiam in  
cliviſ maritimis *Regni Neapolitani*; tandem in *Alpibus*,  
*Chambery* inter & max. *Carthuſianorum cœnobium*.

*Auricula leporis v. Bupleuron.*



## B

**B** Arba capri *J. B. Ger. emac.* B. caprae floribus oblongis, Melandryon Plinii *C. B. Ulmaria major* five altera *Park.* Propè Genevam à la Bassie. Invenimus & in Helvetia non longè à Scaphusia.

Balsamita v. Ageratum.

Barba Jovis frutex *C. B. Clus. Park. &c.* Jovis barba pulchrè lucens *J. B.* In clivis maritimis Etruriæ & Regni Neapolitani copiosè.

Bellis sylvatica *J. B.* media sylvest. *Ger. VI,* five sylv. media, caule carens *C. B.* In montibus circa Genevam.

Bellis Alpina major folio rigido *C. B. Park.* In summis jugis montis Juræ copiosè. Bellidis utriusq; facultates quære in *Cat. Ang.*

Bellis cærulea Monspeliaca *Ger. cærulea II,* five caule folioso *C. B. Aphyllantes Anguillaræ,* five Globularia Bellidi similis *J. B. Globularia Monspeliensium, Bellis cærulea Park.* Circa Monspelim plurimis in locis; quin & ad radices montium Juræ & Salevæ propè Genevam, & alibi tum in Italia, tum etiam in Germania.

Bellis cærulea caule nudo *C. B.* In sylvis & montibus max. Carthusianorum cænobio vicinis. Hæc priore elatior est, foliis angustioribus longioribusq; & omnino specie ab ea diversa, quicquid repugnat *J. Bauhinus,* cui certè nunquam conspecta fuit.

Beta Cretica spinosa *Park.* Cretica semine spinoso *J. B.* semine aculeato *Ger. minor V,* seu Cretica semine aculeato *C. B.* In insula ad Promont. Pachynum Siciliae.

Bistorta minima *J. B. IV,* five Alpina media *C. B. minor Alpina Park.* In supremis herbidis jugis montis Juræ copiosè. Puto hanc non esse specie diversam à nostrate, quamvis *C. Bauhinus* distinguat.

Blattaria lutea *J. B.* lutea minor seu vulgaris *Park.* lutea folio longo laciniato *C. B.* flore luteo *Ger.* Variis in locis hanc observavimus tam in Germania quam in Italia & Gallia Narbonensi. Solo floris colore ab hac differt Blattaria flore albo, siquidem ex eodem semine oritur, ut in hortulo nostro Cantabrigiæ aliquando experti sumus.

Blitum rubrum majus *C. B. Ger. pulchrum rectum,* magnum rubrum *J. B.* In hortis oleraceis circa Monspelim.

Blitum

*Blitum rubrum minus* *J. B. C. B. Ger.* minus *fylv. rubrum Park.* In vineis, hortis & fimetis circa *Monspelim* & alibi. Quomodo & an omnino specificè inter se differant album minus & rubrum minus, mihi non satis constat. Quod in Germania circa *Basileam* & alibi tam copiosè provenit videtur esse *Blitum minus album J. B.*

*Botrys Ger. vulgaris Park. ambrosioides vulgaris C. B. Botrys plerisq; Botanicis J. B.* In arenosis circa *Rhegium* in Calabria, Florentiam in Etruria, *Monspelim* & *Nemausum* in Narbonensi Gallia.

N. 1. Herba in pulverem redacta, mellèq; in Electuarii forma excepta præstat contra pulmonum vomicas, quo remedio multos ego curavi qui pus screabant. *Matth.* Valere dicitur & ad dolores uteri, ad menses ciendos & emortuos fœtus ejiciendos.

2. Nonnulli inter vestes eam reponunt ad tineas abigendas, & odoris suavitatem communicandam.

*Botrys verticillata J. B. v. Chamædrys foliis laciniatis.*

*Branca ursina v. Acanthus fativus.*

*Briza monococcus Ger. Zea Briza dicta, vel monococcus Germanica C. B. Zea monococcus, sive simplex, sive Briza Park. Zea monococcus, Briza quibusdam J. B.* In Germania Argentoratum inter & *Basileam* ejus segetes vidimus.

*Buglossum angustifolium Lob. angustifolium minus C. B. vulgare angustifolium minus J. B. minus fativum Park.* Ad vias & agrorum margines in Italia, Gallia, Germania subinde occurrit. An hoc à sativo aliter quàm culturâ differat considerandum. Vulgare latifolium circa *Messanam* invenimus.

N. Viribus cum Boragine convenit. Flores inter quatuor illos cordiales famosos recensentur. Omnibus affectibus extrahibile oriundis conducunt, ut & radix & folia. In oleribus usurpantur, valentque ad sedandos dolores varios.

*Bugula v. Consolida.*

*Buphthalmum vulgare Ger. Dioscoridis C. B. Matthioli, sive vulgare Millefolii foliis Park. Chamæmelum chrysanthemum quorundam J. B.* Variis Germaniæ in locis, v. g. in muris oppidi *Bonnæ* propè *Coloniæ*, &c. In Italia circa Florentiam in alveis torrentum.

N. Usus sum hæc herbâ in vino decoctâ adversus inveteratam fellis suffusionem, potu illam decoctionem calidam hoc morbo laborantibus tanquam concoquens & discutiens remedium exhibui, certèq; deprehendi eam extenuandi, discutiendiq; & educendi citra dolorem & periculum vi præditam. *Trag.*

Buphthalmum



## CATALOGUS STIRPIUM

*Bupthalmum* *Cotulæ folio* C. B. alterum *Cotulæ folio* *Park.* tenuifolium folio *Millefolii* ferè *J. B.* In agris circa *Liburnum portum*. Vel eadem est hæc planta, vel certè simillima *Chrysanthemo Valentino Clusii*. *Chrysanth. tenuifolium Bæticum Boelii. Ger.*

*Bupleurum angustifolium*; An *Bupleurum* III, five angustissimo folio C. B. ? *Figura Bupleuri angustifolii Monspeliensis Ger.* optimè convenit huic plantæ quam circa *Monspelim* invenimus. Est a. specie distincta à nostrate *Auricula leporis* seu minimâ *J. B.*

*Bupleuron latifolium Monspeliense Ger. I.* seu folio rigido C. B. latifolium *Park.* *Auricula leporis* altera five rigidior *J. B.* In sylvis & dumetis circa *Monspelim*.

*Bupleurum folio subrotundo* five vulgatissimum C. B. An B. angustifolium *Park*? *Auricula leporis umbellâ luteâ J. B.* In *Germaniæ & Italiæ* montosis, ad sepes & in dumetis.

*Bursa marina & Alcyonii* genus 4 *Dioscoridi Cæs.* *Arancio marino Imper.* *Algæ pomum Monspeliensium J. B.* *Alcyonium XII*, five *Bursa marina Cæsalpini C. B.* Apud *Scriptores nostros Anglicos* nulla hujus mentio, quod sciam. In litoribus maris arenosis ad *Siciliæ Punctum Cerciolum* dictum reperi.

† *Bursæ pastoriæ* loculo sublongo affinis pulchra planta *J. B.* B. p. major folio non sinuato C. B. *Thlaspi Veronicæ folio Park.* Medio circiter itinere inter *Lucam & Pisas* ad sepes. Hanc nuper in *Anglia nostra* invenimus spontaneam, v. *Cat. Ang.*

*Bursa pastoris minor foliis Perfoliatæ J. B. v. Thlaspi oleaceum.*

## C.

**C** *Acalia* quibusdam *J. B. III*, five foliis cutaneis acutioribus & glabris C. B. folio glabro *Ger.* glabro folio acuminato *Park.* In sylvosis montium *Juræ & Salevæ* propè *Genevam*.

*Cacubalum Plinii v. Alfine baccifera.*

*Calamintha montana præstantior Lob. Ger. Park.* montana flore magno, ex calice longo *J. B.* magno flore C. B. In montibus propè maximum *Carthusianorum cœnobium*. Invenimus & in montosis *Etruriæ* sylvis.

*Caltha*

*Caltha arvensis* C. B. simplici flore *J. B.* *Calendula* simplici flore *Ger.* Circa Monspelium, Liburnum, &c. An *Caltha minima* *J. B.*? *Small wild Marygold.*

N. Flores cardiaci censentur, hinc & heptiaci & Alexipharmaci, sudores movent, variolas expellunt, ictero medentur, menses cient, partum promovent (sumus subditus parturienti.) Aqua destillata oculorum rubedini & inflammationi medetur. Folia in olere sumpta alvum leniunt.

2. Decoctum florum *Calendulae* in *Zythogalo* seu liquore possети vulgò præscribitur ad variolas expellendas; ejusq; usus à longo tempore ferè inter omnes increbuit.

3. Planta hæc *Solsequia* & *Solis sponsa* dicitur, quòd flos ejus ortu *Solis* aperiatur & occasu claudatur.

*Campanula rotundifolia minima* C. B. *J. B.* *Park.* An *Camp. glabra* XXII, sive minor *rotundifolia Alpina* C. B.? Fortè enim hæ duæ non differunt specie. In *Alpibus Stiriæ* & *Carinthiæ*. Folia hujus ex rotunditate oblonga sunt & ferrata eo ferè modo quo *Saniculæ Alpinae* guttatæ.

*Campanula minor folio rotundo*, flore cæruleo pentagono grandi. In clivis maritimis Regni *Neapolitani*. An à quoquam descripta sit nescio.

*Campanula Persicifolia* *Ger. Park.* angustifolia cærulea & alba *J. B.* *Rapunculus glaber* X, seu *Persicifolius* magno flore C. B. Observavimus hanc propè *Spadam urbeculam* acidulis celebrem flore albo: in montibus & collibus *Genevæ* vicinis flore cæruleo.

*Campanula repens* flore minore cæruleo *J. B.* An *Trachelium* sive *Campanula hirsuta* VIII, i. e. *Urticæ* foliis oblongis, minùs asperis C. B.? Hujus meminit *Clusius* in *Hist. cap. de Trachelio*, quem adi. In arvis inter segetes prope *Genevam* & alibi.

*Camphorata hirsuta* C. B. *Monspel. J. B.* major *Monspelienfium* *Park.* *Monspelienfium*, an *Chamæpeuce* *Plinii Lob.* Circa *Monspelium*, *Nemausum*, *Avenionem* & alibi in *Gallia Narbonensi*.

*Camphoratæ congener* C. B. *Camph. Monspelienfium* quoad figuram *J. B.* *Anthyllis altera Italarum* *Ger.* *Camphoratæ congener*, sive *Anthyllis altera Italarum* *Park.* In *Germania*, *Italia* & *Gallia Narbonensi* in arvis & vervastis frequens.

*Capparis spinosa folio rotundo* *Park.* rotundiore folio *Ger.* spinosa fructu minore folio rotundo C. B. *Cap. spinosa* *J. B.* qui species hæc non distinguit. In muris & rudibus *Romæ*, *Senarum*, *Florentiæ*, & alibi in *Italia*. Circa *Tolonam* in *Gallo-provincia* colitur.

N. Florum



## CATALOGUS STIRPIUM

N. Florum gemmæ antequam explicantur decerpæ & muriâ conditæ ad nos transportantur, & intinctus fere loco ad carnes & pisces affatos adhibentur: appetitum augment, hepatis & lieni conferunt obstructions eorum reserando. Memorabile est (si modò verum) quod scribit Plinius. Ferunt eos (inquit) qui quotidie Capparin Italicam edunt Paralyfi non periclitari, nec Lienis doloribus. Cortex, radicis imprimis, lienes induratos juvat, tum intus assumptus, tum foras impositus; menses educit, ulcera exterget & desiccet, ad dolorem ischiadicum valere dicitur, & affectus Arthriticos.

Cardamine Alpina v. Nasturtium Alpium.

† Cardamine impatiens vulgò. Sium minus impatiens Ger. minimum *Alpini*: minimum, Noli me tangere dictum, five impatiens Nasturtii sylv. folio *Park.* An Sisymbrii Cardamines species quædam insipida *J. B.*? Certè & icon & descriptio huic ad amissim quadrant. In Germania juxta Rhenum, locis glariosis ubi aquæ scaturiunt.

Carduus chrysanthemus Narbonensis Ger. Scolymos chrysanthemus *C. B.* Spina lutea *J. B.* Scolymus Theophrasti, five Eryngium luteum Monspeliensium *Park.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi, ad mare præsertim frequentissimus.

Carduus chrysanthemus *Dod.* Scolymus Theophrasti Hispanicus *Clus.* Propè oppidulum S. Lupiani, eundo ad Pedenatum, & alibi circa Monspelim. Hæc planta reverà specie differt à præcedente, quicquid contradicit C. Bauhinus.

N. Salmanticenses tenellam adhuc plantam & primùm germinantem, cum ipsa radice elotam crudam aut etiam coctam cum carnibus edunt: ipsius lacteo succo omne lactis genus coagulant; etiàmque ejus flore. Crocum adulterant, ut quædam nationes Cnici flore. Hujus autem radice Sues non minùs libenter vescuntur quàm Eryngii *Clus.*

Carduus chrysanthemus procerus caule eduli. Ad radices montis *Ætnæ* 8. mil. supra Cataniam, ubi vulgus cum aceto & pipere caules ipsius crudos acetarii loco comedit. Hæc planta an à præcedente specie diversa sit subdubito, quamvis duplo altiùs assurgat. At fortè illud solo debetur.

Carduus cæruleus sphærocephalus minor *C. B.* Crocodilium Monspeliensium *Lugd.* Card. globosus minor Ger. Echinopus minor *J. B.* In Gallia Narbonensi vulgatissimus.

Carduus galactites *J. B.* Apud alios Botanicos hunc non invenio. In Sicilia & Melita insulis, itemque in Italia propè

propè pharum Genuensem, necnon circa Monspelium in locis ruderatis & incultis.

Carduus lacteus peregrinus Camerarii *J. B.* albis maculis notatus exoticus *C. B.* Silybum minus Bæticum *Park.* In Melita & Sicilia insulis. Color seminis in hoc fuscus est & minimè albus, ut in peregrino Camerarii, & proinde fortè rectius refertur ad Silybum majus annuum *Park.*

Carduus lanceolatus ferocior *J. B.* Primò invenimus eum proximè *fontem* quem vocant *ardentem*, à Gratianopoli duabus circiter leucis remotum, deinde in itinere ab Aurantia ad Nemausum; tandem propè montem S. Lupi, tribus Monspelio leucis distantem. Est ei flos albus & major quàm Lanceolati vulgaris.

Carduus parvus *J. B.* In Sicilia agris non longè à castello *Puzzallu* ex adverso Melitæ.

Carduus Cirium dictus folio laciniato nigrius *J. B.* In montibus propè Genevam. Hic an ab aliis descriptus sit video *J. Bauhinum* dubitare, proinde & ego *ἰπύχου*.

Carduus pratensis Aphrodeli radice latifolius *C. B.* bulbosus Monspelienfium *Park.* bulbosus Monspelienfis, sive Acanthus sylv. quibusdam, foliis laciniatis *J. B.* In pratis Monspelio vicinis.

Carduus pratensis latifolius *C. B. Park.* pratensis *Tragi.* mollis Lapathi folio *J. B.* In pratis Rheno vicinis circa Argentoratum, Basileam, &c.

N. Hujus folia in cibis ut reliqua olera expetuntur, undè à mulierculis Brassica pratensis, nominatur. *J. B. Trag.*

Carduus solstitialis *Ger.* stellatus IV, sive luteus foliis Cyani *C. B.* Cardui stellati varietas, Jacea lutea Clusii *Lob.* Spina solstitialis *J. B.* In Italia & Gallia Narbonensi ubique ferè.

N. Herba hæc in morbo regio efficacissima est experientiâ Fontanoni; valet & ad cachexiam, hydropem, febres diurnas, virginum decolorem faciem, &c. *J. B.*

Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris *C. B.* globosus *Ger.* Echinopus major *J. B.* In montosis sylvis propè Viterbum quâ indè Romam itur.

Carlina herbariorum *Lob.* humilis *Park.* Carlina, sive Chamæleon albus Dioscoridis *Ger.* acaulos magno flore *C. B.* caulifera & acaulis *J. B.* nam hæ duæ specie non differunt. In Germaniæ pascuis sterilioribus & dumetis frequens; nec minùs in Italia, Gallia Narbonensi, & circa Genevam. De hujus viribus, v. *Cat. Ang.*

N. 1. Re-



## CATALOGUS STIRPIUM

N. 1. Refert Gesnerus, hujus floris calicem tum recentem, tum etiam sicum noctu claudi, ad Solem verò aperiri. Germanis *Eberwurtz* dicitur, i. e. Apri herba, quia nimirum Apri ejus radices appetunt; non (ut vult Fuchsius) quòd sues, si in polenta exhibeatur, perimat; hoc enim experientiæ repugnat.

2. Hujus capitula carnosæ, calicè, floribus ac semine resectis, ex aquâ cum butyro, sale & pipere suave edulium præbent. *Gesn.*

3. Chamæleonem album idèò Ixiam appellatum ait Dioscorides, quòd quibusdam in locis Viscum ad ipsius radices inveniatur, quo etiam pro Mastiche utuntur mulieres. Hæc appellatio ab aliis Chamæleoni etiam nigro rectè tribui dicitur: quin & plantæ cuidam venenatæ ab utroque Chamæleonte distinctæ, cujus meminit Dioscorides lib. 6. competit, autore Guilandino, quem consule aliòsque herbarios, qui plura de hac voce habent.

*Carthamus v. Cnicus.*

*Carlina sylvest. vulgaris Clus. Cnicus sylv. spinosior C. B.* An sylv. spinosior polycephalos *ejusdem*? Hujus plantæ radix est diuturna, cum vulgaris nostratis annua ferè sit; plures quoque ab eadem radice caules ei exeunt, cum vulgari unus tantum: Denique floris color in hæc flavus est, in nostrate pallidè luteus. *v. Cat. Ang.*

*Caryophyllata montana Park. Ger. montana flore magno luteo J. B. VI, sive Alpina lutea C. B.* In montibus altissimis maximo Carthusianorum cœnobio imminentibus.

*Caryophyllus arvensis umbelliferus J. B. arvensis umbellatus Park. holosteus arvensis Ger. holosteus arvens. V, sive arv. umbellatus folio glabro C. B.* Inter segetes propè Lovanium.

*Caryophyllus gramineo folio minimus seu saxifraga Cæf. Caryoph. faxat. IX, sive minimus muralis C. B. Betonica coronaria sive Tunica minima J. B.* Circa Genevam, Florentiam, Lansbergum & alibi tam in Italia, quàm in Germania copiosum vidimus.

† *Caryophyllus sylv. humilis flore unico C. B. &c.* Hunc in Anglia variis in locis sponte natum vidimus. *v. Cat. Ang.*

*Caryophyllus simplex laciniatus I, seu flore tenuissimè dissecto C. B. Betonica coronaria tenuissimè dissecta, sive Caryophyllea superba elatior vulgaris J. B.* In montibus Genevæ propinquis, minùs tamen frequens; invenimus & in Germania, non longè a Weissenberg Franconiæ oppido.

*Caryophyllus montanus major flore globofo C. B. Caryophyllus flos aphyllorcaulos, vel junceus major J. B. Caryophyllus mediterraneus Ger.* In collibus propè Moguntiam

guntiam. Non alia in re quàm magnitudine omnium partium à vulgari five maritimo nostrate differre videtur.

N. Mirum alicui videri possit, plantam hanc, quæ nullibi apud nos quàm in maritimis oritur, in regionibus transmarinis tam procul à mari provenire. Verùm nos alias præter hanc maritimas in mediterraneis nascentes observavimus, v. g. Tragon Matthioli five Kali spinosum in arenosis propè Viennam Austriæ; Rhamnum secundum Clusii non longè ab Augusta Vindelicorum; Althæam vulgarem variis Germaniæ in locis. Quin & Tragus lib. 1. cap. 39, scribit se invenisse magnâ copiâ in agro Vangionum inter segetes Papaver corniculatum luteum, quod in Anglia nusquam nisi in arenosis Oceani litoribus provenit.

Caryophyllus holosteus Alpinus tenuifolius Lini flore albo: In ascensu montis Juræ propè supremum verticem *Thuri*.

N. Aqua florum sylvestris Caryophylli destillata singulari experimento ad pellendum calculum mensurâ trium aut quatuor cochlearium bibitur. *J. B.*

Caryophyllus sylv. vulgatissimus & Car. sylv. prolifer v. *Armeria*.

Cassia poetica Lobelii *Ger.* poetica Monspelienfium *Park.* Osyris frutescens baccifera *C. B.* Cassia lignea Monspelienfium *J. B.* In Italiâ ad mare inferum, itémque circa Monspelium plurimâ.

Catanance Dalechampii flore cyani, folio coronopi *J. B.* Chondrilla cærulea cyani capitulis *C. B.* Chondrilla Sesamoides dicta *Park.* Sesamoides parvum Matthioli *Ger.* In aridis & saxosis collibus agri Narbonensis passim obvia; invenimus etiam propè Gratianopolim eundo ad max. Carthus. cœnobium.

Caucalis albis floribus *Ger.* vulgaris albis floribus *Park.* IV, five arvensis echinata magno flore *C. B.* Lappula canaria flore pulchro magno albo *J. B.* Inter segetes in Germania passim, itémque circa Genevam & Monspelium.

Caucalis maritima supina echinata magno fructu. Lappula canaria five Caulalis maritima *J. B.* XI, five pumila maritima *C. B.* In arenosis Siciliæ litoribus propè Messanam & alibi.

Caucalis minor pulchro semine five Bellonii *J. B.* Sefeli Creticum minus *C. B.* *Ger.* Tordylium, five Sefeli Creticum minus *Park.* In Sicilia intra ipsa urbis Messanæ mœnia.

Caucalis Peucedani folio *Ger.* XII, five folio Peucedani *C. B.* *Park.* Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibusdam Cau-



## CATALOGUS STIRPIUM

calis *J. B.* In planitie quadam propè Augustam Vindellicorum in Germania.

*Cedrus* *Lycia* retusa *Bellonio* dicta *J. B.* baccifera I, seu folio *Cupressi* major, fructu flavescente *C. B.* *Cedrus* *Phœnicea* folio *cupressi* *Park.* *Oxycedrus* *Lycia* *Ger.* Ab hac non diversam existimamus secundam speciem *Cedri* bacciferae *C. B.* ut neque tertiam, cum ipse asserat eas magnitudine solâ differre. Fortè etiam *Sabina* baccifera dicta ab hac non fuerit diversa: certè hæc nobis *Montpelii* ostensa fuit pro *Sabina* baccifera. Et nos quoque in eadem planta observavimus inferiores & primos in tenellis plantis ramulos foliis pungentibus & acutis, superiores verò & in adultioribus obtusis & rotundis vestitos.

*Centaurium* luteum pusillum *C. B.* minimum luteum *Park.* luteum novum *Col.* *Centaurii* lutei varietas *Ger. emac.* In testò veteris ædificii *Baiani* *Piscina mirabilis* dicti. Solo floris colore à minore purpureo differre videtur.

*Centaurium* minus spicatum album *C. B.* *Park.* In agro *Montspeliensi* & alibi in *Narbonensi* Gallia flore purpureo frequens.

*Cerinth* asperior flavo flore *Ger.* major flavo flore *Park.* *Cer.* quorundam major spinoso folio, flavo flore *J. B.* flore flavo asperior *C. B.* In Italia & Sicilia admodum frequens.

*Cerinth* major *Ger.* major flore luteo & rubro *Park.* quorundam major, versicolore flore *J. B.* *Cerinth*, seu *Cynoglossum* montanum majus *C. B.* In montibus sylvestribus max. *Carthus.* cœnobio imminentibus. Perennis mihi visa est hæc planta: semina a. ei minora sunt quàm vel purpureæ vel flavæ.

*Cerasus* sylv. amara *Mahaleb* putata *J. B.* *Cerasus* XV, five *Ceraso* affinis *C. B.* *Macaleb* *Gesneri* *Ger.* *Machaleb* *Germanicum* *Park.* qui *C. Bauhinum* reprehendit, quòd confundat *Machaleb* *Matthioli* & *Gesneri*. In sepibus propè *Gratianopolin* quâ itur à *la grand Chartruse*. Nuclei hujus fructus calefaciunt & emolliunt, saponarios globulos ingrediuntur, pilosque horridiores & duriores emolliunt affricu crebro *Matth.* Ex iis etiam oleum conficitur jucundi odoris, quo ad illinendas manicas utuntur. *Lugd.*

*Ceratia* v. *Siliqua*.

*Cerrus* minore glande *Ger.* *Haliphlaeos*, five *Cerrus* fœmina minore glande *Park.* *Quercus* *Burgundica* calice hispido *J. B.* VI, five calice hispido, glande minore *C. B.* In *Etruria* ad lacum *Volsiniensem*. Vidimus *Venetis* *Cerri* glandium calices maximos, quos *Vallonia* ibi appellant, ab *Apollonia* *Dalmatiæ* urbe vulgò nunc *Vallonia* dictâ, unde

unde adferuntur. His coriarii utuntur ad coria sua densanda. J. Bauhinus horum usum esse ad inficiendos atro colore pannos Gallarum vice scribit.

Chamæbalanus leguminosa *J. B.* Lathyrus arvensis repens tuberosus *C. B.* Lathyrus arvensis, sive Terræ glandes *Park.* Terræ glandes *Dod. Lob. Ger.* In arvis juxta Genevam & alibi.

N. 1. Hujus radices tuberosæ sapore sunt subdulci Glandis aut Castaneæ, astringente, flatulentum, suavem tamen succum creant: Sanguinis, uteri, renum, ventris fluores compescunt. *Lob.*

2. Ex hujus floribus aquam distillant quidam, qui ita rosaceam ementitur, ut pro illa nonnunquam vendi solet. *Cam.*

Chamæbuxus flore Coluteæ *v.* Anonymus flore Coluteæ.

Chamæcyparissus *v.* Abrotanum fœmina.

Chamæcistus *v.* Helianthemum.

Chamæcerasus Alpina *v.* Periclymenum.

Chamædryas major *Park.* major latifolia *Ger.* major repens *C. B.* Itinere à Vienna ad Venetias.

Chamædryas vulgaris *Park.* minor *Ger.* minor repens *C. B.*

Chamædryas vulgò vera existimata *J. B.* In Italia & Gallia frequens.

Chamædryas laciniatis foliis *Park. Lob. ob.* Chamæpitys fœmina *Ger.* Botrys chamædryoides *C. B. Bot.* verticillata *J. B.* In Germaniæ agris sterilioribus itémque circa Genevam passim.

Chamædryas falsa maxima, an Teucrium I, seu majus Pannonicum Clusio *J. B.* Chamædryas spuria major altera sive frutescens *C. B. Ch. ma. sp.* frutescens *Park.* Teucrium majus Pannonicum *Ger. emac.* In sylvosis Germaniæ atque etiam circa Genevam plurimis in locis.

† Chamædryas spuria montana Cisti flore *Park. Ch.* Alpina flore Fragariæ albo *J. B. Ch.* Alpina Cisti flore *C. B.* Teucrium Alpinum Cisti flore *Ger.* In montis Juræ supremis jugis: invenimus & in Alpibus Carinthiacis. Hanc in Hybernia invenit D. Heaton. *v. Cat. Ang.*

Chamædryi vulgari falsæ aliquatenus affinis, & Clinopodium Alpinum Pona *J. B.* Clinopodium Alpinum *Park.* Teucrium Alpinum comâ purpureo-cæruleâ *C. B.* In suprema parte montis Juræ, & in Alpibus Sabaudicis.

Chamædryas spuria angustifolia *J. B.* spuria major angustifolia *C. B.* Veronica supina *Ger.* Teucii facie *Park.* supina, facie Teucii pratensis *Lob.* Circa Genevam & in Germania in pascuis propè Rhenum frequens.

Chamægenista *v.* Genistella minor.



## CATALOGUS STIRPIUM

*Chamelæa triccocos* *J. B. C. B. Park.* *Arabum triccocos*  
*Ger. Widow-wail.* Inter *Monspelim* & *Frontignanam*  
in collibus saxosis plurimam vidimus.

*Chamelæa Germanica* *v. Mezereon.*

*Chamæmelum vulgare leucanthemum* *Dioscoridis C. B. vul-*  
*gare amarum J. B.* Inter segetes circa *Genevam*.

*Chamæmelum chrysanthemum v. Bupthalmum vulgare* *Ger.*

*Chamæmespilus* *Ger. v. Cotoneaster.*

*Chamæmespilus J. B. Cotoneaster folio oblongo ferrato C. B.*  
*Cotonaster Gesneri Ger. emac.* in *Append.* In summitate  
montis *Juræ.*

*Chamænerion Gesneri Lob. alterum angustifolium Ger. Ly-*  
*simachia Chamænerion dicta angustifolia C. B. Lys. filiquosa*  
*angustifolia, Chamænerion Gesnero dicta Park. Lys. filiq.*  
*speciosa angustifolia J. B.* In alveis torrentum & fluvio-  
rum in *Foro Julii* *Italiæ* & alibi variis in locis, v. g.  
*Genevæ* ad fluv. *Arve* & *Rhodanum.*

*Chamæpitys moschata foliis ferratis C. B. Cham. five Iva*  
*moschata Monspeliensium J. B. Iva moschata Monspe-*  
*liaca Ger. Anthyllis altera herbariorum Park.* In saxosis  
collibus circa *Monspelim* & alibi in *Gallia Narbonensi*;  
itémque in insula ad *Promont. Pachynum.*

*Chamærrhiphes Dod. Lob. Palma minor C. B. Palma hu-*  
*milis spinosa J. B. Palmites five Chamærrhiphes Ger.*  
*Palma humilis, five Chamærrhiphes, vel Palmites Park.*  
In insula ad *Promont. Pachynum* *Siciliæ*, itémque in ru-  
pibus maritimis *Hetruriæ.*

N. 1. Species illa quam nos observavimus spinosa fuit,  
prout rectè eam describit *Matthiolus*, diversa ergo à *Pal-*  
*ma humili Hispanica* non spinosa. *Figuræ a.* apud *Par-*  
*kinsonum* transpositæ sunt.

2. Pars tuberosa juxta radicem, tenerrima, sapida &  
ori gratissima (*Encephalum* vocant) estur secundis mensis  
pro bellariis, cardui esculenti modo, cum pipere & salis  
momento; adstringenti facultate pollet. *Matth.* Ad *Ve-*  
*nerem* excitandam haud parùm præstare creditur. E fo-  
liis *Hispanicæ sportulæ*, tegetes & scopæ fiunt.

*Chamælyce Dod. Lob. C. B. J. B. Ger. Park.* In vineis &  
agris *Italiæ*, *Siciliæ* & *Galliæ Narbonensis.*

*Chondrille vel Chondrilla cærulea J. B. Ch. cærulea five*  
*purpurea Park. cærulea Ger. cærulea altera Cichorei sylv.*  
*folio C. B.* In *Germania superiore* inter *Confluentes* &  
*Moguntiam* secus *Rhenum flumen.*

*Chondrilla lutea J. B. Coronopi aut Cyani facie, tenui-*  
*folia lutea vinearum Lob.* In aggeribus & vineis circa  
*Monf-*

Monspelim & ad muros ipsius urbis. Ad Sonchum lævem vulgarem proximè accedit.

Chondrilla rare purpurea, Crupina Belgarum dicta *Park.* rara, purpurante flore, semine nitido deciduo *Lob.* Hispanica *Ger.* foliis laciniatis, ferratis, purpurascente flore *C. B.* Cyanus pulchro semine Centaurii majoris *J. B.* Circa Monspelim in colle *Castri novi*, necnon propè *Scaleam* in Regno Neapolitano.

Chondrilla foliis non dissectis, caule nudo *J. B.* Ad radices montis Salevæ, & in arenosis ad fluv. *Arve* propè *Genevam*.

Chondrilla juncea *Ger.* juncea viscosa arvensis, quæ prima Dioscoridis *C. B.* viminea *J. B.* viminalibus virgis *Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi, in arenosis copiosè.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto *C. B.* viscosa faxatilis caule *κννμυδσοφρω Col.* In Sicilia circa Messanam, & in Gallia Narbonensi circa Monspel.

Chondrilla bulbosa, conyzæ facie, foliis angustioribus *C. B.* Conyza marina *Lugd. J. B.* In planitie quadam non longè à monte Lupi. Hæc planta Conyza aut Aster rectiùs dicitur quàm Chondrilla.

Chondrilla cærulea cyani capitulis *C. B. v.* Catanance.

† Christophoriana *Lob. Ger.* vulgaris *Park.* Aconitum racemosum, Actæa quibusdam *J. B.* Acon. racemosum, an Actæa Plinii? *C. B.* In sylvis montosis circa Genevam, & in Germania ad Rhenum copiosè, Nuperrimè & hæc quoque in Anglia sponte orta nobis ostensa fuit.

Chrysanthemum Bellidis folio *hort. Pat.* latifolium *J. B.* Hispanicum rotundioribus foliis *Park.* Bellis lutea III, five foliis subrotundis *C. B.* Inter segetes circa Liburnum portum copiosè.

Chrysanthemum Creticum *Ger. J. B. Park.* majus, folio in minores lacinias diviso *C. B.* In vineis & hortis oleaceis circa Messanam & alibi.

Chrysanthemum Valentinum *Clus. v.* Bupthalmum Cotulæ folio.

Chrysocome *v.* Stœchas citrina.

Chrysocome capitulis conglobatis *Ger.* Helichrysum IX, five sylvestre angustifolium capitulis conglobatis *C. B.* Stœchas citrina altera odora *Park.* Stœchadi citrinæ alteri inodoræ Lobelii affinis capitulis brevioribus *J. B.* In muris & rupibus circa Messanam in Sicilia, Tolonam in Galloprovincia, &c.

Cicer sylvestre *Matth. Ger.* sylv. multifolium *J. B.* sylv. foliis oblongis hispidis majus *C. B.* sylv. majus *Park.* In-



ter segetes non longè ab oppido *Jay* Genevam versùs. Hæc planta (me judice) ad *Glycyrrhizam* sylv. propius accedit quàm ad *Cicer*.

*Cicer sativum* *Ger. C. B. arietinum J. B. sativum*, five *arietinum rubrum*, *nigrum vel album Park.* Cicera in Italia, Sicilia & Melita in agris feruntur, ubi Rustici ea cruda comedunt, viridia scilicet & adhuc immatura.

N. Quod cicera urinam & menses cieant, calculos pellant, ad Venerem stimulent, flatus gignant, ferè omnes tum Veteres, tum Recentiores consentiunt. Extrinsecus adhibetur farina in cataplasmatis.

*Cichorium spinosum Ger. J. B. C. B. spinosum Creticum Park.* In insula sæpius memorata ad Promont. Pachynum in Sicilia.

*Cichorium pratense vesicarium Park. Col. prat. hirsutum vesicarium C. B.* In sepibus & agrorum marginibus à Liburno portu non longè.

*Cichorium verrucarium five Zacintha Ger. Park. verrucosum, five Zacyntia hieraciis adnumerandum J. B. Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus C. B.* Ad ostia Tybridis copiosè: itémque circa Liburnum portum, & Florentiam.

*Cicutaria latifolia hirsuta J. B. palustris alba Park. palustris latifolia alba C. B. palustris latifolia rubra ejusdem* ab hac fortè non differt specie. In pascuis montosis Juræ & Salevæ montium propè Genevam, præcipue ad rivulos.

*Cinara sylvestris Ger. sylv. latifolia C. B. Scolymus Dioscoridis Park. Carduus Scolymus sylvestris J. B. Wild Artichoke.* In Sicilia & Italia, necnon Gallia Narbonensi; ubi floribus ejus coaguli vice ad lac condensandum utuntur.

N. 1. Apponuntur capita [sativæ] aqua decocta; eorumque pulpa estur cum butyro & pipere; nec tantùm capita nondum florescentia, sed & caules teneriores elixatos & cum butyro conditos comedunt Germani & Galli. Itali rarò decoquunt, sed cruda cum sale, oleo & pipere vorant. Venerem in utroque sexu irritant, ut quod maxime; unde nil mirum si in tanto pretio sint, ut sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, vix ulla opipara sit aut adjicialis cœna. Scolymus quoque urinam ciere præcipue traditur. *J. B. Plin.*

2. *Cinaræ* [sativæ] folia in liquore posseti [è lacte & vino albo] decocta ad icterum imprimis commendantur, ut medicamentum nulli secundum.

*Circæa Lutetiana minor Park. minima Col. Solanifolia Circæa Alpina C. B.* In sylvis montosis max. *Carthusianorum cœnobio* vicinis.

*Cirsium*

*Cirsium* v. *Carduus* *Cirsium* dictus *J. B.*

*Cirsium* foliis non hirsutis, floribus compactis *C. B.* montanum capitulis compactis *Park.* *Carduus* *Cirsium* *Monspelianum*, folio glabro longo *Matthioli J. B.* Ad *Ladum annem* & alibi propè *Monspelim*.

*Cirsium* foliis non laciniatis virore *Brassicæ J. B.* Hujus iconi valde simile fuit quod invenimus propè *Plombinum* in *Etruria*.

*Cistus* annuus 2 *Clusii Ger.* annuus flore guttato *Park.* flore pallido, punicante maculâ insignito *C. B.* annuus 2 *Clusio*, flore pallido, punicante maculâ insignito *J. B.* Ad radices *Vesuvii* montis, ubi tamen maculam non habet. Vide *Columnam*. Suspiciatur *J. Bauhinus* plantam hanc eandem esse *Cisto* annuo flore guttato *Ponæ* & *Tuberariæ Myconi*; nec sine ratione.

*Cistus* fœmina *Ger.* fœm. *Monspeliaca J. B.* fœm: vulgaris *Park.* fœm. folio *Salviæ C. B.* Per *Siciliam*, *Italiam* & *Galliam Narbonensem* in sterilibus & saxosis collibus & sylvis. Duplex habetur, elatior & humilior, ut rectè notat *C. Bauhinus*.

*Cistus* *ladanifera Monspeliensium C. B.* *ladanifera*, sive *Ledum Monspeliacum* angusto folio nigricans *J. B.* *Cistus ledon* 5 *Clusii Ger.* An *Cistus Ledon IX*, i. e. foliis *Oleæ* sed angustioribus *C. B.* ? In iisdem cum priore locis, & multò etiam copiosior.

*Cistus* *mas* folio oblongo incano *C. B.* *mas* 4, folio oblongo albido *J. B.* *mas* cum *Hypocistide Ger.* *mas* vulgaris *Park.* Cum prioribus. Cum *Clusius* in *Hispania* tot *Cisti* species invenerit, mirum nos neque in *Italia*, neque in *Sicilia*, neque in *Gallia Narbonensi*, alias observâsse species quàm tres proximè scriptas.

N. 1. Hujus folia & tenella germina, sed præcipuè flores desiccant & astringunt strenuè, unde & dysentericis & solutionibus ventris prosunt, & ulcera sanant.

2. *Cisti* radicibus adnascitur *Hypocistis* dicta, quemadmodum *Rapum Genistæ*; Hæc magis adstrictoria est quàm *Cisti* folia, unde ad omnes fluxiones, hæmorrhagiam, profluvia muliebria, cœliacos, dysentericòsque affectus prodest. Succus ejus in usu est. Cæterum *Hypocistin*, quæ passim utuntur *Officinæ*, ex *Hirci* barbæ radicibus impositores consciunt, succum inde exprimentes, ac ut concre scat insolantes. Errandi causam dederunt *Arabes*, quòd *Cistum* *Hirci* barbulam appellent. *J. B.*

3. E foliis *Cisti* (*Ledon* appellati) exudat liquor quidam, *Ladanum* dictus, in massas graves ex purpura fuscas coactus, odore valido sed suavi, inflammabilis, accensùsque



## CATALOGUS STIRPIUM

gratum odorem halans. Tradit Dioscorides succum hunc hircorum barbis dum fruticem depascuntur adhærescere, indeque depecti. Quidam etiam (inquit) funiculos per frutices trahunt, & adhærentem ipsis pinguedinem ita derasam efformant. Bellonius hujus colligendi rationem, quam ipse in Creta observavit, ita describit, Græci (inquit) colligendo Ladano peculiare instrumentum parant rastro dentium experti simile, *Ergastiri* illis dictum. Huic affixæ sunt multæ ligulæ sive zonæ è corio rudi nec præparato confectæ, eas leniter affricant ladaniferis fruticibus, ut inhæreat liquidus ille humor circa folia concretus, qui deinde à ligulis per summos ardores solis cultris est abradendus.

3. Ladanum emollit, digerit, maturat, attenuat, aperit, orificia venarum referat, inspissat. Usus præcip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria, &c. Extrinsecus ejus usus est in emplastris emollientibus, anodynis, tussim sedantibus, in Alopecia (inunge vel coque in vino & lava) in odontalgia, & cardialgia doloréque ventriculi (cum modico Bdellii pilulas faciunt dandas num. 1. & 2. horâ 1. ante pastum. *Crato.*) in suffocatione uteri (introrsum adhibitum) cicatrices curat. *Schrad.*

Clematis five Flammula surrecta alba *J. B.* Clematidis VI, five Flammula recta *C. B.* Flammula Jovis surrecta *Ger. Park.* In sepibus ad montes propè Ratisbonam in Germania.

Clematis five Flammula repens *C. B.* Clem. five Flammula scandens, tenuifolia alba *J. B.* Clem. urens *Ger.* urens flore albo *Park.* Circa Monspelium in collibus saxosis.

N. Hujus olea facultatis sunt acris & adurentis, imposita cutem exulcerant: intra corpus vix tutò assumuntur.

Clematis Daphnoides major *C. B.* ma. flore cæruleo & albo *J. B.* Daphnoides five Pervinca major *Ger.* Clematis Daphn. latifolia, five Vinca Pervinca major *Park.* Circa Monspelium variis in locis. Vires Clematidis vide in *Cat. Ang.*

Clinopodium v. Acinos. Alpinum v. Chamædryi vulgari, &c.

Cneorum *Matth.* v. Thymelæa minor *Cordi.*

Cnicus sativus five Carthantum Officinarum *C. B.* Cnicus five Carthamus sativus *Park.* Carthamus five Cnicus *J. B.* *Ger. Bastard Saffron.* Ab hortulanis Argentinesibus & Spirensibus quotannis inter æstivas fruges se-ritur.

N. 1. Flos,

N. 1. Flosculis tufis condimenti vice utuntur nec malè, cibos namque croceo colore commendant, & alvum emolliunt: dicuntur & iſtero mederi.

2. Præcipuus florum ufus eſt ad ſericum aliòſque pannos tingendos, [colore incarnato] quin & eorum admixtione Crocum adulterant.

3. Medulla ſeminis pituitam viſcoſam ac aquas vomitu & dejectione purgat: peſtori maximè confert, mirè flatus diſcutit, proinde colicis & anafarcæ conducit. Ventriculo adverſatur, ideòque corrigitur ſtomachicis, anif. galang. zinzib. &c. Doſis in infuſo à ʒiij. ad vj.

4. Ex ſemine facta compoſitio diacarthami inſigniter confert hydropicis.

5. Seminis ſuccus lac cògere dicitur, & magis ipſum reſolvendæ alvi facultate donare.

Coccygria aut Coggygria v. Cotinus.

Colus Jovis v. Horminum luteum.

Colutea Ger. veſicaria C. B. ʒ. B. veſicaria vulgaris Park.

In Italia multis in locis reperitur, & ſpecialim in aſcenſu montis Veſuvii plurima, ubi nullæ ferè aliæ plantæ. Habetur etiam circa Monſpelium.

Colutea ſcorpioïdes Ger. ʒ. B. Scorp. major Park. filiquoſa five ſcorpioïdes major C. B. In collibus circa Genevam, Monſpelium & Salernum.

Colutea minima five Coronilla Ger. Coluteæ parva ſpecies, Polygala Valentina Cluſii ʒ. B. Polygala Valentina Cluſii Park. Polygala altera C. B. In clivis maritimis prope Salernum, atque etiam in Hetruria.

Colutea caule Geniſtæ fungoſo ʒ. B. qui titulus optimè reſpondet huic noſtræ. Polygala I, ſeu major Maſſiliotica C. B. Polygala Valentina 3 Cluſ. Val. marina Cluſii Park. ſub quinta. In Gallo-provinciæ clivis montofiſ prope oppidum S. Chamas.

N. Hujus folia, ſed præcipuè ſemina, non ſolùm purgant per inferiora, ſed & vomitiones movent, velut ſemina Geniſtæ; ſunt autem ventriculo & viſceribus inimica, ideòque nonniſi robuſtioribus exhibenda.

Conſolida media Genevenſis ʒ. B. An Conſolida media cærulea Alpina C. B. ? Bugula Alpina cærulea Park. Ad agrorum margines circa Genevam & Baſileam copioſè.

Conſolida regalis v. Delphinium.

Convolvulus Althææ folio Park. argenteus Althææ folio C. B. Ger. emac. peregrinus pulcher folio Betonicæ ʒ. B. Circa Meſſanam in lingua inter fretum Siculum & portum Meſſanenſem procurrente, inter frutices copioſè.

Con-



## CATALOGUS STIRPIUM

*Convolvulus cæruleus minor folio oblongo Ger. VII, five peregrinus cæruleus folio oblongo C. B. An minor cæruleus Hispanicus Park? In insula ad Promont. Pachynum. Flos huic pulcher cæruleus.*

*Convolvulus spicæ-folius Park. minimus spicæ-folius Ger. Ad. Lob. Linariæ folio C. B. Volvulus terrestris J. B. In Italia, Sicilia & Narbonensi Gallia vulgarissima.*

*Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis C. B. major verior Dioscoridis Park. major Monspeliensis odorata J. B. odorata Ger. In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi passim.*

*Conyza minor vera Ger. J. B. minor vera Ponæ Park. fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis C. B. Circa Monspelim & in Italia ad mare inferum.*

*Conyza quædam marina. Propè Peroul non longè à Monpelio.*

*Conyza marina J. B. v. Chondrilla.*

*Coris cærulea maritima C. B. cærulea Monspeliaca Ger. Monspeliensium Park. Monspessulana purpurea J. B. In arenosis maris litoribus propè montem Ceti & alibi.*

*Cornus mas Ger. sylv. mas C. B. mas fructu rubro Park. fativa five domestica J. B. In sepibus Pedemontanis & Mediolanensibus.*

N. Corna refrigerant, exiccant, adstringunt, constipant quomocunq; sumpta. Hinc conveniunt præcipuè in diarrhœa ac dysenteria: ardorem febrilem & sitim gratâ suâ aciditate leniunt & restinguunt.

2. Condiuntur muriâ ut Olivæ; fit etiam ex iis sapa quemadmodum ex cerasis; itémq; è pulpa electuarium, ad febres, ad fluxiones biliosas, ad sitim, ad excitandam appetentiam utilia. In diarrhœa & dysenteria exhibentur fructus exiccati & pulverisati ad 3i.

3. Cornum arborem caveri oportet circa alvearia, nam flos ejus degustato alvo concita moriuntur apes. *Plin.*

4. Hujus lignum omnibus lignis durius perhibetur, ad radios rotarum utilissimum; quin & eundem habet effectum in demorsis à cane rabido quem fœmina Cornus.

*Coronopus foliis acutis in margine dentatis. Plantagini affinis Bibinella Siciliæ herbula J. B. Hæc planta optimè describitur à Cæsalpino sub titulo Bibinellæ. Non est a. Plantago maritima nostras, nec ei multum similis, quamvis C. Bauhinus eandem faciat. Plantago Apula bulbosa laciniata Col. i. e. angustifolia VII, five Plantago pilosa bulbosa C. B. Apula bulbosa Park. huic nostræ persimilis est, & fortasse eadem, verum an bulbosam habuerit radicem non animadvertimus.*

Propè

Propè Messanam in lingula quæ portum efficit, & alibi in Sicilia.

Coronopus Massiliensis Lobelii *J. B.* Coron. five Serpentina minor *Ger.* Holosteum VIII, five Massiliense *C. B.* An VI, five strictissimo folio majus *ejusdem?* Verùm quicquid de aliis sit, Planta quam volumus ipsissima est quam Lobelius describit; namque in eodemmet loco eam invenimus Massiliæ.

Coronopus maritimus Rainaudeti *J. B.* Coronopi & Sedi montani media planta Massiliensium *Lob.* In arenosis ad mare propè Massiliam.

Corruda *v.* Asparagus sylvestris.

Cotonafter folio oblongo *v.* Chamæmespilus.

Cotoneafter Gefneri *J. B. Park.* Cotonafter folio rotundo non ferrato & Chamæmespilus Cordi *C. B.* Chamæmespilus *Ger.* Epimelis *Lugd.* In montibus propè Genevam & Rhenum flumen.

Cotinus *Matth.* Coccygria five Cotinus putata *J. B.* Coggygria Theophrasti vel Cotinus coriarius Plinii *Ger.* Coggigria five Cotinus coriaria *Park.* Cocconilea five Coggygria *C. B.* Propè pontem quæ transitus est eundo à Gratianopoli à la fontaine que brûle.

Cotyledon media foliis oblongis ferratis *C. B. v.* Sedum.

Crithmum 4 *Matth. v.* Eryngium.

Crithmum spinosum *Ger.* maritimum spinosum *C. B.* marit. spinosum five Pastinaca marina *Park.* Pastinaca marina, quibusdam Secacul, & Crithmum spinosum *J. B.* In arenosis Maris Mediterranei litoribus nusquam non obvium.

Crocus vernus latifolius flore purpureo *Ger.* vernus minor purpurascens *C. B.* vernus latifolius flore purpureo minore *J. B.* In agris & pascuis Romæ vicinis; inque montosis pascuis circa Curiam Rhætorum, necnon in summitatibus montis Juræ.

Cruciata minima muralis *Col.* minima in maritimis *Cæs.* Rubia echinata saxatilis *Park.* Rubeola echinata saxatilis *C. B.* Rubia quadrifolia verticillato semine *J. B.* In arenosis juxta mare propè Liburnum.

Cucumis asininus *Ger.* agrestis five asininus *Park.* sylv. asininus dictus *C. B.* sylv. five asininus *J. B.* Cucumis Elaterii sylv. *Lob.* In locis ruderatis & ad vias in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi frequens.

N. Hujus succus leniter expressus ac inspissatus Elaterium dicitur. Ultra 100 annos efficax manere creditur. Aliis maximè probatur quod lucernæ objectum facillè flagrat; aliis quod lucernis admotum lumen extinguat. *v. Park. & J. B.* Humores serosos vehementer purgat supernè & infernè,



## CATALOGUS STIRPIUM

*Convolvulus cæruleus minor folio oblongo Ger. VII, five peregrinus cæruleus folio oblongo C. B. An minor cæruleus Hispanicus Park?* In insula ad Promont. *Pachynum*. Flos huic pulcher cæruleus.

*Convolvulus spicæ-folius Park. minimus spicæ-folius Ger. Ad. Lob. Linariæ folio C. B. Volutus terrestris J. B. In Italia, Sicilia & Narbonensi Gallia vulgarissima.*

*Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis C. B. major verior Dioscoridis Park. major Monspelienfis odorata J. B. odorata Ger. In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi passim.*

*Conyza minor vera Ger. J. B. minor vera Ponæ Park. scemina Theophrasti, minor Dioscoridis C. B. Circa Monspelium & in Italia ad mare inferum.*

*Conyza quædam marina. Propè Peroul non longè à Monspelio.*

*Conyza marina J. B. v. Chondrilla.*

*Coris cærulea maritima C. B. cærulea Monspeliaca Ger. Monspelienfium Park. Monspeffulana purpurea J. B. In arenosis maris litoribus propè montem Ceti & alibi.*

*Cornus mas Ger. sylv. mas C. B. mas fructu rubro Park. sativa five domestica J. B. In sepibus Pedemontanis & Mediolanensibus.*

N. Corna refrigerant, exiccant, adstringunt, constipant quomodocunq; sumpta. Hinc conveniunt præcipuè in diarrhœa ac dysenteria: ardorem febrilem & sitim gratâ suâ aciditate leniunt & restinguunt.

2. Condiuntur muriâ ut Olivæ; fit etiam ex iis sapa quemadmodum ex cerasis; itémq; è pulpa electuarium, ad febres, ad fluxiones biliosas, ad sitim, ad excitandam appetentiam utilia. In diarrhœa & dysenteria exhibentur fructus exiccati & pulverisati ad 3i.

3. Cornum arborem caveri oportet circa alvearia, nam flore ejus degustato alvo concita moriuntur apes. *Plin.*

4. Hujus lignum omnibus lignis durius perhibetur, ad radios rotarum utilissimum; quin & eundem habet effectum in demorsis à cane rabido quem scemina *Cornus*.

*Coronopus foliis acutis in margine dentatis. Plantagini affinis Bibinella Siciliae herbula J. B. Hæc planta optimè describitur à Cæsalpino sub titulo Bibinellæ. Non est a. Plantago maritima nostras, nec ei multum similis, quamvis C. Bauhinus eandem faciat. Plantago Apula bulbosa laciniata Col. i. e. angustifolia VII, five Plantago pilosa bulbosa C. B. Apula bulbosa Park. huic nostræ perfoliata est, & fortasse eadem, verum an bulbosam habuerit radicem non animadvertimus.*

Propè

Propè Messanam in lingula quæ portum efficit, & alibi in Sicilia.

Coronopus Massiliensis Lobelii *J. B.* Coron. five Serpentina minor *Ger.* Holosteum VIII, five Massiliense *C. B.* An VI, five strictissimo folio majus *ejusdem?* Verùm quicquid de aliis sit, Planta quam volumus ipfissima est quam Lobelius describit; namque in eodemmet loco eam invenimus Massiliæ.

Coronopus maritimus Rainaudeti *J. B.* Coronopi & Sedi montani media planta Massiliensium *Lob.* In arenosis ad mare propè Massiliam.

Corruda *v.* Asparagus sylvestris.

Cotonafter folio oblongo *v.* Chamæmespilus.

Cotoneaster Gefneri *J. B. Park.* Cotonafter folio rotundo non serrato & Chamæmespilus Cordi *C. B.* Chamæmespilus *Ger.* Epimelis *Lugd.* In montibus propè Genevam & Rhenum flumen.

Cotinus *Matth.* Coccygria five Cotinus putata *J. B.* Coggygia Theophrasti vel Cotinus coriarius Plinii *Ger.* Coggigria five Cotinus coriaria *Park.* Cocconilea five Coggygia *C. B.* Propè pontem quæ transitus est eundo à Gratianopoli à la fontaine que brusle.

Cotyledon media foliis oblongis ferratis *C. B. v.* Sedum.

Crithmum 4 *Matth. v.* Eryngium.

Crithmum spinosum *Ger.* maritimum spinosum *C. B.* marit. spinosum five Pastinaca marina *Park.* Pastinaca marina, quibusdam Secacul, & Crithmum spinosum *J. B.* In arenosis Maris Mediterranei litoribus nusquam non obvium.

Crocus vernus latifolius flore purpureo *Ger.* vernus minor purpurascens *C. B.* vernus latifolius flore purpureo minore *J. B.* In agris & pascuis Romæ vicinis; inque montosis pascuis circa Curiam Rhætorum, necnon in summitatibus montis Juræ.

Cruciata minima muralis *Col.* minima in maritimis *Cæs.* Rubia echinata faxatilis *Park.* Rubeola echinata faxatilis *C. B.* Rubia quadrifolia verticillato semine *J. B.* In arenosis juxta mare propè Liburnum.

Cucumis asininus *Ger.* agrestis five asininus *Park.* sylv. asininus dictus *C. B.* sylv. five asininus *J. B.* Cucumis Elaterii sylv. *Lob.* In locis ruderalis & ad vias in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi frequens.

N. Hujus succus leniter expressus ac inspissatus Elaterium dicitur. Ultra 100 annos efficax manere creditur. Aliis maximè probatur quod lucernæ objectum facillè flagrat; aliis quod lucernis admotum lumen extinguat. *v. Park. & J. B.* Humores serosos vehementer purgat supernè & infernè,



## CATALOGUS STIRPIUM

infernè, menses movet, foetumq; interimit. Verùm quia malignitate non caret corrigi debet *Lacte*, *Tragacantho*, *Bdellio*, & corroborantibus idoneis, ut *Cinnam.* *Spec.* *Diarrhod.* *Abbatis*, &c.

*Cyanus major* *Lob. Ger.* major vulgaris *Park.* *Alpinus* radice perpetua *J. B.* *montanus* latifolius, vel *Verbaiculum cyanoides* *C. B.* Primò invenimus in montibus juxta *Spadam* vicum, postea etiam in monte *Jurâ* sæpius memoratâ.

*Cyanus V.* sive repens latifolius *C. B.* peramarus repens folio *Lavendulæ* *J. B.* repens latifolius *Lobellii* *Park.* repens latifolius *Ger.* Circa *Monspelim* frequens. Rectius, meâ sententiâ, *Jaceis* annumeraretur.

*Cyclaminus* folio rotundiore elatior *J. B.* *Cyclamen orbiculato* folio infernè purpurascens *C. B.* orbiculato folio *Ger.* *Autumnale* vulgare folio rotundo *Park.* In montibus circa *Genevam* *Junio* & *Julio* floret; invenimus etiam in *Alpibus Stiriâcis*.

*N.* *Cyclamini* hujus caput interdum in longitudinem excrescit, & in duo velut cornua dividitur, ut nos cum *J. Bauhino* observavimus, cum in *Alpibus Stiriâcis* aliquot ejus radices erueremus. Proinde frustra multiplicat species. *C. Bauhinus*, cum *Cyclaminum* longius radicatum *Gesn.* & *Cycl.* radice instar capitis arietini ejusdem species ab hac distinctas facit.

*Cyclaminus* folio anguloso *J. B.* *hederæ* folio *C. B.* *Lob. Ger.* *autumnale* folio *hederæ* *Park.* In collibus sylvosis circa *Romam* abundat, mense *Septembri* florens.

*Cyclamen vernum* *Lob. Ger.* folio anguloso *C. B.* In sylvis quas transivimus itinere à *Massâ* ad *Lucam* primo vere floruit,

*N.* Hujus radix potenter incidit, aperit, absterg. errhinum est. Usus præcip. in obstructis mensibus, impellendo foetu mortuo, in ictero, in calculo expellendo, strumis ac tuberculis discutiendis. Internè cauto opus est; externo usui præstat. Adeò vehemens ejus facultas est (inquit *Galenus*) ut abdomine illito ventrem subducatur & foetum interimat. Icterus sanat experientiâ certâ prodente *Mesua*. Ad tinnitum aurium singulare est remedium oleum, &c. *v. Matth.*

*Cymbalaria* *C. B.* *Italica* *hederacea* *Park.* *Italica* *Ger.* flosculis purpurascens *J. B.* *Basileæ* in ipsius urbis muris; At in *Italia* nihil frequentius.

*Cuminum* sylvestre alterum *Dioscoridis* *Italarum* *Lob.* *Cuminum corniculatum*, sive *Hypecoon* *Clusii* *Ger.* *Hypecoon* *C. B.* *Hypecoon* siliquosum *J. B.* *Hypecoon legitimum* *Clusii* *Park.* In *Sicilia*, lingulâ illâ *Portum Messanensem* à freto *Siculo* dirimente,

*Cuminum*

Cuminum five Cuminum fativum *J. B. vulgare Park. fativum Ger. semine longiore C. B.* In insula Melita feritur.

Cuminum five Cuminum seminibus hirsutis seu villosis. In insula prædicta cum præcedente succrescit, sed rariùs. Hoc nescio an à quoquam hætenus sit descriptum.

N. Semen resolvit ac flatu discutit, ideòq; utile est in colica, tympanite & vertigine: tussim sedare & thoracem expurgare dicitur. Utiliter pani incoquitur, & caseis inditur, ita concoctionem juvat & flatu dissipat.

Cynoglossum minus *J. B. C. B. minus flore cæruleo Park.* Circa Moguntiam & Genevam se nobis in conspectum dedit.

Cyperus longus *Ger. longus odoratus Park. odoratus radice longa, five Cyperus Officinarum C. B. paniculâ sparsâ speciosâ J. B.* In pratis circa Monspelium; observavimus etiam in Italia & Sicilia.

N. Stomachica est ac uterina. Usus præcip. in urina ac mensibus ciendis, cruditate ventriculi consumenda, hydropo inchoato præservando, colica ac vertigine discutienda; ad ulcera oris & pudendorum exiccanda & sananda [pulvis inspersus] valere dicitur: masticata emendat oris foetorem. Cocta in oleo, contusa & imposita renibus ac pectini, urinam prorit. *Schrod.*

Cytisus glaber filiquâ latâ *J. B. Cytisus Ger. Cyt. glaber foliis subrotundis, pediculis brevissimis C. B. Pseudocytisus foliis subrotundis Park.* In clivis maritimis propè Salernum.

Cytisus incanus filiquis falcatis *C. B. Cyt. Maranthæ Matthiolo Lob. filiquâ incurvâ, folio candicante J. B. 7 cornutus Ger. Cyt. Galeni creditus Maranthæ, cornutus Park.* Ad Baias invenimus.

Cytisus hirsutus *J. B. Hispanicus arboreus Park. incanus vel hirsutus VI, five foliis subruffâ lanugine hirsutis C. B. Pseudo-cytisus hirsutus Ger.* Hic in magnum fruticem adolescit, estque in Italia & Sicilia vulgarissimus.

Cytisus sylvestris Ratisponensis floribus luteis, ad exortum foliorum prodeuntibus *horti Med. Altorffini.* In Suevia & Bavaria propè Ratisponam. Hic an descriptus sit, nondum scimus.

Cytisus Gesneri cui flores ferè spicati *J. B. glaber III, five glaber nigricans C. B. Cytisus Ger. Pseudo-cytisus niger Park.* In Austria & Stiria itinere à Vienna ad Venetias copiosum observavimus.

Cytisus Hispanicus 1 Clusii, folio virescente *J. B. minoribus foliis, ramulis tenellis, villosis C. B. ?* Dubitat J. Bauhinus an Cytisus suus montis *Calcaris* sit idem huic primo Clusii necne, & an uterq; sit idem Cytiso Lobelii in Adv. descripto,



descripto, quem viâ à Roma ad Florentiam in planitie propè *Aguas pendulas* invenit, ubi & nos hunc nostrum. Cortex ei glabra & candicans.

---

**D** Amasonium v. Helleborine.

*Daucus Creticus* semine hirsuto *J. B.* Alpinus, Cretico similis *Park.* Alpinus multifido longóq; folio, sive montanus umbellâ candidâ *C. B.* In summitate montis Juræ.

*Daucus 3 Dioscoridis Col.* Apium IX, sive peregrinum foliis subrotundis *C. B.* Visnaga minor quorundam, *Selinum peregrinum* Clusio, semine hirsuto *J. B.* *Selinum* sive Apium peregrinum Clusii *Park.* In sepibus circa Messanam Siciliæ urbem.

*Daucus glauco folio*, similis *Fœniculo tortuoso J. B.* In collibus inter vepres juxta *Castelneuf*, Monspelio non longè.

*Daucus montanus* Apii folio, flore luteo *C. B. Park.* In montosis propè Ratisponam primò, deinde etiam circa Genavam in monte Jurâ. Hujus foliorum divisura accedit ad *Pimpinellam saxifragam* minorem; eiq; satis aptè congruit icon *Park. & C. B.* Aliquando existimavi hanc fuisse *Umbelliferam Alsaticam* magnam, umbellâ parvâ luteâ *J. B.*

*Daucus felinoides v. Saxifraga Venetorum.*

*Delphinium simpliciflore* purpureo-cæruleo vulgare *J. B.*

*Consolida regalis arvensis C. B. regalis sylvestris Ger.*

*Delphinium* sive *Consolida regalis sylvestris Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi inter segetes.

*Delphinium flore cæruleo minore, folio lato. Flos Capucio 2 Cas.* *Consolida regalis latifolia* parvo flore *C. B. reg. peregrina, parvo flore J. B.* In insula Melita circa urbem novam in rudibus & muris. Vidimus etiam in Sicilia & Italia.

N. Visum acuit & roborat tum succus florum expressus, tum eorundem aqua destillata; imo vel continuus intuitus. In potionibus vulnerariis utile esse perhibetur, consolidat enim & glutinat, unde & *Consolidæ* nomen indeptum est. Et ut nihil omittam, tradit Jo. Bauhinus, Herbam in pulverem redactam cum ejusdem aqua stillatitia potam venenis adversari, cardialgiæ conferre, calorem præter naturam extinguere, bilem reprimere, necnon tussim & stillicidium.

Conserva

Conserva florum commendatur ad tormina ventris infantum, & ad ardorem stomachi. *Schrod.* qui *Calcatrippam* appellat. Dens caninus flore albo *Ger.* canis latiore rotundioréque folio *C. B.* In Liguriæ montibus eundo à *Nova* oppido ad *Genuam*.

Dens caninus flore purpureo *Ger.* *Erythronium* flore purpureo *Lob.* *Satyrium* quorundam *Erythronium* bifolium, flore unico radiato albo & purpureo *J. B.* Propè Augustam Taurinorum ad latera montis quem ascendimus eundo indè ad Astam. Hæ duæ plantæ mihi non aliter differre visæ sunt quàm solo floris colore.

N. Ventris tineas necare; coli dolores mitigare; vires reficere & nutrire; Venerem excitare; ex aqua pueros Epilepticos juvare dicitur. *J. B.* è Clusio & *Lob.*

Dens leonis bulbosus *Ger.* D. I. III, sive *Asphodeli* bulbulis *C. B.* D. I. Monspelienfium, sive *Asphodeli* bulbulis *Park.* Circa *Sellam novam* vicum *Monspelio* vicinum.

Dentaria aphyllus purpurea cespite denso. Ex singulis squamis singulos promit flores, pediculis semuncialibus infidentes, e calice amplo in quinque lacinias diviso, galeatos, magnos, purpurascens cum staminulis intus plurimis, Calix striatus, turgidulus. In Italia eundo à *Lericio* ad *Lucam* in umbrosis vidimus.

Dentaria heptaphyllos *C. B. Park.* heptaphyllos *Clusii Ger.* Coralloides altera sive septifolia *J. B.* In *Jura* & *Saleva* montibus copiosè.

Dentaria pentaphyllos *C. B. Park.* pentaphyllos *Clusii Ger.* quinquefolia *J. B.* In sylvosis jugis montis *Juræ* copiosè.

Dentellaria *Rondeletii v. Plumbago.*

*Dictamnus* albus *Officinarum v. Fraxinella.*

*Digitalis* lutea magno flore *C. B.* lutea folio latiore, flore majore *J. B.* amplo flore *Park.* In montibus circa *Genevam* & in *Germania.*

*Digitalis* lutea *Ger.* lutea vel pallida parvo flore *C. B.* flore minore subluteo, angustiore folio *J. B.* Cum priore, itémque circa *Salernum* & *Neapolin* in Italia.

*Diospyros J. B.* *Alni* effigie lanato folio minor *C. B.* *Vitis Idæa* tertia *Clusii Park.* *Vaccinia* albà *Ger.* *Amelanchier Lob.* In montibus circa *Genevam*, & in lateribus montium *Rheno* imminetium.

*Doronicum* vulgare *J. B. Park.* majus *Officinarum Ger.* *Romanum Lugd.* radice *Scorpii C. B.* In montibus prope *Genevam* copiosè; ast radix nihil habet cum *Scorpio* similitudinis,

N. Dif-



N. Disputatur inter Botanicos, an *Doronicum* sit venenatum necne: *Matthiolus* illud affirmat, & experimento caniculæ, quam 4 drachmis radice strangulavit, probat. Huic contradicit *Lobelius*, & more suo in *Matthiolum* acriter invehitur: nec refert (inquit) quod caniculis perniciosum sit, cum non pauca reperiantur aliis animantibus noxia & lethifera, quæ homini non modò innocua sed & salutaria sunt. Nam experimento certum habemus, *Aloe* saluberrimâ interfici vulpes, & ex *Plutarcho* easdem enectas *Amygdalis* amaris discimus, &c. Verum ego malletm suffragari *Matthiolo*, quàm in humano corpore experiri quod canibus aliisve quadrupedibus perniciosum comperi. *Gesnerus*, ut inanifestè redargueret *Matthiolum*, scribit se 3ij. radice hujus sumpsisse, & per 8 quidem horas bene habuisse; verum iis elapsis ventrem ac stomachum inflari sensisse, & circa os ventriculi imbecillitatem quandam, & corpus totum infirmius, ita ferè ut aliàs semel ac iterum ex nimio frigida potu perceperat. Quæ symptomata cum biduo durarent, nec videbantur sponte cessatura ingressum fuisse aquæ calidæ folium & curatum fuisse. *Costæus* scribit *Gesnerum* esu radice *Doronici* obiisse. *C. Hoffm. de Medicam. Officin.*

*Dorycnium* *Monspessulanum* fruticosum *J. B.* supposititium *Monspeliense* & *Hispanicum* *Park.* *Hispanicum* *Ger.* *Trifolium* album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis *C. B.* In saxosis collibus & ad sepes propè *Monspeliem*.

*Dorycnio* congener planta *J. B.* *Dorycnio* congener *Clusii* *Park.* Lotus pentaphyllos incanus *C. B.* In palustribus propè mare non longè à *Monspelio*. In *Germania* ad fl. *Lycum* propè *Augustam*.

*Draba* alba filiquosa repens *C. B.* *Park.* *Hesperis Alpina* seu muralis minor repens *J. B.* *Draba* altera repens *Ger. emac.* In montibus *Jura* & *Salève*, præsertim locis humidis ad aquarum scaturigines.

*Draba* vulgaris *Park.* *Dioscoridis* *Ger.* multis flore albo *J. B.* *Draba* umbellata, vel *Draba* major capitulis donata *C. B.* Intra muros *Antverpiæ*. Quin & in *Germania*, *Italia*, *Gallia* non infrequens.

*Draba* lutea *Park.* lutea quibusdam *J. B.* *Intea* filiquis strictissimis *C. B.* 4 *Ger.* In *Italia* aliquoties vidimus viis humidis ad sepes. In *Germania* prope *Weissenbergh*.

*Draba* filiquosa *Lyfimachia* facie, an *Myagri* species? In alveo torrentis cujusdam prope *Florentiam* *Etruriæ* urbem.

*Dracunculus* aquaticus *Ger. J. B.* noster aquaticus *Park.* palustris, five radice arundinacea *Plinii* *C. B.* In *Hollandiæ* fossis prope *Sevenhuys*.

E

- E** Chinopus *v.* Carduus Sphærocephalus.
- E**chium Alpinum luteum *C. B.* Alopecuros Alpinus quibusdam, Echium montanum Dalechampii *J. B.* Trachelium spicatum tenuifolium *Park.* In altissimis jugis montis Juræ.
- Echium majus & asperius flore albo *C. B.* flore albo majus *J. B.* In agro Salernitano & Romano, inq; Etruria & Gallia Narbonensi. Hæc reverà totâ specie distincta est à vulgari Echio, & non floris colore tantum.
- Echium Candiaë, flore pulchrè rubente *J. B.* Creticum latifolium rubrum *C. B. Park.* Flos plantæ quam intelligimus dilutè rubet. In Gallia Narbonensis locis plurimis copiosè, circa Monspelium tamen rariùs occurrit.
- Echium procumbens flore parvo cæruleo. In Sicilia circa Messanam.
- Elatine folio acuminato, flore cæruleo *C. B.* flore cæruleo, foliisq; acuminato *Park.* In Sicilia circa Messanam, itémque in Italia & Gallia Narbonensi inter segetes. Non alia re differt à vulgari quàm floris colore.
- Epimedium *Lob. Ger. C. B. Park. &c.* quorundam *J. B.* In Alpibus non longè à Ponticba, quâ ad Viennam Austriæ indè iter est.
- Erica arborescens, floribus luteolis vel herbacæis minimis *J. B.* major scoparia, foliis deciduis *C. B.* Scoparia *Park.* In luco Gramuntio propè Monspelium, & in ericetis propè Liburnum.
- Erica arborescens Monspelienfis flore purpurascente, ramulis ternis *J. B.* An Erica ramulis per intervalla, ternis *Ger. C. B. ?* Er. coris folio *5 Clusii Park.* Maxima hæc est ex omnibus quas hactenus vidimus Ericis. In itinere à Nova ad Genuam observavimus quæ humanam altitudinem longè superaret, jam tum Aprilis initio florere incipientem. Flosculi dilutâ purpurâ obiter tinguntur. In sylva Gram. tantam altitudinem non assequitur.
- † Erica folio Corios multiflora *J. B.* maxima purpurascens longioribus foliis *C. B.* Juniperifolia densè fruticans Narbonensis *Lob.* Ericæ Corios folio secundæ species altera *Clus.* Coris folio maxima purpurascens *Park.* Circa Pedenatium quâ indè Monspelium itur copiosè: itémq; eundo à Mons-



## CATALOGUS STIRPIUM

pelio ad oppidulum *S. Lupian* secus vias. Seriùs & sub finem æstatis, inq; multum Autumnum floret. Hanc speciem non ita pridem invenimus in Cornubia Angliæ, v. *Cat. Ang.*

*Erica Pannonica* 4 *Clus.* parva Pannonica, foliis Corios ternis, flore carneo, capitulis Thymi *J. B.* procumbens, ternis foliolis carnea *C. B.* Er. coris folio 9 *Clusii Ger. emac.* supina carnea *Park.* In rupibus eundo à Tridento ad Bolzanum mense Februario florentem copiosam invenimus.

*Erica procumbens herbacea C. B.* supina herbacea *Park.* parva foliis corios quaternis, flore herbaceo, foliaceis capitulis *J. B.* In sylvis montosis non longè à Lindavia Germaniæ urbe ad lacum Acronium sitâ, sub finem mensis Augusti jam tum florere incipientem observavimus. Primæ speciei similis est sed minor.

*Erinus Cas. & Col. v.* Alfine oblongo serrato folio.

*Eruca echinâtâ siliquâ C. B.* *Monspeliaca* siliquâ quadrangulâ *Park.* *Sinapi echinatum J. B. Lugd.* Inter segetes non longè à Lucâ, secus viam quæ indè ad Pisas ducit.

*Ervilia v. Ochrus.*

*Eryngium luteum Monspeliense v. Carduus Chrysanthemus.*

*Eryngium arvense foliis ferræ similibus C. B.* montanum *Ger.*

*Crithmum* 4 *Matthioli umbelliferum J. B.* Inter segetes in Germania circa Rhenum frequens. Hoc *Park.* cum *Sphondylío* ineptè confundit.

*Eryngium cæruleum J. B.* montanum *Amethystinum C. B.* In montibus Stiria. Solo summitatum colore à vulgari campestri differre videtur.

*Erysimum Matthioli alterum Lob.* alterum *Italicum Ger.* verum five montanum *Park.* alterum *Matthioli*, siliquis parvis, quibusdam *Dentaria J. B.* *Eryf. polyceration* five *corniculatum C. B.* In ipso maris litore ad Rhegium Calabriae urbem.

*Esula v. Tithymalus.*

*Euphrasia pratensis lutea C. B.* prat. major lutea *Park.* *Coris Monspessulana lutea J. B.* *Sideritis pratensis lutea Lugd.* Primò eam invenimus in Germania non procul Altdorffio Norimbergensium Academia, deinde in Etruriâ, tandem in Narbonensi Gallia. Seriùs post mediam æstatem floret.

F

**F**aba veterum ferratis foliis *Park. Ger. in App.* Aracus fabaceus ferratus *℥. B.* Inter frutices circa Baias.

Ferrum equinum *Lob. Ger.* equinum majus *Park.* Solea equina *℥. B.* Ferrum equinum filiquâ singulari *C. B.* Circa Liburnum, Neapolin & alibi in Italia.

Ferrum equinum Gallicum *Park.* Gallicum filiquis in summitate *C. B.* Polygalon Cortusi *℥. B.* Ad latera montis Salevæ propè Genevam, & in Delphinatu circa Gratianopolin.

Ferula *Lob. Ger.* fœmina Plinii *C. B.* tenuiore folio *Park.* folio Fœniculi, semine latiore & rotundiore *℥. B.* In montibus Messanæ imminētibus copiosè, & alibi in Sicilia & Italia: plurima quinetiam & procera in Narbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptisq; saxis propè subterraneas cryptas, viâ qua Monspelio Frontignanam itur ad dextram Lobelio olim, nobis nuperrimè observata.

N. 1. Medullâ hujus caulium fungosâ pro fomite ad ignem concipiendum nonnullos in Sicilia usos observavimus, cum in insula illa peregrinaremur; unde intelligitur cur Poetæ finxerint Prometheus ignem cœlestem cavâ ferulâ exceptum deportâsse in terram. Ἐν κοιλῇ τάρβηκε λαδῶν Δία Τερπικέγγυον. *Hesiod.*

2. Hujus viridis medulla pota sanguinem spuētibus & cœliacis prodest, sanguinis eruptiones sistit: Semen potum torminibus auxiliatur. *Diosc.*

3. Hujus succus inspissatus seu Gummi *Galbanum* dicitur: cujus usus intrinsecûs est in mensibus ac partu pellendis; in tussi inveterata ac asthmate: Adversatur toxicis. Extrinsecûs prodest in partu ac mensibus, suffocatione uteri, vertigine; in furunculis & lentiginibus. *Schrod.*

4. E ferulis primâ tantum germinatione corculum quoddam pastores eximunt, ovi luteum induratum referens, quod sub cineribus assiatum, priûs tamen chartâ aut linteo madefactis involutum, mox pipere & sale conspersum, non modò gustui gratissimus est cibus, sed etiam ad excitandam Venerem valentissimus.

Ficus *℥. B. Ger.* vulgaris *Park.* communis *C. B.* The common Fig-tree. In Italia & Gallia Narbonensi frequentissima, non tamen sponte.



## CATALOGUS STIRPIUM

*Ficus sylvestris* Dioscoridi *C. B.* *Caprificus* *Ger. J. B. Park.*  
*The wild Fig-tree.* In Italia & Gallia Narbonensi passim  
 provenit.

N. 1. Veteres in descriptione virium hujus arboris admodum sunt prolixi, videsis Plinium & Dioscoridem. Caricæ calefac. & humectant, pulmonariæ sunt & bechicæ, arenulis renum & vesicæ medentur, venenis resistunt: præcipui usûs sunt in variolis & morbillis ad cutem pellendis; maturant, molliunt, attrahunt, undè & bubonibus pestilentialibus (innuente S. Scripturâ) conferunt. Mulierculis nostratibus, appropinquante partu, ficuum tostorum esus ad partum facilitandum est familiarissimus. Quin & familiare est super ficus spiritum vini accendere, brodiûmq; ad tussim sedandam propinare *Schrad.*

2. Ficum frequentem esum pediculos generare præter Galenum Paulus Ægineta, Oribasius, & recentiorum quamplurimi sibi persuasum habent: quæ opinio & apud vulgus nostratum viget. Cujus rei causam tum demum inquiremus cum de experimento nobis constiterit.

3. Ficus recentes modò maturæ sint à ventriculo ocyssimè & facillimè conficiuntur, imò quovis alio fructu horario celerius coquantur. Quod vel indè constat, quòd non solum citra noxam copiosius aliis fructibus eas ingerimus, sed etiam illis præsumptis, si consuetum & parem cibi modum addamus id nihil incommodat *J. B.* Nos certè in Italia ante prandium ficûs sæpenumero sine ullo incommodo copiose ingessimus. Galenus, ut salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit à 28. anno ætat. ad senectutem usque, exceptis exactè maturis ficibus atq; uvis: Quin & amicos qui ejus monitu ab ἐπιείκῃ fructibus abstinerunt sine morbis fuisse. *J. B.*

4. Quæ de caprificatione Veteres tradunt sic brevibus complexus est J. Bauhinus. E putrescente Caprifici fructu calices geniti, in urbanæ fructus evolant, eosq; morfu aperientes superfluam humiditatem depascuntur, radiosque unà solares intromittunt, adeoque eorundem concoctionem & maturitatem promovent & accelerant.

5. Literæ quæ succo seu lacte turionum hujus arboris in charta exarantur omnino inconspicuæ sunt, donec charta igni admota vehementer calefiat; quod etiam aceto, succo limonum aliisque pluribus commune est. Acris est & causticus hic succus, lac coagulat, &c.

6. Ficus à plerisque botanicis flore carere traditur. Verùm (inquit J. Bauhinus) Fructus cum ad mediam magnitudinem pervenerit, flores intra se concipit, figurâ confertis staminibus similes, colore in candido purpurascens, undiq; è carne

carne exeuntes, atq; ad mediam fructûs cavitatem se dirigentes: quod Cordus primùm observavit.

Filix saxatilis non ramosa minima, an Dryopteris Dalechampii *J. B. ?* An Dryopteris sive Filix quærna repens *Adv. ?* In rupibus squalidis montium Juræ & Salevæ.

Flos Adonis flore rubro *Ger.* Adonis vulgo, aliis Eranthemum *J. B.* Adonis sylvestris, flore phœniceo ejûsq; foliis longioribus *C. B.* Circa Liburnum inter segetes.

Filix saxatilis corniculata *v.* Adiantum.

Flammula Jovis *v.* Clematis.

Fœniculum tortuosum *J. B.* Sefeli Massiliense Fœniculi folio quod Dioscoridis censetur *C. B. Park.* In Sicilia circa Messanam primò, postea circa Monspelium copiosissimum vidimus. Seriùs floret.

Fœnum Burgundicum *v.* Medica.

Fraxinella *Ger. Park.* Cordi & Officinarum *Lob.* Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella *C. B.* Fraxinella, Officinis Dictamnus *J. B.* In præruptis montium Rheno vicinorum non semel vidimus.

N. 1. Radix cordialis est, alexipharmaca, uterina, cephalica. Vermes necat, menses & urinas movet, secundas & fœtum mortuum educit, valet ad alvi torsiones & ejiciendos renum calculos in vino pota. Usus præcip. in peste & morbis malignis, in Epilepsia, aliisq; affectibus capitis.

2. Siliquæ & flores contactu pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant.

Frumentum Indicum *v.* Maiz.

Fucus marinus rotundifolius *C. B. v.* Opuntia marina.

Fumaria bulbosa flore albo *C. B.* bulbosa, radice cava, flore albo *J. B.* Radix cava major alba *Ger.* Ubiq; ferè ad sepes, inq; scrobibus umbrosisq; sepibus Alpium Helveticarum.

Fumaria bulbosa flore purpureo *C. B.* radice cava, flore purpureo *J. B.* Radix cava major purpurea *Ger.* Cum priore sed magis frequens, nec aliter ab ea differre videtur quàm solo floris colore. Invenimus hanc in agro Mediolanensi, cùm vere primo Mediolano Taurinum iter faceremus.

Fungus auricularis Cæsalpini *v.* Alcyonium.



## G

**G**aleopsis five Urtica iners flore purpurascente majore, folio non maculato *J. B.* Synonyma quære apud *J. Bauhinum*. Autores nostri hanc speciem confundunt cum *Lamio* purpureo, folio & flore minore, quod solum in Anglia sponte provenit. Suspiciatur *Parkinsonus* *Lamium* purpureum minus incognitum fuisse *Cæsalpino*, *Matthiolo* & antiquioribus Botanicis, quoniam *Lobelius* & *Dodonæus* primi veram ejus iconem ediderunt, & proinde Angliæ peculiare & exteris regionibus minus notum conjectatur. At verò utramque *Lamium* purpureum regionibus transmarinis frequens & ubique ferè obvium. Speciem majorem in Anglia nondum spontaneam vidi.

*Galeopsis* maculata *J. B.* *Lamium* albâ lineâ notatum *C. B.* *Lam.* *Plinii* montanum *Columnæ Park.* *Milzadella* vulgò, *Leucas* *Dioscoridis* fortè *Cæs.* In Italia & Gallia *Narbonensi* frequens occurrit. Nescio an alia re quaquam à minore purpurea differat quàm albo hoc ductu in foliis mediis.

*Galega* *Lob. Ger. J. B.* vulgaris *C. B. Park.* *Ruta* capraria *Gesn.* In Italia nusquam non obvia.

N. 1. Celeberrimum est alexipharmacum ac fudoriferum, venenum inprimis pestilentielle insigniter discutiens. Usus ejus præcipuè in petechiis expellendis, aliisque morbis pestilentialibus, ipsaq; peste curanda; in morbillis; in *Epilepsia* infantum (exhibetur succi cochlear 1.) in ictibus serpentum; in lumbricis, quos etiam extrinsecus applicata fugat. Estur a. herba ipsa cruda vel cocta, ad hos usus.

2. Foliorum succus vel etiam folia ipsa tusa & imposita tumoribus apum aut vesparum ictibus excitatis, dolorem statim mitigant & tumores discutiunt.

*Gallium* rubrum *Ger. C. B.* flore rubro *Park.* flore rubro *Sprengerianum J. B.* In Alpibus dum *Viennâ Austriæ* *Venetias* iter faceremus sæpiùs in conspectum se dedit.

*Gallium* flore albo majus *v.* *Mollugo* montana.

*Gchista* Hispanica *Ger. juncea J. B.* *Spartum* Hispanicum frutex vulgare *Park.* *Spartum* arboreescens feminibus *Lenti* similibus *C. B.* In Italia, Sicilia & Gallia *Narbonensi* vulgarissima.

Genista

*Genista argentea* *J. B.* In planitie non longè ab oppido S. Lupiani quam transimus eundo à Monspelio ad montem Lupi.

*Genistella aculeata* *Ger. Park.* aculeata foliosa *J. B.* spinosa minor Germanica *C. B.* In Germania passim. Hæc omnino specie differt à *Genistella spinosa* nostrate vulgò dicta ut in *Cat. Ang.* monuimus.

*Genistella montana* Germanica *Park.* lagopodoides major *Ger.* herbacea, sive *Chamæspartium* *J. B.* *Chamægenista sagittalis* *C. B.* In pascuis Germaniæ sterilioribus abundè provenit, itémq; circa Genevam.

*Genistella tinctoria* Hispanica *J. B.* infectoria *Ger.* *Genista tinctoria* Hispanica *Park.* *Genista tinctoria frutescens* foliis incanis *C. B.* In montibus sylvosis supra Neapolin versus Camaldulensium cœnobium.

*Gentiana major* *Ger.* major lutea *C. B. Park.* vulgaris major *Hellebori albi folio* *J. B.* *Great Gentian or Fellwort.* In montibus circa Genevam copiosè.

N. 1. Alexipharmaca est [Radix] aperit, attenuat. Usus præcip. in peste alijsq; venenatis affectibus, in obstructione hepatis & lienis, &c. & hinc in hydrope, tum in suffocatione uteri, in imbecillitate ventriculi, lumbricis, febribus intermittentibus, morfu canis rabidi, &c. Extrinsecùs adhibetur creberrimè in vulneribus ac fonticulis mundificandis, in morfu canis rabidi arcendo (cum theriaca imposito) *Schrod.*

2. Succus inspissatus creberrimi est usûs in febribus intermittentibus in quibus ante paroxysmum à 3ß. ad 3j. vel Div. exhibetur felici cum successu. *Schrod. Matth.* Aqua destillata maculas cutis deterget. Est a. *Gentiana amara* admodum, indèq; putredinis hostis insensissimus & veneni mors (ut inquit Lobelius.)

3. Hepaticis & stomachicis qui cibum sumptum retinere non valent, *Gentianæ* radices pulvis è vino exhiberi debet; quod qui fecerit auxilium præsens sentiet. *Trag.*

*Gentiana Asclepiadis folio* *C. B. Park.* major 2 cæruleo flore Clusii *Ger.* folio *Asclepiadis* vulgò creditæ *J. B.* In montosis propè Lindaviam & alibi in Germania.

*Gentiana cruciata* *C. B. Park.* minor cruciata *Ger.* minor seu vulgi cruciata *J. B.* In Germaniæ pascuis montosis passim. Habetur etiam satis frequens in Gallia & Italia.

*Gentianella verna* major *Ger.* Alpina verna major *Park.* Alp. magno flore *J. B.* Alp. angustifolia magno flore *C. B.* In altissimis verticibus montis Juræ.



*Gentianula* quæ *Hippion* *J. B.* *Gentianella Alpina verna* major *C. B.* *Alpina verna* *Ger.* minor *verna* *Park.* In montibus *Genevæ* vicinis.

*Gentianula* lanugine ad singulorum foliorum floris laciniis donata, flore quadriparitto *J. B.* *Gentiana angustifolia Autumnalis* major, itémq; minor floribus ad latera pilosis *C. B.* *Gentianella Autumnalis fimbriato flore* *Park.* Itinere ab *Augusta* ad *Norimbergam*.

*Gentianella Autumnalis minima* calice turgido pentagono. In planitie ad fluvium *Lycum* non procul *Augustâ* *Vindelicorum* copiose, exeunte *Augusto* florens.

*Gentianella omnium minima* *v.* *Muscus Alpinus*.

*Geranium Althææ folio* *C. B.* *Althæodes majus* *Park.* *malaoides* *Cer.* *malvaceum* *J. B.* Circa *Genuam* in *Italia*, *Monspelim* & alibi in *Gallia Narbonensi*.

*Geranium Creticum* *Ger. Park.* folio *Cicutæ* vel *Myrrhidis* VII, five latifolium longissimâ acu *C. B.* speciosum annuum longissimis rostris *Creticum* *J. B.* In *Sicilia* propè *Messanam*.

*Geranium cicutæ folio*, acu longissimâ *C. B.* *Monspeliacum laciniatum* *Park.* Ad agrorum margines & in aggeribus circa *Monspelim*.

*Geranium nodosum* *Park.* *Anemones folio* rotundo XII, five nodosum *C. B.* nodosum *Plateau Clus.* *Ger. magnum folio trifido* *J. B.* Ad sepes, itinere à *Gratianopoli* à la fontaine que brusle.

*Geranium phæo* five pullo flore *Clusii* *J. B.* pullo flore *Park.* *Ger. Anemones folio* rotundo VIII, five montanum fuscum *C. B.* *batrachoides pullo flore* *Ger.* In monte *Jura* propè *Thuri*.

*Geranium Romanum versicolor* five striatum *Park.* In sylvis montosis *Salernum* inter & *Cavam* in Regno *Neapolitano*.

*Gingidium* *v.* *Visnaga*.

*Gladiolus* five *Xiphion* *J. B.* *Gladiolus Narbonensis* *Lob. Ger.* *Glad. floribus uno versu dispositis* major *C. B.* Circa *Liburnum* inter segetes.

† *Glastrum sylvestre* *Ger. Park.* *Isatis* sylv. vel *angustifolia* *C. B.* In *Germania* secus *Rhenum*. Culturâ tantum à sativa differre videtur.

*Glaux peregrina annua*. *Vicia Sesamacea* *Apula Col.* *Fœnugræco sylvestri* *Tragi* in quibusdam accedens planta *J. B.* *Ornithopodio affinis* *hirsuta semine stellato* *C. B.* qui *Stellam leguminosam* huc refert, cum sint distinctæ plantæ. In lingua *Fretum Siculum* à portu *Messanensi* dividente.

Globularia Monspeliensium v. Bellis cærulea.

Gnaphalium Alpinum pulchrum *J. B.* montanum IV, five Alpinum magno flore, folio oblongo *C. B.* Leontopodium *Dod.* Gnaph. Alpinum *Ger.* In montis Juræ præalto vertice *La Dolaz* dicto.

Gnaphalium roseum *Park.* roseum sylv. *C. B.* Umbellatum minimum *J. B.* In insula ad Prom. Siciliæ Pachynum vulgò *Capo Passaro*, ubi arx ab Hispanis præsidio tenetur.

Gnaphalium ad Stœchadem citrinam accedens *J. B.* In pratis non longè à *Castro novo* vico Monspelio vicino.

Gossipium five Xylon *Ger.* Goss. frutescens annuum *Park.* frutescens semine albo *C. B.* Xylon five Gossipium herbaceum *J. B.* In insula Melitensi quotannis magno proventu feritur.

N. Seminis medulla tussientibus & difficulter spirantibus mirificè auxiliatur, Venerem stimulat; oleum indè expressum lentigines, varos, albos, cæterâsque cutis infectiones delet. Lanugo usta sistit sanguinis profluvia.

† Gramen dactylon latiore folio *C. B.* Graminis genus Dens caninus 3, five Gramen primum, vel Galli crus *J. B.* Ab hoc sativum, quod Gramen Mannæ vocant, nonnisi culturâ differre videtur, inquit *J. B.* Ischæmon vulgare *Ger.* sylvestre latiore folio *Park.* In Germania, Italia, Gallia, in agris passim. Hanc speciem in Anglia non ita pridem invenit T. Willifellus.

Gramen digitatum hirsutum *J. B.* Gr. dactylon five Ischæmum V, i. e. Dactylon angustifolium spicis villosis *C. B.* Ischæmon sylvestre spicis villosis *Park.* Ab hoc non diversum putamus Gramen scoparium Ischæmi paniculis Gallicum, ex cuius nimirum radiculis scopulæ fiunt. Gramen illud è quo Cremæ præsertim in Lombardia scopulæ hujusmodi fiunt *Capriola* ibi appellant; unde Matthiolum falsum esse suspicamur, qui Gramen Mannæ pro *Capriola* habet, quod annua est planta, cuiusque radices huic usui nec adhibentur, neque idoneæ sunt. Fortè *Capriola* nomen commune est huic generi Graminis digitati; vulgus enim non distinguit.

Gramen repens cum panicula Graminis Mannæ *J. B.* dactyloides radice repente *Ger.* canarium ischæmi paniculis *Park.* dactylon folio arundinaceo majus *C. B.* quod nomen huic nostro, utpote minori & supino, minime convenit. Circa Genevam & Monspelium in arenosis.

Gramen dactylon Messanense geminâ ab eodem exortu spicâ. An Gramen distachophoron *Col.*? Habet a. in eodem caule (ni malè memini) plura spicarum paria.

In



In montibus Messanæ alteri Siciliæ metropoli adjacentibus.

Gramen tremulum maximum *C. B. J. B. trem. maximum Hispanicum Park. Phalaris pratensis altera Ger. emac. Pluribus Italiæ & Siciliæ in locis, speciatim circa Baias copiosè.*

Gramen pulchrum parvum paniculâ latâ compressâ *J. B. cyperoides paniculâ sparsâ sufflavescente Park. cyp. minus paniculâ sparsâ subflavescente C. B.* Cur a paniculâ sparsâ denominat, cum è contra paniculâ sit conglomerata? In humidioribus & ubi per hyemem aquæ stagnârant in Germania, Italia, & Narbonensi Gallia.

Gramen parvum pulchrum paniculâ compressa nigricante *J. B. cyperoides paniculâ nigricante Park. cyp. minus paniculâ sparsâ nigricante C. B.* In palustribus non procul Monspelio. Quin & in Italiâ ad ipsos Florentiæ urbis muros in fossulis collegimus.

Gramen Alopecuros spicâ longâ tomentosâ candicante *J. B. Alopecuros major spicâ longiore C. B. Gr. alopecuroides alterum radice repente, five Pseudo-schœnanthum Monspelienfium Park. Schœnanthum adulterinum Ger. In maritimis Monspelio vicinis.*

Gramen paniculatum elegans *Ger. Gr. amoris dictum J. B. Gr. paniculis elegantissimis, five ἐράγρις major C. B. Phalaris pratensis major, five Gramen tremulum maximum Park. ineptè. Primò nobis occurrit Francofurti ad Mœnum; deinde passim per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem. Hujus varietatem circa Monspelium & Florentiam observavimus, quæ dici poterit.*

Gramen amoris alterum paniculis strigosioribus magisque sparsis.

Gramen minimum Dalechampii *J. B. minimum paniculis elegantissimis C. B. In vineis circa Monspelium sub initium veris, imò ipsâ adhuc hyeme floret.*

Gramen paniceum spicâ simplici *C. B. Panicum sylvestre spicâ simplici Park. sylv. Ger. sylv. & Dens canis primus J. B. In Germania, Italia & Gallia passim.*

Gramen paniceum spicâ divisâ *C. B. Graminis genus quibusdam, Gallis Dens canis 2, five Panicum sylvestre spicâ divulsâ J. B. Panicum vulgare Ger. sylvestre herbariorum Park. Ad rivulos & in locis ubi per hyemem aquæ stagnârant in Germania, Italia, Gallia.*

Gramen paniceum spicâ aristis longis armatâ *C. B. paniceum Ger. paniceum aristis longis armatum Park. Est hoc (ut rectè monet J. Bauhinus) naturæ duntaxat lusus: in eadem enim planta observavit spicarum utriculos alios defi-*

definentes in aristam, alios eâdem destitutos. Advenire autem illud dicit ratione soli atque ætatis, quod & mihi probatur. Unde meritò reprehendendus videtur C. Bauhinus qui sine necessitate entia multiplicat.

Gramen parvum echinatum *J. B.* caninum marinum asperum *Park.* caninum maritimum spicâ echinata *C. B.* In arenosis circa Monspelium copiosè; Vidimus etiam in Arni fluminis alveo Florentiæ.

Gramen nemorosum hirsutum minus paniculis albis *C. B.* nem. hirsutum minimum *Park.* præter rationem minimum appellat, cum satis altè assurgat. Gramini Luzulæ affine flore albo *J. B.* Ad latera montis Salevæ propè Genevam, & in colle *La Bassie*.

Gramen supinum aculeatum *J. B.* aculeatum Italicum *Park.* echinatum & aculeatum III, five album capitulis aculeatis Italicum *C. B.* Inter Liburnum & Pisas, necnon circa Monspelium copiosè.

Gramen arvense paniculâ crispâ *C. B.* *Park.* minimum rubrum five Xerampelinum *Ger.* Gramen cum paniculâ molli rubente *J. B.* Genevæ inter segetes copiosè, quin & in muris ipsius urbis. Simillimum est hoc gramen montano nostro spicâ gramineâ foliaceâ dicto.

Gramen alopecuroides spicâ asperâ *C. B.* alopecuroides spicâ asperâ brevi *Park.* Gr. cum cauda leporis aspera, five spicâ murinâ *J. B.* Circa Monspelium collegimus.

Gramen arundinaceum ramosum plumosum album *C. Bauhini J. B.* quod asserit circa *Perault* & Magallonam reperiri, ubi & nos illud invenimus, uti etiam propè litus Calabriæ.

Gramen calamagrostis Lobelii *J. B.* arundinaceum I, five spicâ multiplici *C. B.* Calamagrostis five gramen tomentosum *Park.* at cur tomentosum denominat? Gr. arundinaceum paniculatum *Ger.* In arenosis maris litoribus circa Magallonam non longè à Monspelio. Figura *J. B.* optimè respondet nostræ plantæ: non autem Parkinsoni, uti nec titulus, nec descriptio Lobelii in *Adv.* Gramen marinum cyperoides *J. B.* cyperoides maritimum *C. B.* Juncus cyperoides maritimus *Lob.* marit. Narbonensis *Park.* In arenosis litoribus propè Neapolin copiosè. Habetur etiam ad mare Monspelii.

Gratiola *J. B. Lob. Ger.* vulgaris *Park.* centauroides *C. B.* In palustribus propè Constantiam Germaniæ urbem uberimè. Provenit etiam in aquosis tum in Italia, tum in Gallia Narbonensi, ut v. g. propè lucum Gramontium non procul Monspelio,



## CATALOGUS STIRPIUM

N. 1. Efficax remedium est in humoribus aquosis, lentis biliosisque specificè evacuandis, quos vel ex remotissimis partibus trahit, atque tum per secessum, tum per votimum expurgat. Hinc magnus ejus usus esse poterit in hydrope, ictero flavo, &c. Et quia amaritudine insuper dotata est insigni, fugat lumbricos, eorumque saburram expurgat. Haftenus *Schroderus*.

2. Prodesse dicitur adversus diutinos coxendicis dolores & inveteratas febres five sicca five recens decocta; verum quoniam nimis violenter nec sine molestia purgat, corrigenda est.

Grossularia v. Uva crispa.

Guaiacum Patavinum *Park.* Patav. latifolium *Ger.* Guaiacana *J. B.* Lotus Africana latifolia *C. B.* In præruptis collibus non longè à Massa quà indè Lucam iter est, hanc ipsam plantam vel ei simillimam collegimus proinde fortasse deceptus non fuit *Gesnerus*, qui eam in montibus circa Veronam nasci scripsit, quod *J. Bauhini* pace dixerim.

## H.

**H** Alimus *Lob.* Hal. Clusii *J. B.* latifolius five frutescens *C. B.* latif. five *Portulaca marina* incana major *Park.* In Sicilia propè Messanam hinc indè ad maris litus copiosè.

Hedynors Monspeffulana, five Dens leonis Monspeffulanus *J. B.* Chondrilla lutea X, five foliis Cichorei tomentosis *C. B.* Chondr. prior *Dioscoridis*, legitima Clusii *Park.* Chondrilla lutea *Ger.* Circa Messanam & Monspelium copiosè. Ab hac planta omnino diversa est Dens leonis *Asphodeli* bulbulis dicta, utcunque *J. B.* eandem faciat.

Hedysarum clypeatum *Ger.* clypeatum vulgare *Park.* Astragalus Romanus, five Hedysarum clypeatum siliquâ asperâ *J. B.* Onobrychis semine clypeato aspero major *C. B.* In montibus Messanæ imminentibus, ubi etiam flore albo observavimus.

Hedysarum clypeatum minus flore purpureo. An Onobrychis semine clypeato aspero minor *C. B.*? In insula Promontorio Siciliae Pachyno proximâ.

Hedysarum minus *Park.* v. *Securidaca* minor. majus siliquis articulatis *Ger.* v. *Securidaca*.

He-

*Helianthemum* flore albo, folio angusto hirsuto *J. B.* *Chamæcistus* foliis *Thymi* incanis *C. B.* An *Helianthemum angustifolium* *Park. Ger. ?* Propè *Monspelim* in collibus *Castro novo* adjacentibus, atque etiam circa *Nemausum*. Folia hujus oblonga sunt, incana, & figurâ sua ad *Rorismarini* folia nonnihil accedunt, nisi quòd breviora sint.

*Helianthemum tenuifolium* glabrum flore luteo *J. B.* *Chamæcistus* *Ericæ* folio luteus *C. B.* *Chamæc. Ericæ* foliis *Park.* Ad radices montis *Juræ*, inque collibus saxosis circa *Genevam*. Ab hoc diversum facit *J. Bauhinus*.

*Helianthemum* folio *Thymi* incano, quod putat *Lobelum* miscere cum *Helianthemo* tenuifolio glabro. Has similes esse plantas, differentes tamen diligentius consideranti asserit. Et nos idem cum *Bauhino* aliquando sensimus, postea tamen in eadem planta vidimus inferiora folia tenuissima, qualia ferè *Camphoratæ* *Monspeliensis* : superiora autem longè diversa, viridia & *Helianthemi* proximè scripti foliis omnino eadem. Invenimus tamen circa *Massiliam* cujus omnia folia tenuissima, camphoratæ similia & glabra. q. ult.

*Helianthemum Alpinum* folio *Pilosellæ* minoris *Fuchsi* *J. B.* Ad latera & radices montes *Salevæ* prope *Genevam* copiosè. Hoc an ab aliis descriptum sit necne mihi nondum constat. Consule *J. B.*

*Heliochrysum v. Stæchas citrina.*

*Heliotropium majus* *Lob. Ger. Park.* majus flore albo *J. B.* majus *Dioscoridis* *C. B.* In Italia & Gallia *Narbonensi* in agris ubique ferè : Vidimus & circa *Moguntiam* *Germaniæ*.

*Heliotropium tricocon* *C. B. J. B. Ger. Park.* Circa *Monspelim* cum priore sed rariùs.

N. 1. Hujus capita sive siliquæ pannis affrictæ, florido viridi colore eos inficiunt, qui temporis momento in cæruleum eumque elegantem mutatur. Hujusmodi panni aquam cui immerguntur vini rubri colore imbuunt ; eorumque usus est ad gelatinas aliásque confectioes purpureo colore tingendas.

2. *Heliotropium* dicitur non quòd ad Solis diurnum motum convertatur, sed quòd æstivo solstitio floreat, cùm Sol longissimè ab *Æquinoctiali* circulo digressus ad ipsum rursus *τεγνῶ* sive conversionem faciat. *Dod.*

*Helleborine* ex albo sublutea *J. B.* In sylvula monti *Salevæ* vicina. Floret omnium hujus generis prima.

*Helleborine* flore albo *C. B.* *Damasonium Alpinum*, sive *Helleborine* floribus albis *J. B.* In sylvosis propè summitatem montis *Salevæ*. Floret vere simul cum priore



## CATALOGUS STIRPIUM

ore, aut aliquanto seriùs. Elleborine minor flore albo *Park.*

Helleborine montana angustifolia purpurascens *C. B.* *Damasonium* purpureum dilutum, five Helleborine 6 Clusii *J. B.* *Hel. angustifolia* 6 Clusii *Ger.* Elleborine flore purpurante *Park.* Ad radices montis Salevæ, versùs Genevam sci. copiosè.

Inveni insuper Helleborinem flore atro-rubente in ascensu montis Juræ propè oppidum *Jay* copiosè. *Calceolum Mariæ* dictum in sylvis ad latera montis Salevæ. Verùm hæ duæ species in Angliâ habentur.

Helleborus albus *Ger. J. B.* albus vulgaris *Park.* albus flore subviridi *C. B.* In montosis pascuis in summitate montis Juræ copiosissimè.

N. 1. Hellebori albi radix ob violentiam purgationis quam per superiora & inferiora movet, usum purgandi internum soli ferè Helleboro nigro reliquit. *Schrod.* Potest tamen (inquit *Tragus*) per 24 horas vino aut oxymelite macerata posteaq; resiccata 3ß. pondere cum vino exhiberi furiosis & melancholicis. Helleborum utrumq; dicit *Gesnerus* [si cum aceto & melle temperetur & decoquatur ut syrupus fiat] medicamentum innoxium & ad plerosque phlegmaticos morbos [thoracis & capitis inprimis, ut asthma, dyspnœam, epilepsiam] *πολύχρηστον* sæpe utilissimè se expertum esse, &c. vide apud *J. B.* Optima radices præparatio, (inquit *Parkinsonus*) est ut succo mali *Cydonii* infundatur, aut *Cydonio* indita in furno aut sub cineribus coquatur. Quin si ab Elleboro sumpto strangulationis periculum sit, *Cydonia* comesta eorùmv succus aut syrupus remedio sunt.

2. Rad. in aceto decocta, ac in ore aliquandiu retenta dolorem dentium tollit. *J. B.* è *Trago*.

3. In lixivio decocta, si illo postea caput abluas, pediculos & furfures enecat & abstergit: idem unguento aliquo permista efficiet. *Idem.* scabies, impetigines, serpigines sanat: animalia pleraq; interimit, mures, lacertas, aves, &c.

4. Pulvis naribus inditus sternutamenta movet, unde & Anglicè *Neesse-wort* dicitur.

5. De Hispanorum toxico ex ea facto consule *Parkinsonum* & *Jo. Langium Epist. med. lib. 1. Epist. 68.* Helleborus autem uterq; in furiosis & insanis sanandis olim celeberrimus.

Helleborus niger *Lob.* niger verus *Ger. Park.* niger flore roseo *C. B.* niger flore albo, interdum etiam valdè rubente *J. B.* In Alpibus non longè à Pontieba abundè.

N.

N. Purgat potenter humores melancholicos, utile per consequens medicamentum est omnibus affectibus indè originem trahentibus, quales mania, insania, hypochondriaca passio, elephantiasis, herpes, cancer, quartana, vertigo, epilepsia, apoplexia, scabies, &c. v. *Schrod.* qui eam [radicem] violenter purgare ait; alii, si rectè usurpetur innoxium esse medicamentum scribunt, ut tutò pueris, gravidis & debilibus corporibus dari possit. Corrigitur cardiacis ac stomachicis ut Cinnamomo, Aniso, Fœniculo, &c. Dosis à ʒj. ad ʒij. Variis modis ad usum præparatur.

*Helleborus niger* *Saniculæ folio major* v. *Astrantia nigra*.

*Helleborus niger* *Saniculæ folio minor* *Park. C. B.* In summis montium jugis max. *Carthusianorum cœnobio* vicinis.

*Helleborum nigrum* foetidum sive *Enneaphyllon* in Germania, lateribus montium quos eluctatur *Rhenus* inter *Coloniam* & *Moguntiam*, &c. copiosissimum observavimus. *Helleborum nigrum hortensem* flore viridi *C. B.* in monte illo præcelso cui inædificatur *S. Marini urbs*, 10 circiter milliaribus *Arimino* distans. Hæ species in usum medicum rarissimè veniunt, iisdem tamen cum *Helleboro nigro* vero facultatibus dotata videntur.

*Hemionitis multifida* *C. B.* altera *Dalechampii filici floridæ* similis *J. B.* *Ilvensis Dalechampii*, multifido folio *Park.* Propè *Salernum* primò, deinde in viis umbrosis circa *Neapolin*, quà ascenditur ad *Camaldulensium cœnobium* copiosè.

*Hepaticum trifolium* *Lob. Ger.* *Trif hepaticum* flore simplici *C. B.* *hepaticum* sive *Trinitatis herba* flore cæruleo *J. B.* In montibus circa *Taurinum*, *Scaphusiam*, *Genavam* copiosè.

*Herba Doria Lobelii* *Ger. H. D. vulgaris* *Park.* *Alisma Matthioli*, sive *Doria* *J. B.* *Doria Narbonensium* quasi *Aurea*, quam perperam *Doriam* vocant, foliis *Limonii* aut *Rumicis* *Adv.* *Virga aurea major* vel *Doria* *C. B.* Ad *Ladum amnem* *Monspeliacum* copiosè.

*Herba venti Monspeliensis* *J. B.* *Marrubium nigrum longifolium* *C. B.* *Ger. Park.* In aggeribus & ad vias circa *Monspelum* copiosè.

*Herniaria hirsuta* *J. B. C. B.* In arenosis primò circa *Sylvam Ducis* in *Brabantia*, deinde per *Germaniam*, *Italiam* & *Galliam Narbonensem* copiosè.

*Hesperis sylvestris latifolia* flore albo parvo *Park.* *Hesperidi Alpinae murariæve* similis *surrecta* & *magna* *J. B.* In monte  
Sa-



- Salevâ copiosè, collegimus etiam in montibus non longè à Luca versùs Massam.
- Hesperis *v.* Viola matronalis.
- Hesperis Alpina *v.* Draba.
- Hieracium Alpinum glabrum, flore singulari magno, cauli cubitali insidente. In summo montis Juræ dorso *La Dolé* dicto. Hoc an à quoquam descriptum sit inquirendum.
- Hieracium asperum *v.* Hypochæris.
- Hieracium montanum latifolium Genevense, folio Conyzæ majoris Monspeßulanæ *J. B.* In ascensu montis Juræ propè *Thuri*.
- Hieracium falcatâ siliquâ *Lob. C. B.* falcatum Lobelii *Ger.* falcatum sive stellatum *Park.* stellatum *J. B.* An fortè Hieracium stellatum Boelii *Ger. emac.* in *App.?* Circa Monspelium non longè à *Castro novo*.
- Hieracium capitulum inclinans femine adunco *C. B.* florem inclinans *J. B.* Hieracium folio Hedypnoidis *Park.* Circa Monspelium & Messanam.
- Hieracium calice barbato *Col.* falcatum barbatum *Park.* proliferum falcatum *C. B.* Messanæ & Monspelii passim.
- Hieracium parvum hirtum caule aphylo, crispum ubi ficutum *J. B.* In agro Monspeßulano non longè à *Sella nova* in arvis.
- Holosteum Massiliense *C. B. v.* Coronopus.
- Holosteum Plantagini simile *J. B.* Salmanticense primum *Clus.* hirsutum albicans majus *C. B.* Salamanticum *Ger. Park.* Propè Monspelium.
- Horminum sylvestre latifolium *Ger. sylv.* latifolium verticillatum *C. B.* Germanicum humile *Park.* Gallitricho affinis planta, Horminum sylvestre latifolium *Clusio J. B.* In agris & vevactis non longè ab Augustâ Vindelicorum, eundo indè ad Monachium Baviaræ metropolin.
- Horminum luteum glutinosum *C. B.* Colus Jovis *Ger. Lob.* Horminum luteum sive Colus Jovis *Park.* Galeopsis species lutea, viscida, odorata, nemorensis *J. B.* In colle *La Bastie*, & in montibus circa Genevam. Vidimus etiam sæpius in Italia & Germania, locis lutosis ubi fontes scaturiunt ad latera montium.
- Horminum pratense foliis ferratis *C. B.* Gallitrichum sylvestre vulgò, sive *sylv. Sclaræa* flore cæruleo purpureove magno *J. B.* Hæc planta à vulgari nostrate *Oculo Christi* floris magnitudine potissimum differt: unde & nostrum vulgare Horminum, sylvestre Lavendulæ flore *Clusio* dictum est. Ait enim se observâsse *Greenvici* ad arcis regiæ Hippodromum hanc speciem. Nos autem penè certi sumus non aliam ibi unquam enatam hujus generis plantam.
- Hya-

- Hyacinthus cæruleus* Ger. racemosus cæruleus minor juncifolius *C. B.* vernus botryoides minor cæruleus, angustioribus foliis, odoratus *J. B.* In agro Pedemontano ad vias.
- Hyacinthus comosus* Ger. comosus major purpureus *C. B.* maximus botryoides comâ cæruleâ *J. B.* Inter segetes circa Liburnum & Genevam copiosè.
- Hyacinthus pafilustris* vernus flosculis simbriatis albidis. Ad fossarum margines & in humidioribus inter Liburnum & Pisas. Hanc speciem nondum descriptam puto.
- Hypecoum* v. *Cuminum* sylvestre alterum.
- Hypericum foliis parvis crispis seu sinuatis.* In Sicilia propè *Punto Cerciolo* non longè à Castello *Puzallu*. Nondum, quod sciam, descripta est hæc species.
- Hypericum Nummulariæ folio* *Park. C. B.* Ex ipsis rupium max. Carthusianorum cœnobio imminentium fissuris emergit. Flos ei odoratissimus.
- Hypericum tomentosum* *Lob. J. B.* tomentosum *Lobellii* Ger. supinum tomentosum minus *Park. sup. tom. minus*, vel *Monspeliacum C. B.* In insula Melitensi primum, deinde circa Monspelim in fossis & humidioribus.
- Hyoscyamus albus major & minor C. B.* albus *Park. albus*, & albus minor *J. B. Ger.* Ego enim cum *Parkinsono* unam duntaxat speciem agnosco. In Italia ad mare inferum, inque Sicilia, & circa Monspelim copiosè. Floris color in hoc nostro pallidè luteus est, & fundum habet purpureum, in quibus cum *Cretico* dicto convenit.
- Hypochæris porcellia* Ger. *Hieracium asperum*, *Hypochæris* five *Porcellia* dictum *Park. Hieracium dentis leonis folio obtuso V*, five minus *Dentis leonis folio subaspero C. B.* *Hieracii* parva species, *Hyoseris angustifolia aspera. J. B.* In quibusdam *Bavariæ* sylvis.
- Hyslopoides major flore grandiore.* In palustri planitie propè *Syracusas*, itémque non longè à *Messana* *Siciliæ*. Hujus flos quadruplo major est vulgaris flore. Quin & utramque speciem unâ crescentem observavimus propè *Messanam*, uti eas specie differre amplius non dubitemus. *J. Bauhinus* duas habet *Hyslopiifoliæ* species: verum quam ille minorem inscribit est vulgaris nostras: quam *Hyslopiifoliam aquaticam* simpliciter vocat planta est de qua agimus.



## I.

**J**acea non spinosa laciniata lutea, An Jacea laciniata lutea C. B.? Jacea montana minima lutea Park.? In alveis torrentum & fluviorum quorundam, qui brumali tempore planities latè inundant in Foro Julii. Mihi nondum planè constat plantam hanc descriptam esse, nam diversa videtur à Jacea lutea montana minima tenuifolia Col.

Jacea Oleæ folio v. Xeranthemum.

Jacea purpurea maritima capitulo spinoso Neapolitana. An Jacea cyanoides echinato capite C. B.? i. e. Jacea montana purpurea echinato capite Park.? an Jacea laciniata Sonchi folio Park.? In maris litore arenoso propè Neapolin Italiae copiosissimè.

Jacea lutea capite spinoso C. B. lut. cap. spinosis Park. major lutea Ger. Centaurium collinum, sive Jacea spinosa flore luteo J. B. Circa Monspelium & Messanam.

Jacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia J. B. Stœbe IX, sive squamis asperis C. B. Circa Monspelium & alibi in Gallia Narbonensi. Habetur & in Etruria.

Jacea incana tenuiter laciniata, capitulis Jaceæ nigrae vulgaris. An Jacea incana laciniata, capitulis Cirsii flore uno aut altero J. B.? Jacea montana candidissima Stœbes foliis Park. C. B. qui titulus huic nostræ optimè convenit. In rupibus seu clivis maritimis Calabriae.

Jacea montana capite magno Strobili J. B. incana Pini capite C. B. pumila Narbonensis Park. In collibus faxosis circa Monspelium.

Jacobæa marina Ger. marina, sive Cineraria vulgaris Park. marina, sive Cineraria J. B. maritima C. B. Ad litora maris inferi ubique.

Jacobæa Senecionis facie. Calix floris Senecionis calicem exactè refert, verum circulum seu coronam aut limbum foliolorum in margine ad modum chrysanthemi obtinet. Plantula tenera est, radice fibrosa, foliis Bellidis maj. Propè Messanam.

Jasminum luteum v. Polemonium.

Iberis J. B. Cardamantica Lob. Ger. Nasturtii folio C. B. Park. Scitica Cresses. In incultis, ruderatis & secus vias ubique ferè tum in Germania, tum etiam in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi.

N. Tusa

N. Tusa cum modica axungia & coxendici imposita  
4 horarum spatio, & deinde ablata dolores ischiadicos &  
podagricos lenit, &c. vide Plinium aliosque Veteres.

*Ilex arborea* J. B. major aculeata & non aculeata *Park.*  
IV, five folio rotundiore molli modicèque sinuato *C. B.*  
*ejusdem.* I, seu folio oblongo serrato; Ego enim has non  
distinguo. In arbusculis junioribus folia sinuata sunt,  
aculeata & Aquifolii æmula: in vetustioribus oblonga,  
neque aculeata, neque sinuata, & Oleaginis similia. *Ilex*  
major glandifera *Ger.* In Italia & Gallia Narbonensi in  
sylvis & sepibus passim.

*Ilex coccigera* J. B. *Ger.* aquifolia, five coccigera *Park.*  
aculeata cocciglandifera *C. B.* In collibus saxosis circa  
Monspelium, Nemausum, Avenionem & alibi in Gallia  
Narbonensi.

N. Huic arbusculæ seu frutici innascitur granum illud  
tinctorium seu coccus baphica tantopere celebrata, &  
tinctoribus expetita, ex quo paratur confectio illa cardiaca  
*Alkermes* Officinis dicta.

2. Arbuscula hæc non ubique coccum gerit. Nam iis  
solum regionibus quæ Mediterraneo mari vicinæ sunt, &  
magno Solis ardore torrentur, nasci animadvertēbam. Sed  
neque isthic perpetuò fert; cum enim frutex adeò ado-  
levit ut glandem alere incipiat, coccum non gignit: ideoque  
solent incolæ quadriennes aut adultiores frutices urere,  
ut proximo anno novelli resurgant, qui deinde singulis  
annis aliquot subsequētibz coccum ramulis inhærentem  
instar exiguum pilorum coloris cinerei gignunt. *Clus.*

*Imperatoria* J. B. *Ger.* major *C. B.* Imper. five *Astrantia*  
vulgaris *Park.* In montibus max. Carthusianorum cœ-  
nobio imminentibus.

N. Saporis est acerrimi, Alexipharmaca ac sudorifera:  
discutit mirificè ventriculi, intestinorum, & uteri flatus,  
unde in colico cruciatu utilis. Usus præcip. in venenatis  
morbis ac ictibus; in pulmonum tartaro resolvendo &  
expectorando, in fœtore anhelitûs corrigendo, in capitis  
affectibus phlegmaticis, Paralyfi, Apoplexiâ, &c. Aiunt  
nonnulli quartanâ eos sanari qui pulveris cochlearis di-  
midium horâ unâ ante accessionem ex mero biberint.  
Commendatur & ad hydropem. Extrinsecus in Odon-  
talgia (gargarif.) in catarrhis exiccandis (suffitu) in tumo-  
ribus ac Arthritide frigida. In scabie capitis exiccanda  
(lotione) in serpigine inveterata sananda (cum adipe suillo  
illita) in globulis sagittifve corpori extrahendis (imposita)  
*Schrod. & Matth.* Unde non immeritò inquit J. B. Im-  
peratorix nomen sibi ascivit, cum tot tantisque viribus  
præstet.



## CATALOGUS STIRPIUM

præstet. Cæterùm ut facie externa & odore Angelicam refert, ita iisdem cum illa facultatibus dotata est.

*Iris humilis latifolia* flore violaceo *J. B.* *Chamæiris II*, sive variegata *C. B.* Primò in rupibus quibusdam maritimis non longè à Liburno portu eam observavimus, flore purpureo atque etiam albo : deinde circa Monspelium *aux Garigues*, ubi & *Lobelius*.

*Iris Germanica Fuch. vulgaris Germanica* sive sylvestris *C. B.* *vulgaris violacea* sive purpurea hortensis & sylvestris *J. B.* *vulgaris Ger.* In muris, tectis, locis rudertis, &c. in Germania.

*Iris Florentina Ger. latifolia V.* sive *Florentina alba C. B.* flore albo *J. B.* In muris urbis Florentiæ magna ejus habetur copia.

N. 1. Plurimæ hujus plantæ radici virtutes à Veteribus & Neotericis assignantur. Sic breviter *Schrod.* Usus præcip. in mucilagine seu tartaro pulmonum, tussi, asthmate, obstructione mensium, torminibus ventris infantum. Extrinsecus abstergit cutis maculas & lentigines (cum *Eleboro* & melle mixta.) Creberrimus usus modernis est in pulveribus qui capillis insperguntur : vulgus vocat pulveres de Cypro. Aiunt & hydropi eam conferre & ictero.

2. Iridis radix in vino aut cerevisia suspensa, hanc dulcem conservat, illud jucundo tum odore tum sapore commendat, illius planè æmulo quem mora *Rubi Idæi* communicant, ut nos in vino rubro sæpius experti sumus. Sed & pistoribus ad parandum fermentum triticei panis magnopere usitata est. Hæc partim è Trago, partim nostræ sunt observationis.

*Ischæmon v.* Gramen dactylon.

*Iva moschata Monspeliensium v.* *Chamæpitys moschata.*

*Jujube Arabum v.* *Zizyphus.*

*Juncus acutus maritimus capitulis rotundis C. B.* *acutus maritimus alter Lob. Park.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi ad maris litus valdè frequens.

*Juncus cyperoides maritimus Lobelii v.* Gramen cyperoides.

*Juncaria J. B.* *Junc. Salmanticensis Ger. Park.* *Rubia VIII*, sive *linifolia aspera C. B.* In Germania non longè à Ratispona.

*Juniperus major bacca rubescente C. B.* *Oxycedrus Park.* *Oxycedrus Phœnicea Ger.* *Cedrus Phœnicea Bellonio*, sive *Oxycedrus*, quibusdam *Juniperus major baccâ rubrâ J. B.* In collibus circa Monspelium.

K

**K** Ali semper virens grandius perpetuum *C. B. Prod.*  
*geniculatum majus J. B. C. B. Solicornia* five *Kali*  
*geniculatum Ger.* In palustribus ad Mare Mediterra-  
 neum valdè frequens. Multò lignosius est nostrate *h. e.*  
 minore; per multos annos durat & in satis magnum fru-  
 ticem adolescit, inque hortis culturam patitur, experimento  
*J. Bauhini.*

*Kali majus semine cochleato C. B. Ger. majus cochleatum*  
*Park. vulgare J. B.* Ad mare Mediterraneum sponte pro-  
 venit plurimis in locis. Seritur Monspelii in lacubus falsis  
 ad *Sal Alkali* conficiendum, cujus modum v. apud *J. Bau-*  
*hinum.*

L

**L** *Aburnum v. Anagyris.*

*Lactuca sylvestica purpurea J. B. montana purpuro-*  
*cærulea major C. B. sylvestris purpureo flore Park.*

*Sonchus sylvesticus Ger. emac.* In sylvis montosis Juræ,  
*Salevæ &c. frequens.*

*Lagopus altera angustifolia Lob. major angustifolius Park.*

*Trifolium angustifolium spicatum J. B. Trifolium mon-*  
*tanum angustissimum spicatum C. B.* In montibus supra  
*Messanam;* atque etiam circa Monspelium, utrobique co-  
 piose. Flores dilutè rubent. Ab hac non diversam specie  
 puto *Lagopus angustifoliam Hispanicam Clus.*

*Lagopus maximus Ger. max. flore rubro Park. Trifolium*  
*spicâ subrotundâ rubrâ C. B. Trif. albo incarnatum, spi-*  
*catum, five Lagopus J. B.* Quod circa Neapolin pro-  
 venit flores habet pulchrè rubentes aut coccineos; quod  
 propè Genevæ albo-incarnatos aut pallidos.

*Lagopus major folio pinnato Park. major spicâ longiore Ger.*  
*Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore J. B.*  
*montanum spicâ longissimâ rubente C. B.* In collibus  
 circa Genevæ.

*Lamium peregrinum five Scutellaria C. B. peregrinum,*  
*Scutellaria dictum Park. Cassida Col. In Italia circa*



## CATALOGUS STIRPIUM

Florentiam, Liburnum & alibi. Magnam habet similitudinem seu convenientiam florum respectu cum *Lyfimachia galericulata*; unde eam primo aspectu *Lyfimachiam galericulatam Urticæ folio* denominavimus.

*Lamium v. Galeopsis.*

*Lanaria* sive *Struthium Dioscoridis Imperato J. B. Saponaria Lychnidis folio, flosculis albis C. B.* In præruptis montium Messanæ proximorum aut ipsum Imperati *Struthium*, aut plantam ei simillimam collegimus, necdum ineunte Junio floruerat.

*Larix C. B. Ger. Park. folio deciduo conifera J. B. The Larch-tree.* In Alpibus Stiriacis & Carinthiacis eundo à Vienna ad Venetias copiosè.

N. 1. Hujus Resina est quam *Terebinthinam Venetam* Officinæ vocant *Matth. Park. J. B.* Quæ de Resinæ viribus traduntur, vide sub Pinu. Laricis materies firmissima est atque solidissima, adeoque Solis ardoribus aerisque injuriis resistit nec rimas facit.

2. Hæc sola arbor ex Resiniferis folio est deciduo. Folia a. monente J. Bauhino, non decidunt Autumno, nec antequam alia initio Veris succedunt.

3. Hujus trunco seu caudici innascitur Fungus ille pituitæ purgatrix *Agaricum* dictus.

4. Quæ Plinius aliquæ Veterum tradunt, non ardere eam, nec carbones facere, nec alio modo vi ignis consumi quàm lapides; omnino falsa esse vel inde constat, quòd apud Vallesianos quibusdam in locis non alia ligna in usum foci adhibeantur, ac alicubi etiam in Alpibus ad ferrarias fodinas carbones ex eâ fiant. *J. B. Matth.*

*Lathyrus major Narbonensis angustifolius J. B. angustifolius Park.* Circa Monspelium non longè à *Sella nova*, & alibi.

*Lathyrus sativus flore purpureo C. B. angustifolius flore purpureo Ger. anguloso semine J. B.* Circa Genevam copiosè: seritur & in Germania.

*Lathyrus sativus flore fructuque albo C. B. Cicercula sive Lathyrus sativus flore albo Park.* Et hic circa Genevam & in Germania seritur.

† *Lathyrus filiquâ hirsutâ J. B. angustifolius filiquâ hirsutâ C. B.* Inter segetes circa Genevam. Hic etiam in Anglia sponte oritur.

*Lathyrus sylvestris flore vario ex albo & coccineo.* Et hunc etiam circa Genevam inter segetes copiosè enatum vidimus, necnon circa Liburnum.

*Lavendula major, sive vulgaris Park. Lav. flore cæruleo Ger. Lavendula latifolia C. B. Pseudonardus, quæ vulgo spica*

spica *J. B.* In Gallia Narbonensi passim & copiosissimè. Provenit ibidem & Pseudonardus quæ Lavendula vulgò *J. B.*

N. Saporis est subacris & subamari, partium tenuium, cephalica ac nervina. Usus præcip. in catarrhis, paralyfi, spasmo, vertigine, lethargo, & tremore artuum. In urina, mensibus ac foetu pellendo (unde & parturientibus exhiberi solet) in torminibus ventris flatulentis. Extrinsecus in lixivii capitis ac artuum, in masticatoriis pro catarrho exiccando ac revellendo ad palatum, ne in pulmones defluat. Odore sua fugat pediculos. *Schrod.* In usu sunt præcipuè flores. Hi quoque cum linteaminibus & vestimentis in arculas recondi solent ad odoris suavitatem communicandam.

Laureola folio deciduo *v. Mezereon.*

Laurus *Ger. J. B. vulgaris C. B. major five latifolia Park.* In sylvis & sepibus Italiæ satis familiaris.

N. Baccæ paulò calidiores sunt, emolliunt, resolvunt. Usus præcip. in mensibus & urinis ciendis; in affectibus nervorum, paralyfi; in colica, in dolore post partum, in cruditatibus ventriculi. Extrinsecus conferunt folia ad ictus vesparum, molliunt tumores, promovent menses (in suffitu & balneo) leniunt dolores, odontalgiamque mitigant (in gargarism.) *Schrod.*

Laurus Tinus cæruleâ baccâ *Lob. sylv. Corni foeminae foliis, subhirsutus C. B. Laurus Tinus Ger. Tinus altera J. B. An Laurus sylv. folio minore C. B.?* In Italia circa Romam, Tybur & alibi frequens. Invenimus quoque in sylva *Valenâ* propè montem *Lupi* non longè à *Montepelio*.

Ledum Alpinum hirsutum *C. B. Ledum Alpinum, five Rosa Alpina Park. Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum J. B. In Alpibus prope Pontiebam.*

Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus *C. B. Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum glabrum J. B. Chamærrhododendros Alpigena Ger. Ledum Alpinum five Rosa Alpina Park. In summis jugis montis Juræ propè Geneviam.*

Ledum Alpinum hirsutum minus, An Cistus pumilus montis Baldi fortè Austriacus myrtifolius *J. B.?* Unà cum Ledo Alpino hirsuto; cui quoad folia satis similis est, multis tamen numeris minor, & flore (quantum memini) luteo.

Lentiscus *Lob. Ger. Park. J. B. vulgaris C. B. In saxosis collibus Italiæ, Siciliæ & Narbonensis Galliæ, ubi nunquam (quod equidem viderim aut audiverim) justam arboris*



## CATALOGUS STIRPIUM

staturam & magnitudinem assequitur, sed frutex perdurat; quamvis alibi, teste Bellonio & aliis, in arborem satis proceram adolescat.

N. 1. Partibus suis omnibus (fructu, foliis, cortice) adstrictoria est, unde utilis est ad fluxiones cujuscumq; generis, hæmorrhagiam, sanguinis expuitionem, alvi profluvium & dysenteriam, menses immodicos, procidentiam uteri & sedis. In summa Acaciæ & hypocistidis vices supplet; urinam ciet.

2. Dentiscalpia ex Lentisco parata tum priscis, tum hoc seculo magnatibus ac delicatioribus in usu quotidiano pro optimis & præstantissimis habentur.

3. Lentiscum in sola insula Chio Mastichen præbere tum Bellonius, tum Hermolaus Barbarus affirmant. Alii in Italia quoque Mastichen ferre sed non copiosam tradunt, ut v. g. Matthiolus, Cæsalpinus, Lacuna. Schroderus refert se habere ex donatione Glaferi frustulum Mastiche ditissimum ex Helveticis Alpibus transmissum. Nos cum in Italia & Gallia Narbonensi peregrinaremur nunquam Mastichen fundentem vidimus hanc arborem; nec quis fide dignus nobis unquam retulit se vidisse.

4. Huic arbori vel sponte vel vulneratæ exudat Mastiche dicta, quæ (referente Schrodero) subastringit, emollit, ventriculum roborat. Usus præcip. in vomitu, nausæa ac fluxu alvi compescendo. Obtundit ac corrigit purgantium acrimoniam, reprimat exhalationes ventriculi quæ caput aliàs ferire solent (grana aliquot post pastum deglutita) roborat caput, nervosumque genus, expuitioni sanguinis ac tussi medetur: emendat oris halitum, pituitam e cerebro elicit (masticando.) Extrinsecus ejus usus creberrimus est in dentificiis, emplastris ac cataplasmatibus stomachicis.

Leontopodium *Dod. v. Gnaphalium* Alpium pulchrum.

Lepidium annuum *Ger. Park. II*, five glastifolium *C. B.* non repens *J. B.* In agris prope Ratisponam; ibidem Fœnugræcum aut satum aut sponte provenit.

Lepidium Dentellaria dictum *v. Plumbago*.

Leucoium bulbosum præcox minus *Ger.* bulbosum minus triphyllon *J. B.* In convallibus Alpium, viâ quâ Bassano Tridentum itur.

Leucoium bulbosum vulgare *C. B.* bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rarius bino *J. B.* bulb. serotinum *Ger.* In umbrosis Helvetiæ pascuis pluribus in locis; quin & in Italia propè Taurinum, sylvis montosis, itémque inter Bassanum & Tridentum.

Leucoium bulbosum majus polyanthemum *Ger.* Leuconarcissolirion prætense *Lob.* Leuc. bulb. polyanthemum tardiùs florens,

- florens*, floribus minoribus *J. B.* L. b. majus five multiflorum, quod aliqui *Acrocorion* *Plinii* statuunt *C. B.* In palustribus propè *Pisas*.
- Leucoium maritimum angustifolium C. B. J. B. maritimum minus Park.* maritimum minus *Lobelii & Clusii Ger.* In arenosis maris *Mediterranei* litoribus propè *Frontignan*am.
- Leucoium spinosum v. Thlaspi spinosum.*
- Libanotis altera Theophrasti nigra v. Saxifragia Venetorum.*
- Libanotis Theophrasti minor Park.* latifolia altera five vulgarior *C. B. Lib. Theoph.* quorundam, five *Seseli Æthiopicum Matthiolo*, *Cervaria alba J. B.* In montibus circa *Genevam* copiosè.
- Lichen marinus rotundifolius Ger. v. Opuntia marina.*
- Ligusticum v. Siler montanum.*
- Lilium aureum v. Martagon Chymistarum.*
- Lilium floribus reflexis montanum C. B. montanum minus Ger.* flore nutante ferruginea majus *J. B.* In colle *La Bassie* & in monte *Salevâ* propè *Genevam* copiosè.
- Limonium folio sinuato Ger.* peregrinum *Rauwolfii Park.* peregrinum foliis *Asplenii C. B. Lim.* quibusdam rarum *J. B.* In insula ad *Promontorium Pachynum*, & ad *Punto Cerciolo* in *Sicilia*, utrobique copiosè.
- Limonium parvum Narbonense oleæ-folium Lob.* minus *J. B.* minus maritimum oleæ folio *C. B. parvum Ger.* *Narbonense parvum Park.* Ad mare prope *Monspelim* copiosè. Invenimus quoque in *Etruria* circa *Liburnum*.
- Limonium aliud parvum Narbonense floribus majoribus. An Limonium minimum C. B. Park.?* In iisdem cum priore locis.
- Linariæ aliquatenus similis folio Bellidis J. B. Lin. erecta latifolia VII, seu Bellidis folio C. B. Linaria odorata Park.* purpurea odorata *Ger.* In agris quibusdam *Lugdunum* inter & *Gratianopolin* 5 aut 6 leucis *Lugduno* remotis.
- Linaria aurea Tragi Ger. L. folioso capitulo luteo major C. B. Heliöchrysos Tragi, five Linaria 3 J. B.* In montibus propè *Ratisponam* & alibi in *Germania*. Hanc plantam ad *Virgam auream* rectius retuleris quàm ad *Linariam*.
- Linaria purpurea magna J. B. L. erecta angustifolia X, five purpurea major odorata C. B. Circa Neapolin & ad radices montis Vesuvii. Maxima est omnium quas hætenus vidimus; flore parvo, intensè purpureo.*
- Linaria graminea floribus congestis purpureis, Linaria cærulea calcaribus longis J. B. Ad radices montis Vesuvii copiosè.*



copiose. Altitudo ei dodrantalis, folia graminea; flores in summo caule dense stipati velut in brevi spicâ.

† *Linaria odorata* Monspessulana *J. B.* erecta angustifolia XI, five capillaceo folio odora *C. B.* Circa Monspelum ubique. Hanc speciem in Cornubia invenimus. Consule *Cat. Ang.* Folia capillacea huic plantæ perperam attribuit *C. Bauhinus*.

*Linaria purpurea parva J. B.* pumila seu repens IV, five cærulea repens *C. B.* purpuro-cærulea repens *Ger.* cærulea repens *Park.* In Alpium jugis & monte Jura. Malè inscribitur repens.

*Linaria parva purpurea* foliis sine ordine dispositis *J. B.* *Lin.* foliis carnosis cinereis *C. B.* In alveis fluviorum Alpestrum & torrentum.

*Linaria lutea parva annua J. B.* pumila seu repens II, i. e. pum. foliis carnosis, flosculis minimis flavis *C. B.* In cacumine montis *Lupi*, duobus à Monspelio leucis distantis. Autumno florentem inveni.

*Linaria pumila procumbens latifolia* flore pallido, riçtu luteo. In vineis quibusdam Messanæ. Vere floret.

*Linum luteum* Narbonense *J. B.* marinum luteum *Ger.* maritimum luteum *C. B.* sylv. angustifolium luteum *Park.* In pratis juxta Monspelum & *Sellam novam*. Floret Septembri: Hujus varietatem duplo grandiorem invenimus ad mare, quam tamen specificè differre nequiquam concedimus. Flores nempe, caules, capitula, semina utrique eadam. Differentia tantum in magnitudine & statura, quæ ratione loci evenit. Instinctu *J. Bauhini* hæc duo studiosè inter se contulimus.

*Linum sylv.* angustis & densioribus foliis, flore minore *C. B.* Hæc species an eadem sit nostrati *Lino tenuifolio*, an diversa inquirendum. In sterilioribus circa montem *Lupi* Septembri florentem observavimus. Est autem iis in locis perexigua, foliis angustiss. densis, flore satè grandi, coloris ex purpurâ albicantis.

*Linum sylv. latifolium Ger.* sylv. latifolium cæruleum *Park.* sylv. latifolium hirsutum cæruleum *C. B.* sylv. latifolium hirsutum flore cæruleo *J. B.* In planitie quadam propè Augustam Vindelicorum. An potius *Linum sylv. latifolium* caule viscoso, flore rubro *C. B.*? quod circa Ingolstadtium reperiri asserit. Nostri certè flos ruber potius quàm cæruleus, quamvis nullius in caulibus viscositatis meminimus.

*Lithospermum Linariæ folio C. B. v. Passerina.*

*Lonchitis aspera C. B.* asp. major *Ger.* asp. major *Matthioli Park.* altera cum folio denticulato, five *Lonchitis altera Matthioli J. B.* In summis rupibus montis Juræ. Lotus

*Lotus arbor Lob. Ger. L. arbor fructu Cerasi J. B. L. fructu Cerasi C. B. In Italia circa Romam & Gallia Narbonensi circa Monspelium.*

*Lotus filiquâ quadratâ Ger. quadripinnatis filiquis Park. ruber filiquâ angulosâ C. B. flore fusco tetragonolobus J. B. In Sicilia propè Messanam in olivetis.*

*Lotus filiquosa lutea Monspelienfis J. B. pratensis filiquosus luteus C. B. pratens. Monspelienfium Park. Circa Tybridis fluvii ostia in pratis. Circa Genevam quoque & Monspelium copiose.*

*Lotus filiquosa lutea filiquis strictioribus & longioribus. In Italia propè Tybridis fluvii ostia.*

*Lotus edulis Cretica Park. L. pentaphyllos filiquâ convexâ I, five pentaphyllos filiquâ cornutâ C. B. Trifolium five Lotus Hierazune edulis filiquosa J. B. Primò observavi in Italia propè Neapolin, postea in Sicilia.*

*Lotus filiquis Ornithopodii C. B. J. B. Circa Messanam ad latera montium urbi proximorum.*

*Lotus flore luteo, corniculis articulatis. An Lotus pentaphyllos filiquis recurvis, pedes corvinos referentibus C. B.? Coronopus ex codice Casareo Dod. Ger.? Ad Punto Cerriolo non longè à Castello Puzallu in Sicilia.*

*Lotus filiquis rectis incana vulgaris major. Neap. in rupibus maritimis.*

*Lotus asperior fruticosior Park. fruticosus incanus filiquosus C. B. L. trifolia corniculata Ger. Trif. argentatum floribus luteis J. B. Hanc plantam C. B. perperam pentaphyllum denominat, cum trifolia sit. In collibus circa Monspelium.*

*Lotus corniculata filiquis singularibus vel binis tenuis J. B. corniculatus minor pilosus Park. Trifolium corniculatum minus pilosum C. B. Prod. Propè Neapolin collegimus.*

*Lotus Libyca Dalechampii Lugd. L. pentaphyllos filiquis rectis X, five filiquosus glaber flore rotundo C. B. Trifolium hæmorrhoidale alterum minus, five Lotus Libyca Dalechampii Park. Trifolium rectum Monspeffulanum J. B. In locis humidis circa Messanam Siciliae, Tropiam Calabriae, & Monspelium Galliae Narbonensis.*

*Lotus incana, five Oxytriphyllum Scribonii Largi Ger. Lotus pentaphyllos filiquis rectis IX, five pentaph. filiquosus villosus C. B. An Lotus hæmorrhoidalis major, five Trifolium hæmorrhoidale majus Park.? Trifolium album rectum hirsutum valde J. B. Circa Monspelium eundo ad Peroul. Propè Messanam major habetur & lignosior. Figura quæ à Parkinsono exhibetur pro Trifolio argentato floribus luteis J. B. à Gerardo pro hoc ponitur, cui quidem nullo modo convenit.*

Lotus



- Lotus pentaphyllos vesicaria* C. B. Anthyllis leguminosa vesicaria Hispanica *Park.* idonea sanè appellatione. *Trifolium halicacabum* sive vesicarium *J. B.* perperam. Circa Messanam & alibi non in Sicilia modò, sed & in Italia.
- Loto* affinis *v.* Anthyllis & *Auricula muris.*
- Lunaria radiata* Robini *J. B. v.* *Securidaca.*
- peltata v.* *Thlaspi clypeatum minus.*
- biscutata v.* *Thlaspi clypeatum.*
- Lupinus sativus* flore albo C. B. *sativus albus Park.* vulgaris flore & semine albo *sativus J. B.* In Italia prope Liburnum Etruriæ portum & alibi satum vidimus.
- Lupinus sylv.* flore cæruleo C. B. flore cæruleo *Ger. sylv.* purpureo flore, semine rotundo vario *J. B.* In Sicilia circa Messanam sponte & copiosè.
- Lupinus* flore luteo *Ger. Park. sylv.* luteo flore, semine compresso vario *J. B.* In arenosis ad Fretum Siculum inter Messanam urbem & Pharum Messanensem copiosè.
- N. Hæc sola planta è leguminosis gustu est amaro. *J. B.*
- Lychnis coronaria* vulgò *J. B. coronaria sylvestris C. B. coron.* vulgaris *Park. cor. rubra Ger.* In Italia passim, ubi & flore albo, medio incarnato cernitur.
- Lychnis erecta* parva flore rubello, folio longo angusto. Inter segetes Lini vidimus, medio quasi itinere à Massa ad Lucam.
- Lychnis minima rigida* Cherleri *J. B.* In collibus propè Florentiam. Apud alios Botanicos nulla hujus mentio, quod sciam.
- Lychnis sylv. hirta Lob. Ger. sylv. hirta major Park. sylv.* lanugine canescens, flore majusculo rubescens, Clusio 5 *J. B.* Circa Neapolin primò, deinde circa Messanam.
- Lychnis parvo* flore rubello è calice oblongo angusto. Sunt a. petala in medio profundè fissa seu bifida. Juxta Messanam in primo montium ascensu. Suspicerer hanc eandem esse cum *Ocymoide* flore rubro minore *Cret.* si florum petala responderent.
- Lychnis sylvestris* caliculis striatis *Park. cal. str. 2 Clusii Ger. sylv. latifolia caliculis turgidis striatis C. B. Muscipula major, calyce turgido ventricoso J. B.* In Germaniæ agris propè Rhenum copiosè.
- † *Lychnis montana viscosa alba latifolia C. B. An Muscipula altera flore albo Park. ? Polemonium petraeum Gesneri J. B.* Genevæ in ipsius urbis muris & in collibus vicinis frequens. In Germaniæ quoque meridionalibus nusquam non obvia. Hanc nuper in Anglia spontaneam observavimus, vide *Cat. Ang.*
- Lychnis montana repens v.* *Saponaria minor.*

- Lychnis viscosa* purpurea latifolia lævis *C. B.* *Muscipula* *Lobellii* *Ger. Park.* *Centaurium minus adulterinum*, quibusdam *Lychnidis viscidæ* genus *J. B.* In agris montosis ad *Rheni* ripas inter segetes.
- Lychnis viscosa* erecta annua caryophylloides. In marginibus *Grammontiæ* sylvæ propè *Monspelium*.
- Lychnis segetum* rubra foliis *Perfoliatæ* *C. B.* *Lychnis seg.* *Vaccaria rubra dicta* *Park.* *Vaccaria* *J. B. Ger.* Inter segetes in *Gallia* & *Germania* passim.
- Lysimachia lutea* in alis foliorum florens *Cæs.* lutea minor *J. B. Ger. Park.* lutea II, five minor foliis nigris punctis notatis *C. B.* In Alpibus *Stiriæ*.
- Lysimachia lutea* flore globofo *Ger. Park.* bifolia flore globofo luteo *C. B.* altera lutea *Lobellii*, flore quasi spicato *J. B.* In fossis palustribus propè *Sevenhuys* in *Hollandia*.
- Lysimachia filiquosa* speciosa *v. Chamænerium*.

M

**M** *Achaleb v. Cerasus sylvestris.*  
*Maiz* five *Frumentum Indicum* *Ger. Maiz*, frumentum *Indicum* vel *Turcicum* vulgare *Park.* *Frumentum Indicum* *Mays* dictum *C. B.* *Triticum Indicum* *J. B.* Seritur nunc dierum non in *Italia* duntaxat, verùm etiam in *Germania*. *Farina* ejus subflava est non alba. Nequicquam multiplicat species *Tabernamontanus* & *Gerardus* ob solum granorum aut florum colorem; cùm in eadem spica grana flava & spadicea observaverimus.

*Panis* hinc confectus lentus est & gravis, nec fermentum intumescit dum pinsitur aut coquitur, proinde obstruentis naturæ sit necesse est, & difficilis concoctionis, velut panis azymus.

*Marrubium album fatuum* *P. Castelli* in *Cat. plantarum Messanensium*. An *Marrubium album peregrinum* brevibus & obtusis foliis *C. B.*? In glareosis ad mare non longè à *Messana*. Hæc planta à nonnullis credita est *Pseudodictamnus* alter *Ponæ*; verùm non respondent acetabula, quæ *Moluccæ* similæ esse dicit.

*Marrubium album angustifolium peregrinum* *C. B.* *Creticum* *Ger. Park.* album angustiore folio *J. B.* Ad vias & agrorum margines propè *Viennam Austriæ*. Miramur interim *Clusium* aliam proposuisse ab hac diversam *Marrubii* speciem circa *Viennam* spontaneam, quæ nobis ibi non visa.

*Marrubium*



## CATALOGUS STIRPIUM

- Marrubium nigrum longifolium* C. B. v. *Herba venti Mons-*  
*pelienfium.*
- Martagon Chymistarum* Lob. *Lilium aureum* Ger. *purpuro-*  
*ceum majus* C. B. *rubens vel croceum majus* J. B. In sylvis  
supra Neapolin propè Camaldulensium cœnobium.
- Martagon* v. *Lilium floribus reflexis.*
- Medica major erectior floribus purpurascens* J. B. *Tri-*  
*folium filiquâ cornutâ, sive Medica* C. B. *Trifolium Bur-*  
*gundiacum* Ger. *Fœnum Burgundiacum, sive Medica legi-*  
*tima* Park. Circa Genevam & Monspelim, & alibi. Circa  
Avenionem in agris satam vidimus.
- Medica scutellata* J. B. *Trifolium cochleatum* Ger. *cochleatum*  
*fructu latiore* C. B. Ad agrorum margines propè Liburnum  
Etruriæ portum.
- Medica orbiculata* J. B. *Trifolium cochleatum vel scutella-*  
*tum, fructu latiore, folio minuto obtuso* C. B. In insula  
ad Prom. Pachynum & alibi in Sicilia.
- Medica orbiculata fructu minore.* Propè Messanam. Hujus  
orbiculi dimidio minores sunt quàm præcedentis; & plures  
simul in eodem ramulo sive communi pediculo confertim  
nascuntur.
- Medica magna turbinata* J. B. *Medicæ majoris Bæticiæ spinosa*  
*species altera* Ger. *emac.* p. 1200. In insula ad Pro-  
mont. Pachynum mox dicta.
- Medica coronata Cherleri parva* J. B. In Sicilia circa Mes-  
sanam; itémq; circa Monspelim & Neapolin.
- Medica doliata spinosa.* In arenosis maris litoribus ad Messa-  
nam & alibi tum in Sicilia, tum etiam in Italia.
- Medica doliata lenis.* Ubi invenimus jam non recordamur.
- Medica orbiculata elegans fructu circum oras rugis veluti*  
*crispato.* In Sicilia non longè á Puzallu vico & Punto Ger-  
ciolo.
- Medica fructu compresso circum oras dentato.* An *Medica*  
*lunata quædam minor* J. B. ? Prope Messanam ad margines  
vinearum.
- Medica echinata, fructu ovato, spinulis brevibus, crebris, ri-*  
*gidis.* Propè Messanam Siciliæ.
- Medica Catalonica elegans vulgò dicta.* Hanc ubi collegimus  
jam non recordamur. Fructus figuræ doliaris est & crebris  
tuberculis scaber, persimilis ligno illi quo brachia manusq;  
muniunt Itali ad pilam defendendam & feriendam propel-  
lendâmve in ludo dicto.
- Medica ciliaris Guilandini.* Hanc in Alpibus invenimus.  
Fructus orbiculum aut rotulam imitatur, habetque in cir-  
cumferentia molles & oblongas spinulas seu setas ciliorum  
æmulas.

Medica

*Medica marina* *Park.* *Medicæ marinæ spinosæ species* *Ger.* *Trifolium cochleatum maritimum spinosum* *C. B.* *Trifolium cochleatum marinum, seu Medica marina* *J. B.* Ad litora Maris Mediterranei frequens. Hæ duæ species proximè scriptæ perennes sunt, reliquæ omnes annuæ.

*Medica echinata* fructu parvo oblongo, spinis rarioribus rigidis. Hanc etiam in Sicilia collegimus.

*Melampyrum* multis sive *Triticum vaccinum* *J. B.* *Melampyrum purpurascens comâ* *C. B.* *Melampyrum purpureum* *Ger.* *Crataegonon flore vario* *Park.* *Melampyrum ejusdem.* Inter segetes per Germaniam & Galliam vulgatissimum.

*Melampyrum cæruleâ comâ* *C. B.* *cæruleum* *Ger.* *Melampyro affinis* *Parietaria cærulea* quorundam *J. B.* In sylv. montosis non longè à Gratianopoli, quâ indè ad max. *Carthusianorum cœnobium* itur.

*Melampyrum erectum* flore luteo amplo. Ad latera montium Messanæ imminetium.

*Melampyrum erectum* flore vario ex albo & purpureo. An *Antirrhinum album serrato folio* *J. B.?* Cum priore, à quo etiam fortasse non differt specie. Possunt hæ plantæ ad *Euphrasias* aut *Cristas Galli* referri.

*Melanthium v. Nigella.*

*Melica* sive *Sorghum* *Dod. Ger. Park.* *Sorghi* *J. B.* *Milium arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nominatum* *C. B.* In Foro Julii ad panificia seritur : éstque haud dubiè *Milium* illud quod suo tempore ex *India* in *Italiam* invehit scriptit *Plinius*, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmò, quòdque adolescit ad pedes altitudine septem prægrandibus culmis. E paniculis hujus à granis repurgatis scopulas efficiunt ad mundandas vestes aliòsque usus, cujusmodi *Venetis* venales vidimus.

*Melilotus quinta Tragi v. Securigida.*

*Melilotus major candida* *Trag.* *Germanica* *Ger.* flore albo *Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi frequens. Hæc reverà specie differt à vulgari nostra lutea, quamvis *C. Bauhinus*, qui aliàs plerunque nimis multiplicat species, eandem faciat.

*Melilotus Messanensis procumbens* folliculis rugosis sublongis, spicis florum brevioribus. In loco humido, in lingua illa inter portum Messanensem & fretum Siculum.

*Melissa sylvestris* hirsutior minùs odorata. *Melissophylli sylvestris* genus *Matthiolo.* In sepibus propè Liburnum & Salernum copiosè. Hæc est, puto, quam *J. Bauhinus* memorat *Hist. lib. 28. cap. 12.* Habemus (inquit) nos quandam *Melissam* nigriorem & hirsutiorè, à nemine memoratam.



memoratam. Hic Matthiolus à Botanicis injustè arguitur, quasi Melissophyllum suum sylvestre à sativo non esset distinctum.

Melissæ similis foliis minoribus, floribus albis, labello punctato. Circa Messanam, in insula ad Prom. Pachynum in Sicilia.

† Menthastrum Ger. hortense, five Mentha sylvest. Park. Mentha sylvestris folio longiore C. B. Menthastrum spicatum folio longiore candicante J. B. In agris & pascuis propè Arnum flumen non longè à Florentia.

Mespilus J. B. sativa Ger. vulgaris five minor Park. Germanica folio laurino non serrato C. B. In Etruriæ sepibus non procul Viterbo.

Mespilus Aronia Ger. Aronia Veterum J. B. Aronia five Neapolitana Park. Apii folio laciniato C. B. Sponte provenire dicitur in montibus Galliae Narbonensis, quamvis me non vidisse fateor spontaneam.

Meum alterum Italicum quibusdam J. B. alterum Italicum Ger. spurium Italicum Park. latifolium adulterinum C. B. In collibus & clivis maritimis Regni Neapolitani.

Mezereon Germanicum, an Chamædaphne Dioscoridis Lob. ? Laureola folio deciduo, flore purpureo C. B. Laur. fol. dec. five Mezereon Germanicum J. B. Chamælaea Germanica five Mezereon Ger. Cham. Ger. five Mezereon vulgò Park. In montosis Germaniæ passim. Habetur & in collibus & montibus circa Genevam. Facultatis est causticæ & adurentis, nec intra corpus tutò sumitur.

Milium arundinaceum C. B. v. Melica.

Millefolium nobile Trag. Achillea five Millefolium nobile Ger. Achillea Sideritis, five nobilis odorata Park. Achillea millefolia odorata J. B. Tanacetum minus album odore Camphoræ C. B. In Germania ad Rhenum, Gallia Narbonensi circa Monspelium, & in Italia passim.

Millefolium luteum Ger. Park. tomentosum luteum J. B. C. B. Circa Avenionem, & juxta viam quæ Auriaco Avenionem ducit, ubi & Clusio observatum Hist. lib. 3. cap. 37.

Mollugo montana latifolia ramosa C. B. Gallium five Mollugo montana Ger. Gallium flore albo majus, five Mollugo montana Park. Rubia sylvatica lævis J. B. In sylvis, agro Luceburgensi & Aquisgranensi.

Moly moschatum capillaceo folio C. B. moschatum vel Zibetinum Monspelienae Park. Allium sylv. perpusillum juncifolium moschatum J. B. in collibus propè Monspelium & Sellam novam, aux Garigues.

Moly parvum caule triangulo C. B. caule & foliis triangularibus Park. Primò inter Lericium & Massam; deinde circa Baias copiosè.

Mono-

*Monophyllon* Ger. Mon. five *Unifolium* Park. Mon. recentiorum *Lob.* Mon. five *Lilium convallium minus* C. B. *Unifolium*, five *Ophrys unifolia* J. B. Primò in luco quodam juxta Hagam Comitum Hollandiæ, deinde in omnibus ferè editioribus Belgii & Germaniæ sylvis & dumetis.

*Morus alba* Ger. Park. J. B. fructu albo C. B. *The white Mulberry.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi copiosissimè seritur ad bombyces alendos, sunt enim folia ejus teneriora & vermiculis hisce graviora quàm nigra.

*Morus nigra* Park. J. B. fructu nigro C. B. *Morus* Ger. *The black Mulberry-tree.* Cum priore.

N. 1. Fructus nigrae (*mora Celsi* officinis dicti) immaturi refriger. sicc. astringunt validè. Usus præcip. in diarrhoea, dysenteria, fluxu menstruo, expuitione sanguinis; Extrinsecus in faucium ac oris inflammationibus ulceribusq; *Schrod.*

2. Mora matura refrigerant, alvum subducunt initio pastus & ante alios cibos sumpta, nam post alios cibos facile corrumpuntur; sitim sedant, appetitum excitant, &c. *Schrod.*

3. Cortex radices abstergit, astringit, hepar ac lienem aperit, alvum laxat, tineas latas necat: Circa messem circumfossa & incisa dat succum qui concrevit & ad dentium dolores efficax est. Quin & folia vel sola vel cum cortice cocta odontalgiam sedant. Veteres plura habent, quos consule. Syrupus mororum ad supradicta omnia valet, & grata sua aciditate febrilem ardorem restinguit.

4. *Morus urbanarum* novissima germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. *Plin.*

*Muscus Alpinus* flore insigni dilutè rubente J. B. *Gentianella* omnium minima C. B. Park. In altissimis verticibus montium max. *Carthusianorum cœnobio* imminentium.

*Muscus denticulatus* Ger. *denticulatus major* C. B. Park. terrestris *denticulatus* Lob. pulcher parvus repens J. B. In aggeribus umbrosis in Italia & parte meridionali Germaniæ.

*Muscus capillaceus longissimus*, i. e. *Muscus arboreus II*, C. B. Hunc longissimis capillaceis filamentis densè stipatis ex *Abietibus* dependentem in Germania vidimus & collegimus. Chartas in quibus composita fuit colore flavo adrusum tendente infecit.

*Myagro affinis* herba capitulis rotundis J. B. *Myagro similis* filiquâ rotundâ C. B. Park. Hanc inter plantas nostras siccas habemus, ubi collegimus jam non recordamur.



## CATALOGUS STIRPIUM

*Myrica* 1 *Clus.* *Tamariscus* folio tenuiore *Park.* *Narbonensis* *Ger.* *Tamarix* altera folio tenuiore, sive *Gallica* *C. B.* major sive arborea *Narbonensis* *J. B.* Ad mare propè *Monspeliolum* abundè.

*Myrica* *sylv.* altera *Clus.* *Tamariscus* folio latiore *Park.* *Germanica* *Ger.* *Tamarix* fruticosa folio crassiore, sive *Germanica* *C. B.* *Germanica*, sive minor fruticosa *J. B.* Ad ripas fluviorum, v. g. circa *Augustam* *Vindelicorum*, *Genevam*, &c.

N. 1. *Absterg.* ac *subastringit.* *Ufus* præcip. in obstruktionem ac tumore *lien*is. Adeò mirabilem *antipathiam* contra solum hoc viscerum faciunt (inquit *Plinius*) ut affirmant, si ex *alveis* factis bibant sues sine *liene* *inveniri.* De ligno *Ægyptii* (teste *Alpino*) decoctum parant ad *luem* *Veneream* curandam non secus ac nostri de *Guaiaco*, quod exhibent *leprosis*, *scabiosis*, &c. cum *scelici* *successu.* Idem faciunt in *melancholicis*, *ictericis* *nigris* & *hydropicis.* *Extrinfecus* in *tinea* *capitis* & obstruktionem *menstruorum* valet.

2. *Doliola* è *Myricæ* *assulis* *Frankfurti* ad *Mœnum* *venalia* memorat *Clusius*, quibus contentus liquor *lienosis* prodest.

3. *Curæ* *Edmundi* *Grindalli* *Archiepiscopi* *Cantuariensis* *Tamaricem* *Angli* debent, quam *induratum* *lien*is *passionem* *eximie* *juvare* *expertus* *primus* in *Angliam* *transulit.* *Camden.* *Annal. Elizab.*

*Myrtus* *communis* *Italica* *C. B.* An *Myrtus* *fructu* *albo* *Ger.?* *Myrtus* *vulgaris* *nigra* & *alba*, *sativa* & *sylvestris* *J. B.* In *Italia* & *Gallo-provincia* *frequentissima*, ad *mare* *inferum*, itémque in *Sicilia.*

N. 1. *Hujus* *tum* *folia*, *tum* *baccæ* (*myrtilli* *Officinarum*) *refrigerant* *temperatè*, *siccant* *validè* *astringuntque.* *Ufus* *internus* *rarior* *est*, *nihilominus* *tamen* *adhibentur* in *fluxu* *alvi* ac *expuitione* *sanguinis.* *Extrinfecus* *usus* *utriusque* *crebrior.*

*Folia* *emendant* *scetorem* *sub* *axillis* ac *inguinibus* (*pulvis* *asperfus*) *sudorem* *corporis* *immodicum* *sistunt* (*frictione*) *membris* *catarrhosis* *opitulantur*, *alvi* *fluxui* *succurrunt*, *defensivum* *exhibent* in *herpetibus*, *putredinem* *oris* *sanant*, *hæmorrhagiam* *narium* *sistunt*; *polypo* *medentur* (*cum* *melle* ac *vino.*)

*Baccæ* *mitigant* *oculorum* *inflammationes*; *juvant* *luxatos* *articulos* ac *ossa* *fracta*; *subveniunt* *procidentiæ* *uteri* ac *ani*; *capitis* *tineas* *furfuraceæque* *excrementa* *abigunt.* *Schrod.*

Præcipuæ

Præcipuæ eorum vires dependent ab adstrictione & suavitate odoris, ut singulas examinanti manifestum fiet.

2. Bellonius refert Illyricos Myrti foliis coria perficere, quemadmodum Macedones Rhoe; Ægyptios Acaciæ fiquis; Asiæ minoris incolas glandium Æsculi calicibus; Gallos Quercûs libro; Phryges sylvestris Pini corticibus. *Clus. hist. lib. i. cap. 43.*

N.

**N**arcissus medioluteus *Lob. Ger.* An medioluteus polyanthos *Ger.?* medioluteus XI, five copioso flore, odore gravi *C. B.* Narcissus multos ferens flores, medioluteus Narbonensis *J. B.* Itinere à Lericio ad Massam, & à Massa ad Lucam inter segetes copiose.

Natrix Plinii v. Anonis lutea major.

Nasturtium Alpinum tenuissimè divisum *J. B. C. B.* Cardamine Alpina *Ger.* Alpina minor *Park.* In summis jugis montium Juræ & Salevæ locis humidioribus.

Nerium Alpinum v. Ledum.

Nerium v. Oleander.

Nigella arvensis *Park.* arvensis cornuta *C. B.* Melanthium Sylvestre *Lob. Ger.* Sylv. five arvense *J. B.* Per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem inter segetes passim.

N. i. Usus semin. præcip. in mucilagine pulmonum resolvenda & expectoranda, lacte augendo, urinâ ac mensibus ciendis, morsibus venenatis corrigendis. Specificè in febribus quartanis & quotidianis. Extrinsecus crebri usus est in Cephalalgia sedanda; catarrhis exiccandis, in cucuphis Epithemat, &c. applicatum *Schrad.*

2. Radix sistit proprietate sua hæmorrhagiam, si dentibus masticetur, naribusque imponatur. *Idem.*

3. Exprimitur ex semine. isto oleum, quo imperiti Pharmacopœi plerique pro oleo nardino non absque gravi utuntur errore. *Dod.*



## CATALOGUS STIRPIUM

### O

**O** Cymastrum Valerianthon v. Valeriana.  
Ocymoides repens v. Saponaria minor.

Ochrus five Ervilia *Dod. Lob. Ger.* Och. five Erv. flore & fructu albo *Park.* Och. folio integro capreolos emittente *C. B.* Lathyri species quæ Ervilia sylvestris Dodonæo *J. B.* Inter segetes propè Liburnum portum.

Olea sativa *J. B. Ger. Park. C. B.* In territorio Lucae urbis, In Gallo-provincia, & alibi in Italia & Gallia Narbonensi copiosissime.

N. Oleæ vires & usus explicare nimis prolixum foret & perdifficile. Sic breviter Schroderus. *Folia* refrigerant, exiccant & astringunt. Usus externus & præcip. in fluxu alvi, mensium, in herpetibus & sim. *Fructus* immaturi exiccant & astringunt, præsertim sylvestres. *Olivæ conditæ* excitant appetitum, movent alvum, humentem ventriculum exiccant & confortant. Condiuntur a. antequam planè maturuerint.

2. Oleum quod exprimitur ex olivis maturis calefacit & humectat moderatè (N. vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, alvum laxat (cum cerevisia calida assumptum *3i*) ariditatem pectoris corrigit, tormina ventris mitigat, meatus urinarios laxat, erosos abstergit & consolidat. Extrinsecus creberrimi usus est in clysteribus, tumoribus calidis, &c. Cum aqua tepida assumptum movet vomitum.

3. Oleo quidem non Apes tantum sed & omnia insecta exanimantur. *Plin. Lib. 11. cap. 19.* quod *Cl. Vir M. Malpighius* in Bombyce aliisque experiendo verum invenit. Ratio est, quia oleum meatus Spiritus, seu poros quibus aer attrahitur & redditur obstruit, ob cujus defectum animalculum illicò moritur. Nec enim minimis hisce insectis respiratio minùs necessaria est ad vitam quàm majoribus & perfectioribus animalibus: saltem sine aeris beneficio diu movere & vivere non possunt.

4. Oleum picem è pannis extrahit, quod aqua non facit. Vulgatum est, (inquit Sennertus) ut si quis manum pice inquinet, eam aquâ non mundet sed oleo aliquo aut pinguedine, quæ picem liquefaciat. *Hypomn. 1. cap. 5.*

5. Scribit

5. Scribit F. Licetus, se vidisse Rechi in horto patru sui stipitem oleæ sativæ aridum ferè ac levem, per decennium & ultra à trunco separatam, neque posthac unquam terræ implantatam, ad alterius ligni fulcrum in terram demissum, & ligno cui fulcimentum præstabat clavis ferreis affixum, pullulasse, germinasseque eodem anno, plures olivarum novellas foliis & fructibus onustas, atque in posterum etiam per plures annos protulisse. *Sennert. Hypomn. 5. cap. 7.* Unde abundè confirmatur illud Poetæ, *Truditur è sicco radix oleagina ligno.*

6. In Hispania oleas admotis scalis manu legunt, & non decutiunt ut in Gallia Narbonensi; nè sc. sequentis anni spem decussis germinibus præripiant. Vehementer enim laborant percussæ & detrimentum capiunt *Clus.*

7. Olivæ quamvis per maturitatem nigræ sunt, sapore quoque acri, amaro & nescio quid nauseosi admixtum habente; oleum tamen quod indè exprimitur ferè pellucidum est, nonnihil flavicans, sapore dulci & grato, unde patet saporem hunc & odorem parti aqueæ seu amurcæ inhærere. Laudatissimum autem apud nos habetur oleum, quod coloris omnis & saporis maximè expers est.

Oleander flore rubro *Park.* Nerium five Oleander *Ger.* Nerium five Rhododendron *J. B.* Nerion floribus rubescentibus *C. B.* In Sicilia ad aquarum rivulos in ascensu montis *Ætnæ.*

Onobrychis spicata flore purpureo *Park.* *C. B.* flo. purpureo *Ger.* quibusdam, flore purpureo *J. B.* In loco quodam glareoso non longè à Vienna *Austriæ.*

Onobrychis vulgaris minor *Park.* fructu echinato minor [*C. B.* Ad radices Vesuvii montis & insula sæpiùs memorata ad Prom. Pachynum. Flos hujus purpureus est & minor quàm vulgaris; fructus a. echinatus major.

Onobrychis arvensis *C. B.* v. Speculum Veneris.

Onobrychis femine clypeato aspero v. Hedysarum clypeatum.

Opuntia marina *Park.* Scutellaria five Opuntia marina *J. B.* Lichen marinus rotundifolius *Ger.* Fucus folio rotundo *C. B.* Sertolara *Imper.* In maris litora rejectam collegimus ad *Punto Cercioli*, non longè à Castello *Puzallu* in Sicilia.

† Orchis galeâ & alis ferè cinereis *J. B.* Cynosorchis latifolia hiantè cucullo minor *C. B.* Cynosorchis altera *Dod. de floribus*, ubi bona ejus habetur descriptio. Cynosorchis major altera *Ger.* latifolia minor *Park.* Circa *Genevam* ad agrorum margines. Aprili & Maio mensibus floret. Hanc non ita pridem in *Anglia* sponte natam observavimus. *V. Cat. Ang.*



- Orchis anthropophora* flore fusco. In marginibus agrorum quorundam propè ripas Rhodani non longè à Geneva.
- Orchis macrophyllus* Columnæ *Park.* *Orchis* five *Testiculus* maximo flore *J. B.* *Orchis montana Italica* flore ferrugineo, linguâ oblongâ *C. B.* Per totam ferè Italiam ad mare inferum, vidimus enim Massæ, Liburni, Neapoli in pascuis ficcioribus.
- Orchis magna*, latis foliis, galeâ fuscâ vel nigricante *J. B.* Ad latera montis Salevæ propè Genevam. *Thyrus* florum speciosus est.
- Orchis strateumatica minor* *Ger. J. B.* *Cynorchis militaris minor* *C. B. Park.* In pascuis ad latera montis Salevæ.
- Orchis rotunda Dalechampii* *J. B.* *Cynorchis capitulo globoso* *Park.* *Cyn. milit. IX*, five globoso flore *C. B.* In summitatibus Juræ montis.
- Orchis palmata minor* odoratissima purpurea five nigra *J. B.* palmata *XXI*, five Alpina angustifolia nigro flore *C. B.* palmat. angustifolia minor odoratissima *Park.* In herbidis jugis & pascuis montium Juræ & Salevæ copiose.
- Orchis fœtida III.* five odore hirci minor *C. B.* *Tragorchis fœmina* *Ger.* minor & verior *Park.* *Tragorchis minor* flore fuliginoso *J. B.* In pascuis quibusdam non longè à Geneva.
- Oreoselinum v.* *Apium montanum* nigrum.
- † *Ornithogalum luteum* *C. B. Dod.* luteum, five *Cæpe agraria* *Ger.* Bulbus sylvestris *Fuehii* flore luteo, five *Ornithogalum luteum* *J. B.* In agro Pedemontano ad sepes & inter segetes. Invenimus etiam in Helvetia.
- Ornithogalum spicatum* *Ger.* spic. flore albo *Monspessulanum* *J. B.* majus spicatum flo. albo *C. B.* In insula ad Prom. *Pachynum*, atque etiam *Monspeli* inter segetes.
- Ornithogalum vulgare* *Ger.* vulgare & verius, majus & minus *J. B.* umbellatum medium angustifolium *C. B.* In Lombardia, Pedemontio, & agro Lucensi inter segetes.
- Ornithogalum spicarum* flore virente *v.* *Asphodelus.*
- Ornithopodio* similis hirsuta *Scorpioides* *C. B.* *Scorpioides leguminosa* *J. B. Dod. Ger. Park.* Circa Messanam Siciliæ & Neapolin Italiæ frequens.
- Orobanche ramosa* *Ger. Park. C. B.* minor purpureis floribus, five ramosa *J. B.* In arvis demessa segete primò circa Ratisponam in Germania observavimus, postea etiam in Italia & Gallia Narbonensi.

*Orob. receptus herbariorum* *Lob. Ger. vulgaris herbariorum* *Park. filiquis articulatis, femine majore* *C. B. Orobus five Ervum multis* *J. B. In agris circa Monspelim & Genevam.*

*Orob. sylvaticus purpureus vernus* *C. B. Pannonicus 1 Clus. sylvaticus purpureus major* *Park. sylvat. vernus* *Ger. emac. Galega nemorensis verna* *J. B. In dumetis à la Bassie, & alibi circa Genevam, inque Germaniæ & Helvetiæ sylvis frequens.*

*Orob. sylvaticus Viciæ foliis* *C. B. Pannonicus 2 Clus. Astragaloides* *Ger. Astrag. herbariorum* *Park. Astragalus major Fuchfio* *J. B. Abundat in colle La Bassie, ad ripas Rhodani & in montis Salevæ sylvis propè Genevam: in Germania quoque non admodum rarus est.*

*Oryza* *Lob. Ger. Park. J. B. Italica* *C. B. In Italiæ palustribus Ferrariam inter & Bononiam satam vidimus.*

*N. In cibis admodum est familiaris, gratissimi saporis; multum nutrit & semen auget: verum obstruentis naturæ est & alvum leniter adstringit. Proinde datur in cibis utiliter dysentericis, coeliacis & diarrhœa affectis: Oryzâ nunc dierum vescitur (si Americanos excipias) humani generis pars maxima, Turcæ, Persæ, Indi, Africanæ, Sinenfes, &c.*

*Oxalis maxima sylvatica* *J. B. Acetosa montana maxima* *C. B. Acetosa max. Germanica* *Park. In monte Thuri propè Genevam.*

*Oxyacantha Theophrasti* *Ger. v. Pyracantha.*

*Oxys lutea* *Ger. J. B. lutea corniculata repens* *Lob. luteo flore* *Park. Trifolium acetosum II, five corniculatum* *C. B. In Italia & Sicilia, umbrosis præsertim, ubique ferè obvium.*

*Oxycedrus v. Cedrus Lycia retusa* *J. B. & Juniperus.*



## P

**P**Aliurus *Lob. Dod. Ger.* Paliurus five Rhamnus 3 Dioscoridis *Park.* Rhamnus five Paliurus folio Jujubino *J. B.* Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C. B.* In sepibus circa Veronam, Bergamum, Romam & alibi in Italia, necnon circa Monspelim.

Palma five Manus marina *J. B.* Urtica marina *X.* five Manus marina *C. B.* Habuimus ex sinu Adriatico, & mari infero circa Romam.

Palma humilis *v.* Chamærrhiphes.

Palma Christi *v.* Ricinus.

Panax Herculeum majus *Ger.* pastinacæ folio, an Syriacum Theophrasti *C. B.* Heracleum alterum five peregrinum Dodonæi *Park.* Sphondylion, vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis, Panax, vel Pseudo-costus flore luteo *J. B.* In Sicilia non longè à castello *Puzallu.*

N. Ex hujus vulnerato circa radicem caule succus æstivis mensibus manat æstate fervida, etiam in Belgio. *Dod.* In Opopanacis grumis reperta semina in Belgio fata hanc plantam produxere. *C. Hoffman.*

Pancratium *Lob.* marinum *Ger.* Monspessulanum, multis Scylla alba parva *J. B.* Narcissus maritimus *C. B.* In arenoso maris litore propè Neapolin copiose. Post solstitium æstivum floret.

Panicum sylvestre *v.* Gramen paniceum.

Paronychia five Alfinefolia incana *J. B.* Anthyllis maritima incana *Park.* marit. Alfinefolia *C. B.* marina incana Alfinefolia *Ger.* In vineis circa Messanam & Monspelim.

Passerina Lobelii *J. B.* P. Linariæ folio Lobelii *Ger.* Lithospermum Linariæ folio Monspeliense *Park.* IX, five Linariæ folio Monspeliacum *C. B.* Circa Monspelim. In insula ad Promont. Pachynum proceriorem observavimus.

Passerina Tragi *J. B.* Pas. altera *Ger.* Lithospermum Linariæ folio *C. B.* Lithospermum Germanicum, Passerina Tragi *Park.* In arvis demessa segete circa Basileam, Genevam, Monspelim, &c.

Pastinaca marina *Lob. v.* Crithmum.

Pedicularis Alpina lutea. *Yellow mountain Louse-wort, Rattle or Cocks-comb.* In altissimis montibus maximum Carthusianorum cœnobium cingentibus.

Peganium

- Peganium Narbonensium* *Lob.* v. *Ruta sylvestris minima.*
- Pentaphyllum* five potius *Heptaphyllum argenteum* flore muscoso *J. B.* *Alchimilla Alpina quinquefolia C. B.* minor quinquefolia *Park.* In monte Jura & in Alpibus Sabaudicis copiose. De hac planta v. *J. B.*
- Pentaphyllum* v. *Quinquefolium.*
- Peplus minor* *J. B.* In agris propè Ladum *Monspeliacum* amnem non longè à *Castlencuf.*
- Perfoliatum angustifolium montanum Col.* *Perfoliata minor angustifolia, Bupleuri folio C. B.* *Perf. angustif. Alpina minor Park.* *Auriculæ Leporis affinis, Odontitis lutea Valerandi ac Dalechampii J. B.* In agris quibusdam Siciliae sterilioribus propè *Punto Cerciolo,* non procul *Puzallu vico.*
- Perfoliata minor foliis gramineis J. B.* *P. Alpina gramineo folio five Bupleuron angustifolium Alpinum C. B.* An *Perfoliata Alpina angustifolia minima C. B.?* In fumini montibus max. *Carthusianorum cœnobio vicinis.* Icon *Ponæ,* quam proponit *Parkinsonus* sub titulo *Bupleuri angustifolii Alpini;* *Gerardus* sub tit. *Sedi petraei Bupleuri folio,* huic nostræ plantæ non bene convenit.
- Periclymenum perfoliatum Ger. J. B. C. B.* *perfoliatum calidarum regionum Lob.* *perfoliatum five Italicum Park.* in Italia & Gallia *Narbonensi.*
- Periclymenum rectum fructu rubro J. B. Park.* *rectum Germanicum Ger.* *Chamæcerasus dumeterum fructu gemino rubro C. B.* In Germania, ad sepes & in dumetis *vulgatissimum.*
- Periclymenum rectum fructu nigro Park.* *rect. fructu gemino nigro J. B.* *Chamæcerasus Alpina fructu nigro gemino C. B.* In sylvis juxta *Sacellum Brunonis,* à la *grand Chartruse.*
- Periclymenum rectum fructu rubro Ger.* *fructu rubro singulari majore Park.* sed perperam, nam semper *geminum* habet. *Chamæcerasus Alpina fructu rubro gemino, duobus punctis notato C. B.* *Chamæcerasus Gesneri, seu Chamæpericlymenum quoddam Alpinum J. B.* In monte *Salève* copiose.
- Petasites albus anguloso folio J. B. minor C. B. Park.* In declivibus montium quos transivimus eundo à *Gavia* ad *Genuam.*
- Peucedanum majus Ger.* *majus Italicum Lob. J. B. C. B. Park.* In lingua illa *Portum Messanensem* à *Freto Siculo* dirimente.
- Phalangium pulchrius non ramosum J. B.* An *Phalangium flore Lillii ejusdem?* *Phalangium I,* five magno flore, & fortè



## CATALOGUS STIRPIUM

- fortè etiam II, five parvo flore non ramosum *C. B.* Phalangium non ramosum *Ger.* In monte Sabaudia Genevæ vicino, *Salve* dicto.
- Phalangium parvo flore ramosius *J. B.* III, five parvo flore ramosum *C. B.* ramosum *Ger. Park.* Circa Francofurtum, Basileam, Genevam, &c. in collibus, pascuis montosis & ericetis.
- Phalangium Cretæ Salonenfis *Lob. Ger.* Asphodelus VII, five foliis fistulosis *C. B.* minor foliis fistulosis *J. B.* In campis lapideis seu Salonenfi Cretâ vulgò *The Craux*, inter Arelaten urbem & oppidum Salonom copiosissime.
- Phalaris semine nigro *Park.* major semine nigro *J. B. C. B.* Circa Messanam in Sicilia; Baias & Neapolin in Italia; & Monspelium in Gallia Narbonensi. Ab hac non differre suspicor Gramen phalaroides majus five Italicum *C. B.* Grana hujus minora sunt quàm Phalaridis vulgaris.
- Phillyrea ferrata 2 Clusii *Ger.* & Phillyrea latifolia spinosa *C. B.* seu 1 Clusii, Phillyrea folio Alaterni, & Phillyrea folio Ilicis *J. B.* Phillyrea latifolia aculeata, & Ph. folio lato ferrato *Park.* Existimo enim has duas non differre specie. In Etruria copiosissime, itémque circa Monspelium in præruptis clivis non longè à specu Frontignana; ad montem *Lupi* & alibi.
- Phillyrea angustifolia *J. B. Ger. Lob.* angustifolia prima *C. B.* angustifolia secunda *Park.* In Etruria abundè, necnon circa Monspelium.
- Phillyrea latiusculo folio *J. B.* latiore folio *Ger.* angustifolia prima *Park. Phil.* 4, five folio Ligustri *C. B.* In Etruria inter Massam & Lucam; item in Provincia Gallica. Hæc fortè non differt specie à priore, nam in hujus plantæ, ut & Alaterni, foliorum figurâ, magnitudine, colore, incisuris mirè ludit natura.
- Plithora v. Thora.
- Phyllon marificum & sceminificum *Park.* arrhenogonon & thelygonon folio incano Monspeulanum *J. B.* Phyllon testiculatum, & Phyllon spicatum *C. B.* Phyl. arrhenogonon five marificum, & Phyl. thelygonon five sceminificum *Ger.* In aggeribus fossarum & viis publicis Monspelii, præsertim propè aquas.
- Phyteuma Monspelienisum *Lob. J. B.* Resedæ affinis Phyteuma *C. B.* Res. aff. Phyteuma Monspelienisum dicta *Park.* Circa Monspelium passim; in Italia quoque circa Romam & alibi. Hæc planta omnino Resedis annumeranda est.
- Picea Latiorum v. Abies mas Theophrasti.

Pilosella minor folio angustiore minus piloso repens *J. B.* major repens minus hirsuta *C. B.* In pascuis & collibus circa Genevam.

Pilosella minore flore hirsutior & elatior non repens *J. B.* Pil. major erecta *C. B.* major *Ger.* altera erecta *Park.* Et hanc circa Genevam inveni.

Pilosella five Pulmonaria lutea angustiori folio, valde pilosa altera *J. B.* In monte Saleva Genevæ propinquo.

Pilosellæ majoris seu Pulmonariæ luteæ laciniatæ species minor *J. B.* In prædicto monte Saleva, in rupium fissuris.

Pinaster, five Pinus sylvestris Hispanicus major *Clus.* *J. B.*

Pinus VI, five maritima altera *C. B.* Ab hoc non differt specie, ipso Clusio monente, Pinaster Austriacus major albus *Clus.* *J. B.* Pinus II, five sylvest. *C. B.* Parkinsonius & Gerardus in hac arbore mihi non satisfaciunt. Habet a. folia longa, in viriditate nigricantia; conos oblongos, turbinatos, ramorum alas spectantes & reflexos, nucleis parvis, nec mali vulgaris nucleis multò majoribus, quibus & figurâ suâ accedunt. Habetur in viridariis nostris in Anglia frequens; nonnullis *The mountain Pine* dicta: ubi (ut rectè Clusius) in Pini sat. altitudinem excrescit. Provenit, autore Clusio, in Aquitania & Pyrenæis frequentissimè; quod & *D. Willughby* nobis confirmavit; & plurimam Resinam fundit; est etiam in Suevia, Bavaria, Austria, &c. passim obvia. Suspiciatur *J. Bauhinus* non differre hanc à Pinu sua sylvestri & Tæda.

Pinaster alter Hispanicus vel minor Hispanicus *Clus.* Pinus V, five maritima major *C. B.* sylvestris sterilis elatior *Park.* sylv. maritima conis firmiter ramis adhærentibus *J. B.* In Alpibus Stiriæ. Hujus folia breviora sunt & magis glauca quàm præcedentis, conii minores. Hortulanis nostris perperam *the Scotch-Fire*, i. e. *Abies Scotica* dicitur.

Pinus sativa *C. B.* sativa five domestica *Ger.* urbana five domestica *Park.* officulis duris, foliis longis *J. B.* In Gallia Narbonensi & Italia: copiosissimè autem propè Ravennam.

N. 1. Hæc arbor vulnerata Resinam fundit liquidam, quæ postea coquendo fit arida.

2. Pix liquida seu navalis è Pinu vi ignis excoquitur hoc modo. Pinuum vetustarum stipites pingues & Resinâ adèò prægnantes ut accensi instar facis ardeant, (hujusmodi arbores Antiqui tædas appellant) assulatim cæsos super area seu pavimento è luto unto aut lapidibus antea præparato, & à centro undique ad circumferentiam paulatim declivi,



declivi, in strues aut acervos componunt, iis similes quos extruunt qui carbones faciunt. Strues hasce ramulis faginis pineisve circumcirca contegunt, & deinde pulvere aut luto superimposito curiosè loricant, ne quà fumus aut flamma exire possit. Ignem postea desuper accendunt, quemadmodum carbonarii solent, qui liquorem ligni oleosum inferiùs subfidere ad ima compellit. Is autem ob pavimenti declivitatem, in canalem, (qui acervum undique coronæ instar cingit) promptè delabitur, indèque per alios ductus in foveas aut vasa ei recipiendo destinata, derivatur. Ex hoc in cortiaas injecto, & tandiu decocto donec humor omnis absumatur, fit Pix arida & rasilis, Græcis *πάλμπτια* dicta. Nostres Picem liquidam *Tarre* vocant; siccam verò seu aridam *Pitch*.

3. Pini cujuscunque cortices & folia refrigerant & astringunt, undè in dysenteria & fluore mensium profunt. Nuces pineæ caliditate temperatæ sunt & humidæ, maturant, leniunt, impinguant. Nuclei saporis sunt delicatissimi, & in Italia mensis secundis adjiciuntur. Usus præcip. in phthisi (quia nutriunt bene) tussi, stranguria ac acrimonia urinæ, quam mitigant: Segnem excitant Venerem, ulcera renum mundificant, &c.

4. Decoctum aut infusum summitatum Pinus in cerevisia aliove idoneo liquore ad calculum renum & vesicæ plurimum valere creditur, necnon ad scorbutum aliòsque thoracis affectus.

N. Resina omnis confert præcipuè tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle) urinæ ac alvo ciendæ; calculum pellit, arthriticos affectus juvat, gonorrhœam sistit. Extrinsecus Chirurgis usitatissima est in emplastris; movet enim pus, maturat, & scabiei medetur. Sunt qui Terebenthinam vulgarem (est autem ea laricis resina) in cerevisia infundunt, atque simul deservere sinunt, pro potu ordinario in præservatione calculi viscerumque obstructionibus.

*Plantago quinquenervia* cum globulis albis pilosis *J. B.* *angustifolia* VIII, sive paniculis *Lagopi C. B.* *angustifolia* paniculis *Lagopi Park.* Circa Messanam. Habetur quoque *Monspeli* & *Nemausi*.

*Plantago angustifolia Alpina J. B.* *Holosteum* III, sive hirsutum nigricans *C. B.* In summis jugis montis Juræ.

*Plumbago* *Plinii Ger.* *Dentilaria Rondeletii J. B.* *Lepidium Dentellaria* dictum *C. B.* *Lep. Monspeliacum, Dentilaria* dictum *Park.* Circa Syracusas in Sicilia, Romam & alibi in Italia, *Monspesium* in Gallia *Narbonensi*.

*Polemonium* five *Trifolium fruticans* *Ger.* *Polem.* five *Trif.* frut. vel *Jasminum luteum* vulgare *Park.* *Trifolium fruticans*, quibusdam *Polemonium*, flore luteo *J. B.* *Jasminum* V, five luteum vulgò dictum, bacciferum *C. B.* In sepibus circa *Monspelim*; vidimus etiam in Regno *Neapolitano* propè *Scaleam*.

*Polium montanum album* *C. B. Ger.* *Monspessulanum* *J. B.* *P. Mont.* *Monspeliacum* *Park.* In Italia & Gallia *Narbonensi*. *C. Bauhinus* malè, meo quidem iudicio, distinguit inter *Polium montanum album* & *P. maritimum erectum Monspeliacum*, cum una & eadem planta sint.

*Polium montanum Levendulæ folio* *Park.* *montanum I.* set *Lavendulæ folio* *C. B. Pol.* *Lavandulæ folio*, flore albo *Ger.* In montosis circa *Basileam*, *Genevam* & alibi.

N. *Polium* cum acre sit & amarum, urinam & menses ciet, venenatis moribus auxiliatur, *Hydropicos* & *ictericos* juvat, secundum veteres. *Theriacam* & *Mithridatium* ingreditur.

† *Polygonatum Lob. Ger.* *latifolium vulgare* *C. B. Polyg.* vulgò *Sigillum Solomonis* *J. B.* In Belgio, Germania, Gallia & Italia, in saxosis & ad sepes ubique. Hæc planta in Angliæ Australibus sponte provenit. v. *Cat. Ang.*

† *Polygonatum floribus ex singularibus pediculis* *J. B. latifolium 2 Clus. latifolium IV*, flore majore odore *C. B. majus flore majore* *Park. latifolium 2 Clusii Ger.* In rupibus montis *Saleve*. Et hæc Angliæ indigena est. V. *Cat. Ang.*

*Polygonatum minus Lob. Ger. angustifolium* *Park. J. B. angustifolium non ramosum C. B.* in sylvis circa *Spadam* oppidulum acidulis celebre copiosissimè. Vidimus & in sylvosis montis *Salevæ*.

*Polygonum montanum niveum* *Park. montanum Ger. minus candidans C. B. Paronychia Hispanica Clusii five Anthyllis nivea J. B. White Mountain Knotgrass.* Circa *Messanam* copiosè.

*Polygonum vel Linifolia* per terram sparsa, flore *Scorpioidis* *J. B.* In Etruria non longè à *Viterbo*, cum *Romam* contenderemus, copiosam observavimus. *J. Bauhinus* extra scopum jaculatur, cum hanc refert ad *Millegranam minimam Lobelii*, à qua longè differt.

*Polygonum bacciferum maritimum v. Tragos.*

*Portulaca sylvestris Lob. Ger. Park. sylv. minor five spontanea J. B. angustifolia, five sylvestris C. B.* In Italia, Sicilia, Gallia *Narbonensi* & Germania, in vervactis & ad vias. Sativam ab hac culturæ tantum ratione differre existimo, quamvis in magnitudine omnium partium insignis sit differentia.



N. 1. In acetariis frequens usus est *Portulacæ*, stomachi ardorem lenit & bilis fervorem, & hinc in febris putridis ac malignis, ardore urinæ, & Scorbuto prodest; venerem inhibet, venerisque insomnia. Dentium stuporem commanducata tollit, & mobiles dentes stabilis. Verminantibus pueris cum successu exhibetur. Verum esus ejus nimis cavendus est quoniam ob frigiditatem suam & humiditatem in ventriculo putrescere apta est, ejusque & viscerum reliquorum tonum dissolvere.

2. Solet apud nos condiri ad intinctus eodem modo quo Cappares, Genistæ flores, Lingua avis, &c. conduntur.

*Portulaca marina*, v. *Halimus*.

*Prunella angustifolia* J. B. *hyssopifolia* C. B. Circa Monspelium variis in locis.

*Prunella cæruleo magno flore* C. B. *magno flore purpureo* Park. *flore magno folio non laciniato* J. B. Primo observavimus hanc Moguntiae, postea circa Genevam & alibi.

*Prunella laciniata flore magno purpureo* J. B. *Prunella Lobelii* Ger. *Prun. laciniato folio* Park. Cum priore.

*Pseudo-asphodelus* quibusdam J. B. *Asphodelus* Lancastriae verus Ger. *emac.* minimus Norvegicus luteus palustris Scotticus & Lancastriensis Lob. *Pseudo-asphodelus minor folio Iridis angustifoliae* Park. *Pseudo-asphodelus palustris* Scotticus, & *Pseudo-asphodelus Alpinus* C. B. qui hos duos (ut mihi videtur) malè separat. Ad radices montis Salevæ in aquosis. Vidimus quoque nonnusquam in Germania.

*Pseudo-melanthium glabrum*. In Sicilia inter segetes propè castellum *Puzallu*, & in montibus Messanae imminentibus. Simile est *Pseudo-melanthio* vulgari, diversum tamen, &, ut puto, nondum descriptum.

*Pseudo-stachys Alpina* C. B. Park. In summis jugis montis Juræ.

*Psyllium majus supinum* C. B. J. B. *majus semper virens* Park. *semper virens Lobelii* Ger. *Plinianum* fortè, radice perenni, *supinum* Lob. Circa Monspelium & in Italia frequens.

*Psyllium vulgare* Park. *majus erectum* C. B. J. B. *Psyllium* sive *Pulicaris herba* Ger. Circa Monspelium in agris copiosè. *Psyllium* dicitur quia semina ejus pulicibus similia sunt.

N. Evacuat bilem flavam, mucilaginéque sua acrimoniam humorum obtundere aptum est. Hinc convenit maximopere in Dysenteria & corrosione intestinorum. Semen *Psyllii* hoc peculiare præ cæteris purgantibus habet, quod

quod qualitate refrigerandi sit præditum. Verùm enim-  
verò non tamen extra reprehensionem positum est, quam  
incurrit ratione virulentiae suæ. *Schrod.* Nimio usu sto-  
machum offendit, & animi deliquium inducit.

*Ptarmica Imperati, v. Xeranthemum.*

*Pulegium angustifolium Ger. C. B. angustifolium sive cer-  
vinum Lob. Park. cervinum angustifolium J. B.* Primò  
vidimus ad Rhodanum proximè pontem S. Spiritus dictum,  
deinde circa Monspelium in humidioribus.

*Pulmonaria maculosa Lob. Ger. maculata Park. Symphytum  
maculosum, sive Pulmonaria latifolia C. B. Pulmonaria  
Italorum ad Buglossum accedens J. B.* In sylvis propè  
Coloniam Agrippinam primò, postea in omnibus fere mon-  
tosis dumetis juxta Rhenum & propè Genevam in con-  
spectum se nobis dedit.

*Pulmonaria Gallorum v. Pilosella.*

*Pulsatilla alba J. B. Park. flore albo C. B. Ger.* In sum-  
mis Juræ montis jugis. Hæc non floris colore tantum,  
sed etiam totâ specie distincta est à vulgari *Pulsatilla*,  
quam memini me alicubi vidisse flore albo.

*Punica malus sylvestris C. B. Ger. Punica sylvestris major,  
sive Balauftium majus Park. Malus Punica J. B. The  
Pomegranate-tree.* In Gallia Narbonensi & Provincia passim.

N. Poma in genere censentur boni succi, ventriculo  
convenientia sed pauci nutrimenti.

*Dulcia* eorûmque syrupus adhibentur in tussi chronica  
& pleuritide: in febribus minùs commoda sunt, quia Ven-  
triculo inflationes causant.

*Acida* frigida sunt & adstringentia, stomachica. Usus  
præcip. in febribus biliosis, in Gonorrhœa, pica grvida-  
rum compescenda, orisque putredine corrigenda & fim.

*Vinosa* (acido-dulcia, *Granata mureæ*) mediæ sunt naturæ  
inter dulcia & acida, cardiaca ac cephalica. Usus præcip.  
in syncope, vertigine, &c. Ex malis hisce ad usus supra-  
dictos succus exprimitur & fermentatus depuratusque vinum  
dicitur.

*Flores*, tam *Balaustia* quàm *Cytini*, ejusdem sunt na-  
turæ, terrestres sc. validè adstringentis; unde creberrimus  
eorum usus esse solet in omnis generis fluxionibus v. g.  
diarrhœa, dysenteria, fluxu uterino, &c. in sanguine vul-  
nerum cohibendo, gingivarum laxitate emendanda, in  
hernia curanda, &c. Hæc omnia Schroderus.

*Cortex* (malicorium, psidium) ejusdem naturæ cum flo-  
ribus est. Utilis etiam ad coria præparanda, & ad atra-  
mentum vice gallarum. Addit Constantinus, Malicorium  
vino



vino decoctum ac potum omnes ventris tineas necare, maximè eas quas *Ascaridas* vocant.

*Nuclei* refrigerant itidem, astringuntque, imprimis qui ex pomis acidis collecti. *Schrod.* Breviter Flores, Cortex, nuclei, [adde & folia] ad ea conducunt quibuscunque adstrictione opus est.

Ex malis *Punicis* contusis cum suis corticibus exprimitur succus qui purgat bilem flavam, ut scribit *Cæsalpinus*.

*Pyracantha* *Lob. Clus.* *Pyr.* quibusdam *J. B.* *Oxyacantha* *Theophrasti Ger.* *Oxyacantha* *Dioscoridis*, five *Spina acida* *Pyri folio C. B.* Circa Florentiam & alibi in Etruria copiose.

*Pyrola folio ferrato J. B. folio mucronato ferrato C. B. tenerior Park. 2 tenerior Clusii Ger.* In montibus *Genevæ* vicinis, inque sylvis montosis non longè à *Constantia* versùs *Scaphusiam*.

*N.* In flore *Pyrolæ* vulgaris insignem observavi varietatem. In una enim planta inferior floris lacinia five labellum magis propendet quàm in altera: Stylus etiam in una magis dependet & deorsum incurvatur quàm in altera. Fortè una infœcunda est, flores duntaxat proferens, illa nimirum cujus labellum & stylus propendent, cùm & caulis exuccus & evanidus videatur, altera fœcunda, cùm & caulis robustior sit & succulentior.

## Q

**Q**uinquefolium album majus caulescens *C. B.* verùm descriptio non bene convenit huic nostræ plantæ: Melius respondet figura *J. Bauhini* sub titulo *Pentaphylli recti*. Vidimus primò in Alpibus *Carinthiacis*, deinde in monte *Salevæ*, tandem ad exteriorem portam max. *Carthusianorum* cœnobii, ubique è rupium fissuris exiens.

*Quinquefolium* album majus alterum *C. B. sylvaticum majus flore albo Ger.* *Pentaphyllon* album *J. B.* majus alterum album *Park.* In Alpibus *Stiriæ* inter oppidulum *S. Michaelis & Knittelfeld*.

*Quinquefolium* minus repens luteum *C. B.* An *Quinquefolium* minus repens lanuginosum luteum ejusdem? *Pentaphyllum* incanum *Ger.* repens minus *Park.* *Pentaphyl-*  
low

- Ion parvum hirsutum *J. B.* In Episcopatu Tridentino & Helvetia, itémque circa Genevam *en plain palais*. Martio & Aprili floret, unde à *Schwenckfeldio* rectè denominatur, Quinquefolium vernum minus.
- Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *C. B.* minus flore aureo *Ger. emac.* Alpinum splendens flore aureo *J. B.*
- Pentaphyllum incanum repens Alpinum *Park.* In montis Juræ summo vertice *La Dole* dicto.
- Quinquefolium rectum luteum minus. An Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum *C. B.*? Pentaphyllum montanum erectum *Park.*? In sylva *Valena* propè montem *Lupi*. Folia longis infident pediculis & circumcirca dentata sunt, denticulis majoribus, non admodum hirsuta. Caules ex eadem radice plures exeunt, dōdrantales, qui in summitatibus suis numerosos gestant flores.
- Quinquefolium Alpinum argenteum album. In altiss. montibus max. Carthusianorum cœnobio proximis. Per simile est Trifolio Alpino argenteo *Ponæ.*
- Quinquefolium fragiferum *C. B.* Pentaphyllum fragiferum *Ger. Park.* Pentaphylloides erectum *J. B.* In monte *Salevâ* propè arcem antiquam jam fere collapsam.
- Quinquefolio fragifero affinis *C. B.* Pentaphyllum supinum Potentillæ facie *Ger. Park.* Pentaphylloides supinum *J. B.* In Germania propè Rhenum, infra Moguntiam.

R

- R** Adix cava *v.* Fumaria bulbosa.
- Rapistrum monospermon *J. B. C. B. Park.* In Italia non longè à Liburno, circa Genevam etiam & Montepelium.
- Rapunculus spicatus *C. B.* spicatus sive comosus albus & cæruleus *J. B.* spicatus alopecuroides *Park.* Rapuntium majus *Ger.* Primò eum observavimus circa Spadam Episcopatus Leodiensis urbem acidulis celebrem, in mentosis; postea in collibus Genevæ vicinis, ut *La Bastie*, &c.
- Rapunculi genus folio serrato rotundiore *J. B.* In monte Jura. Hæc planta an ab aliis descripta sit necne nondum comperimus.
- Ranunculus albus simplici flore *J. B.* Alpinus albus *Ger.* montanus albus minor simplex *Park.* mont. Aconiti folio, flore



## CATALOGUS STIRPIUM

- flore albo minore *C. B.* In Jura & Saleva montibus copiose. Maio floret.
- Ranunculus montanus albus hirsutus* *J. B.* *montanus Pennæi Park. mont. hirsutus purpureus Ger. emac. montanus VI, sive montanus hirsutus purpurascens flore C. B.* In sylvis Juræ montis prope verticem *Thuri*.
- Ranunculus teuifolius montanus luteus* *J. B.* In montis Juræ præalta parte *Thuri* *J. Bauhino* & nobis etiam inventus.
- Ranunculus montanus lanuginosus foliis Ranunculi pratensis repentis C. B. Park. Ran. magnus valde hirsutus, flore luteo J. B. cujus descriptio quæ desumpta est è Phytopinace C. B. nostro Ranunculo (quem in Saleva copiosum invenimus) adamussim respondet.*
- Ranunculus v. Aconitum.*
- Reseda alba* *J. B. maxima Ger. C. Bauhini (quem sequitur Parkinsonus) mentem non capio; nam Resedam suam majorem cum floribus luteis describit. In Italia satis frequens.*
- Resedæ affinis v. Phyteuma.*
- Rhamnus i Clusii flore albo Ger. secundus Monspelienfium sive primus Clusii Park. cujus figura plantæ huic non respondet. Rham. spinis oblongis, flore candicante C. B. Rh. cortice albo Monspelienfis J. B. Circa Florentiam & Monspelium.*
- Rhamnus folio subrotundo v. Paliurus.*
- Rhododendron v. Oleander.*
- Rhus folio Ulmi C. B. coriaria Dod. Ger. obsoniorum Lob. Clus. Sumach, sive Rhus obsoniorum & coriariarum Park. Rhus sive Sumach J. B. In collibus circa Monspelium prope Castelnau, aux Garigues, &c.*
- N. 1. In agro Salmanticensi (referente Clusio) quæstus gratiâ diligenter colitur. Cæduntur singulis annis enati furculi cubitales ad radicem usque deinde deficcantur, in pollinem rediguntur, & ad coria densanda adhibentur.
2. Semen & folia refrigerant & astringunt, unde fluxum quemcunque alvi, uteri, mensiumve, hæmorrhoidum compescunt, vomitum sistunt, bilem obtundunt, seu intus in jusculis & sorbitionibus sumpta, sive extus adhibita. Dentibus denigrant; putredini Gangrænæ resistunt. Gummi dentibus inditum odontalgiam sedat. *Schrod.*
- Rhus myrtifolia Monspeliaca C. B. myrtifolia Ger. Plinii putata J. B. Plinii myrtifolia Park. Circa Monspelium copiose, præcipuè ad ripas Ladi amnis. Ad coria firmanda cunctæ Narbonæ notissimam & usitatissimam dicit Lobelius.*

**Ricinus major vulgaris** *J. B. C. B.* **Ricinus** five **Palma Christi** *Ger.* **Ricinus** five **Cataputia major vulgarior** *Park.* Circa **Messaniam Siciliae** & **Rhegium Calabriae** in sepibus frequens, ubi in fruticem satis grandem, **Sambuci æmulum** adolefcit, & multos annos durat. Semen **Ricino** infecto simile, unde plantæ nomen.

N. Semen seu nuclei potenter bilem & pituitam *Ar. & ad J.* pellunt, verum ob vehementiam rarissimi usus sunt. Ex semine oleum exprimitur ad multa utile, v. g. tumores & flatus præsertim ventris, coli & ilei dolores, artus contractos, duritiem alvi & ventris tinea in pueris, tumores & duritias mammarum, si partes eo illinantur, & duæ aut tres guttulæ in lacte aut pingui aliquo jure sumantur. Oleum hoc fictis infernalis oleum vocant. Hæc ferè **Monardes** & **Clusius**.

**Rosa rubello flore parvo**, simplici non spinosa *J. B. sylv.* minor rubello flore *C. B.* In montibus circa **Genevam**.

**Rosa sylvestris rubella parva frutice** *J. B.* In collibus propè **Genevam**, v. g. *la Bassie, Champe, &c.*

**Rosmarinus coronarius fruticosus** *J. B.* **spontanetis latiore folio** *C. B.* **Rosmarinus coronarius** *Ger.* **Libanotis coronaria**, five **Rosmarinum vulgare** *Park.* In **Italia** & **Galicia Narbonensi** in collibus saxosis propè mare affatim.

N. In usu sunt folia, flores (**Anthos officinis dicti**) semen. **Cephalica** sunt è præcipuis ut & **uterina**. Usus præcip. in affectibus capitis ac nervorum, **Apoplexia**, **Epilepsia**, **Paralyfi**, **Vertigine**, **Caro**, &c. visum acunt, foetorem halitus emendant; **Epatis**, **Lienis** ac **Uteri** obstructions resolvunt, **istero** ac **fluori albo mulierum** medentur, corque confortant. **Herba ipsa** suffitu & vapore suo pestis tempore aerem emendat & salubrem reddit.

**Rubia angustifolia spicata** *Park. C. B.* Circa **Monspelim** plurimis in locis, v. g. collibus juxta *Castelneuf*: **Agris Gramontiae sylvæ vicinis**, &c.

**Rubia marina** *Ger. Park.* **marina Narbonensium** *J. B.* **maritima** *C. B.* Ad **Mare Mediterraneum**, in litoribus arenosis propè **Syracusas**; **Cataniam**, **Terracinam**, **Monspelim** collegimus.

† **Rubia erecta quadrifolia** *J. B.* In pascuis quibusdam propè **Genevam** trans **Rhodanum fluvium**. Hanc non ita pridem in **Westmorlandia Angliæ Provincia** invenimus.

**Rubia lævis Taurinensium** *Park.* **Rubia cruciata lævis** *Ger.* **quadrifolia**, vel **latifolia lævis** *C. B.* **quadrifolia**



*Italica hirsuta* *J. B.* In Italia à D. F. Willughby inventa.

*Rubia echinata* *Saxatilis v. Cruciata minima.*

*Rubia sylvatica lævis v. Mollugo.*

*Ruta capraria v. Galega.*

*Ruta canina v. Scrophularia.*

*Ruta pratensis v. Thalictrum.*

*Ruta sylvestris* *Lob. sylv. major C. B. J. B. Park. sylv. montana Ger.* In collibus petrosis circa Monspelium & Nemaufum. In Etruria non longè ab oppido Massa eam vidimus sponte natam.

*Ruta sylvestris minor C. B. J. B. Park. sylv. minima Ger.* *Peganium Narbonensium Lob.* In agris sterilioribus non circa Monspelium tantum sed per totam Narbonensem Galliam.

N. *Ruta Alexipharmaca* est, cephalica ac nervina. Usus præcip. in peste aliisque affectibus malignis præservandis ac curandis (unde & *Theriaca pauperum* nonnullis dicitur) visu acuendo; lasciviâ reprimendâ (*Ruta* facit castum. *Schol. Salern.*) pleuritidè curanda, imbecillitate ventriculi corrigenda, colicâ discutiendâ, morsu canis rabidi debellando. *Schrod.* qui plura habet de usu ejus extrinseco, quem adi ut & *Parkinsonum*. Summatim Interne sumpta ad tria præcipuè celebratur, viz. 1. pestem præservandam aut arcendam; 2. oculorum caliginem discutiendam, & acuendum visum, 3. appetitus venereos cohibendos.

## S

**S** *Abina baccifera v. Cedrus Lycia.*

*Salix Alpina latifolia pumila glabra, An Salix pumila latifolia prior Clus.?* *An Sali x pumila folio utrinque glabro J. B.?* In supremis jugis montis Juræ propè Genevam.

*Salvia fruticosa lutea v. Verbascum IV. Matth.*

*Sambucus racemosa rubra C. B. Park. racemosa acinis rubris C. B. racemosa vel cervina Ger.* In Alpibus Carinthiacis, & in sylvis propè max. *Carthusianorum coenobium.*

N. Cervum *Sambucum racemosum* sicut & *Solanum lethale* magno desiderio inquirere didici. Ubi namque locorum eas stirpes provenire intellexit eò se confert. Quòdque mirari subit, solent binæ hæ stirpes plerunque eisdem

eosdem situs occupare. Hisce cervus unicè delectatur, folia utriusque non baccas decerpens, &c. Præterea (quod non minùs admiratione dignum est) observavi cervum solum foliis harum plantarum vesci, non autem cervam, nisi ea prægnans fuerit & cervum in utero gestaverit, tum enim, &c. *Trag. lib. 3. cap. 24.* Sanè vix fidem apud me obtinent quæ hoc in loco *Tragus* scripsit, quamvis se experientiâ doctum affirmet.

*Sanamunda prima Clusii v. Tarton-raire.*

*Sanamunda tertia Clusii Ger. Park.* *Sesamoides parvum Dalechampii, Sanamunda 3 Clusii J. B. Thymelæa tomentosa foliis Sedi minoris C. B.* In insula ad Promont. *Pachynum.*

*Sanicula guttata Ger. Park.* *Alpina guttata J. B. montana rotundifolia major C. B.* In Alpibus Helveticis; item in montibus Jurâ & Salevâ.

*Sanicula femina Matth. v. Astrantia nigra.*

*Saponaria minor quibusdam J. B. Ocymoides repens Park.* repens montanum *C. B. Lychnis montana repens Ger.* In colle *la Bassie* propè Genevam, inque Etruria non procul à Massa, viâ quâ indè Lucam itur.

*Satureia hortensis Ger. vulgaris Park. durior J. B. montana C. B.* In Gallia Narbonensi circa Monspelium, Nemaufum, &c. in collibus. Invenimus etiam in Hetruria in alveo cujusdam torrentis propè Radicofanum.

*Satureia æstiva hortensis Ger. hortensis Park. fativa J. B. hortensis, five Cunila fativa Plinii C. B.* In agris circa *Castelneuf*, non longè à Monspelio copiosè.

*Satureia S. Juliani Ger. spicata C. B. spicata S. Juliani Park.* foliis tenuibus, five tenuifolia, *S. Juliani* quorundam *J. B.* In collibus Messanensis agri, non minus frequens quàm in ipso monte *S. Juliani*. Vidimus & in ipsis urbis Florentiæ muris.

N. 1. Saporis & odoris est acris & calidi. Usus in affectibus *ventriculi*, cruditate, anorexia, &c. *pectoris*, asthmate; *uteri*, mensibus obstructis; visum acuit. Extrinsecùs discutit tumores, dolorem ischiadicum lenit; ejusque succus cum tantillo olei ros. auribus instillatus tinnitum & surditatem aufert.

2. Germanis in usu est ad Brassicas capitatas condendas, qui fit, ut illæ jucundissimum odorem & saporem gratissimum acquirant; quin & fabis, aliisque leguminibus incoqui solet, ad eorum flatuositatem corrigendam. *J. B. Schrod.*



## CATALOGUS STIRPIUM

- Saxifragia Venetorum* *Ad.* *Daucus felinoides* major *Park.* montanus Apii folio major *C. B.* Libanotis altera quorundam, aliis dicta *Cervaria nigra* *J. B.* Lib. Theophrasti nigra *Ger.* In pascuis montosis & vineis juxta Rhenum in Germania, & in collibus Genevæ vicinis copiosè.
- Scabiosa montana* max. *Park. Ger.* Alpina foliis *Centaurii majoris* *C. B.* Alpina maxima *Ad.* In ascensu montis Juræ non longè ab altissimo vertice *Thuri.*
- Scabiosa argentea angustifolia* *Park. C. B.* graminea argentea *J. B.* In planis Fori Julii depressis, quæ aquæ ex Alpis ubertim delabentes hyberno tempore aliquoties latè inundant; alveos torrentum dicere posses nisi latitudo obstaret.
- Scabiosa latifolia* rubro flore *J. B.* montana *V.* five latifolia rubra non laciniata secunda *C. B.* rubra Austriaca *Ger. emac.* In montibus Genevæ proximis, inque Germanicis montosis sylvis passim luxuriat.
- Scabiosa Pannonica* flore albo *Park.* montana calidarum regionum major *Lobelio* *J. B.* montana alba *Ger.* pratensis & arvensis *V.* five fruticans angustifolia alba *C. B.* in collibus saxosis agri Narbonensis perquam familiaris. Ab hac non multum differt *Scabiosa glabri foliis rigidis viridibus*, ut ipsemet *Lobelius* fatetur.
- Scabiosa multifido folio*, flore albo vel potius *ὀχρεαύκω* *J. B.* multifido folio, flore flavescente *C. B.* flo. pallido *Ger. emac.* Pannonica flore albo quoad figuram *Park.* Circa Viennam Austriæ ad sepes & in pascuis. Simillima est superiori, ideoque non immeritò ejus icone pro priore usus est *Parkinsonus*.
- Scabiosa* 10, five repens *Clusii* *J. B.* minima *Bellidis* folio *Ger.* *Scab. Globulariæ Bellidis* foliis *Park.* *Bellis cærulea* *IV.* five montana frutescens *C. B.* quem justè reprehendit *Parkinsonus*, quòd eam frutescere dicat. Ad radices montis *Salevæ* copiosè.
- Scammonea Monspeliaca* dicta *Park.* *Monspel.* flore parvo *C. B.* *Monspeliaca* foliis rotundioribus *C. B.* *Monspeliensis* *Ger.* Ad mare propè *Monspelim*.
- Scammoneæ Monspeliacæ* affinis *Park.* *Scam. Monspeliacæ* affinis foliis acutioribus *C. B.* *Apocynum latifolium amplexicaule* *J. B.* cur a latifolium appellat? Juxta *Cataniam* Siciliæ urbem.
- Scolymus* Theophrasti *Park. v.* *Cinara sylvestris*.
- Scorpioides Bupleuri* folio *Ger. C. B.* *Scor.* filiquâ campoide hispidâ *J. B.* *Scorp. Bupleuri* folio minor pluribus corniculis asperis *Park.* quamvis ille hanc à nemine ante

- ante se editam gloriatur. Messanæ in collibus, & Mont-  
peli in fossis & aggeribus ipsius arcis.
- Scorpioides Telephium Anguillaræ *Lob.* Scorpioides Mat-  
thioli *Ger.* Scorp. Matthioli, five Portulacæ folio *Park.*  
Telephium Scorpioides *J. B.* Telephium Dioscoridis,  
seu Scorpioides ob filiquarum similitudinem *C. B.* Circa  
Liburnum, Messanam, Monspelium, &c.
- Scorpioides leguminosa *v.* Ornithopodio similis.
- Scorpioides leguminosa altera *J. B.* In vineis & hortis ad  
latera montium Messanæ imminentium. Hanc plantam  
à nullo alio scriptore proditam censemus.
- Scrophularia Ruta canina dicta *Park.* Scroph. Ruta ca-  
nina dicta, vulgaris *C. B.* Ruta canina *Lob. Ger.* Scroph.  
3 Dodonæi tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata  
*J. B.* ad Rheni ripas propè Basileam primò, deinde  
in Italia, Gallia Narbonensi, & circa Genevam observa-  
vimus.
- Scrophularia folio Urticæ *C. B.* peregrina *Park.* flore ru-  
bro Camerarii *J. B.* Circa Pisas copiosè in muris ipsius  
urbis, & alibi in Italia.
- Scutellaria *J. B. v.* Opuntia marina.
- Securidaca minor *Lob.* minor lutea *Ger.* altera five minor  
*J. B.* lutea minor corniculis recurvis *C. B.* Hedyсарum  
minus *Park.* In collibus circa Messanam.
- Securidaca major articulata *Park.* dumetorum major flore  
vario, filiquis articulatis *C. B.* Melilotus 5 Tragi *J. B.*  
Ad agrorum margines in Germania passim.
- Securidacæ genus triphyllon *J. B.* An Fœnugræcum sylv.  
alterum polyceration *C. B.*? Fœnum Græcum sylvestre  
*Ger. Park.* In collibus propè *Castelneuf* cis Ladum Monf-  
peliacum annem.
- Securidaca filiquis planis dentatis *Ger.* filiquis planis utrin-  
que dentatis *C. B.* peregrina Clusii *Park.* Lunaria ra-  
diata Robini *J. B.* In lingua illa procurrente inter Por-  
tum Zancleum & fretum Siculum, & alibi circa Mes-  
sanam.
- Sedum majus vulgare *C. B. J. B. Park.* Sempervivum ma-  
jus *Ger.* In summis Jugis montis Juræ, inque Alpibus  
Sabaudicis & Helveticis, &c.
- Sedum minus luteum ramulis reflexis *C. B.* minus luteum,  
flore se circumflectente *J. B.* Aizoon Scorpioides *Ger.*  
Vermicularis Scorpioides *Park.*
- Sedum ferratum *J. B.* Cotyledon media foliis oblongis ser-  
ratis *C. B.* Umbilicus Veneris minor *Ger.* in montibus  
Tyrolensibus & Helveticis, itémque in Jura & Saleva  
Genevæ vicinis.



- Sedum ferratum* alterum foliis longis angustis. An *Sedum Pyrenæum ferratum longifolium Hort. Blas?* A priore diffir. longitudine & angustia foliorum. Invenimus in Alpibus non longè a *Pontieba*: vidimus postea in horto Regio Parisiensi.
- Sedum Alpinum* minimum foliis cinereis, flore candido *J. B.* Saxatile & *Alpinum II*, sive album foliolis compactis *C. B.* minimum *Alpinum Muscoides Park.* In montibus non longè à Balzano Martio mense floruit.
- Sedum Alpinum 4 Clusii Ger. enac.* minimum *Alpinum villosum Park.* *Alpin III*, sive hirsutum lacteo flore *C. B.* *Chamæiasme Alpina J. B.* in *Append. tom. 3.* In altissimo cacumine montis Juræ *la Dole* dicto. Flos candidus ætate rubescit, dum recens odoratissimus est Jasmini instar.
- Sedum parvum* folio circinato, flore albo *J. B.* minus folio circinato *C. B.* *Vermicularis dasiphyllus Park.* Circa *Monspelim*, *Genevam*, &c. in muris & rupibus copiosè.
- Sedum echinatum* vel stellatum flore albo *J. B.* In muscosis sepium aggeribus non longè à Geneva, secus viam quæ indè ad oppidum *Jay* ducit. *Messanæ* quoque similibus in locis invenimus. Descriptio *J. Bauhini* plantæ huic nostræ per omnia exactè non congruit.
- Sedum echinatum* flore luteo *J. B.* Circa *Portum Veneris* & alibi in Italia. Planta hæc & proximè antecedens à *F. Columna* describuntur. Nostra a. ab illius nonnihil diversa videtur; folia enim habet ad Alsinem accidentia & ut memini nonnihil crenata.
- Sedum Alpinum hirsutum luteum C. B.* petræum *Ger.* petræum montanum luteum *Park.* *Phyllon thelygonon Dalechampio J. B.* In monte Saleva *Genevæ* vicino.
- Sedum montanum siliquosum* flore albo, an *Hesperidis Alpinae* species? In suprema parte montis Salevæ ad aquarum scaturigines.
- Sedum montanum* minimum non acre flore purpurascente parvo. In altissimis rupibus Juræ montis.
- Sedum* minimum non acre totum rubrum flore hexaphyllo purpureo. *Catanæ* in muris & tectis copiosè.
- Sedum* medium flore albo staminibus luteos apices gestantibus. In muris quibusdam propè *Messanam Siciliæ*.
- Sempervivum v. Sedum.*
- Senecio* folio non laciniato *J. B.* folio non laciniato *Myconi Park. VI*, sive folio non laciniato *C. B.* In sabulosis inter oppidum *Rot* & *Norimbergam Germaniæ* urbem. Eandem etiam *Messanæ* in ascensu montium observavi.
- Ser.

Sertolaria Imperati v. Opuntia marina.

Seseli Æthiopicum Salicis folio C. B. Ses. Æthiopicum frutex Park. Ger. Ses. Æthiopicum fruticosum folio Periclymeni J. B. In rupibus oppido S. Chamas in Gallo-provincia vicinis: Aiunt & circa Monspelium sponte provenire; verum nos ibi non vidimus.

Seseli Creticum minus v. Caulalis minor pulchro semine. Massiliensium v. Foeniculum tortuosum.

Officinarum v. Siler montanum.

Sideritis Monspeffulana J. B. Scordioides Ger. Monspelienfis Scordioides Lob. Monspelienfis Lobelii Park. foliis hirsutis profundè crenatis C. B. Monspelii circa patibulum copiose, & alibi aux Garigues.

Sideritis vulgaris Ger. vulgaris Clusii Park. vulgaris hirsuta J. B. hirsuta IV, sive vulgaris hirsuta erecta C. B. Per Germaniam, Italiam & Galliam in agrorum marginibus vulgatissima.

Sideritis genus verticillis spinosis J. B. In Italia & Gallia Narbonensi propè Monspelium in agris. Icon Sideritidis procumbentis non ramosæ Clus. huic non dissimilis est.

Sideritis Valerandi Dourez brevi spicâ J. B. Alpina hyssopifolia Ger. C. B. montana hyssopifolia Park. In monte Thuri. Attendantur figura & descriptio J. B. Nam aliorum neque figuræ, neque descriptiones per omnia quadrant.

Sideritis pratensis lutea v. Euphrasia pratensis lutea.

Sigillum Solomonis v. Polygonatum.

Siler montanum Officinarum Lob. Ger. Seseli sive Siler montanum vulgare J. B. Siler montanum, vulgò Sifelios Park. Ligusticum, quod Seseli officinarum C. B. In Jura & Saleve montibus propè Genevam, inque Alpibus Pontie-bæ vicinis.

Siliqua arbor sive Ceratia J. B. Sil. edulis C. B. Sil. dulcis sive vulgatiore Park. Ceratia Siliqua sive Ceratonia Ger. In Sicilia non longè à Puzallu oppido, & sponte & copiosè provenit. Officinis Caroba dicitur hæc arbor, Germanis & Belgis Panis S. Johannis.

N. Siliquarum (ut rectè Plinius) cortex ipse manditur, estque dulci & melleo sapore, per ficitatem intellige, nobis tamen nonnihil nauseosus & ventriculo ingratus. Miror a. Veteres scripsisse quòd astringat & ventrem sistat, cum nobis (quotquot de eo comederimus cum essemus Venetiis) alvum solvit non secus ac Cassia. Non tamen negaverim posse eos qui huic fructui assueverunt eo innoxie vesci.

Sinapi Genevensis sylvestre J. B. In alveo fluvii Arve propè Genevam copiosè. Hæc planta an ab alio quoquam descripta sit nescio.

Sinapi



Sinapi echinatum v. *Eruca echinata*.

*Smilax aspera* Lob. Ger. *Y. B.* aspera fructu rubente *C. B.* aspera fructu rub. *Park.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi in sepibus passim.

N. Succedaneum est Sarsaparillæ in curanda lue Venerea, inque articulorum & nervorum doloribus; noxios humores per sudorem & transpirationem evacuat, cutis vitia expargat. Datur vel in pulverem redacta vel in aqua aliòve liquore decocta.

*Smyrnium* Lob. Creticum Ger. *Park.* Creticum perfoliatum *Y. B.* peregrinum rotundo folio *C. B.* In Sicilia circa *Punto Cerciolo*.

*Solidago Saracenica* Dod. Lob. Saracenica vera Salicis folio *Park.* Virga aurea angustifolia ferrata *C. B.* aurea angustifolia ferrata, five *Solidago Saracenica* *Y. B.* In fossis propè Argentoratum, inque summis jugis montis Juræ ad scaturigines aquarum.

N. *Vulneraria* insignis censetur, nec *Saniculæ* aut *Bugulæ* inferior, usu interno & externo adhiberi apta.

*Solanum halicacabum* v. *Alkekengi*.

*Solanum vulgare* five *Officinarum* acinis luteis. Circa Florentiam in Italia, & *Montspelim* in Gallia Narbonensi in vineis. Hanc baccarum differentiam *Matthiolus* etiam olim observavit.

*Sonchus lanatus* Dalechampii *Y. B.* villosus luteus major *C. B.* *Park.* Circa Messanam & *Montspelim*.

*Sonchus cæruleus latifolius* *Y. B.* montanus I, i. e. lævis laciniatus cæruleus five *Alpinus cæruleus* *C. B.* *Alpinus cæruleus* *Park.* In monte Jura, inque montibus max. *Carthusianorum* cœnobio imminentibus.

*Sonchis affinis Terra-crepola* *Y. B.* *Sonchus lævis angustifolius* *C. B.* Ger. *emac.* *Park.* Herba quæ nobis *Montpeli* pro *Terra-crepola* ostensa fuit, similior erat figuræ istius plantæ quam *J. Bauhinus* *Chondrillis* affinem aliquam laciniatam an *Trinciattellam* nuncupat. Icones *Terra-crepola* apud *Lobelium*, *Gerardum* & *Parkinsonum* ei bene respondent. Apud *Montpelienses* in acetariis frequens hujus usus est.

*Soldanella Alpina* quibusdam *Y. B.* Alpina major & minor *Park.* Ger. *emac.* III, five Alpina rotundifolia *C. B.* In monte Jura & Alpibus Sabaudicis copiose.

*Sorbus* *Y. B.* Ger. domestica Lob. legitima *Park.* sativa *C. B.* In montibus supra Messanam spontaneam vidimus. In altosis montibus ad Rhenum, neque non sylvis *Medio-matricum* ad fluvios Saram & Blisam dictos admodum familiaris, autore Trago. Nos Viennæ Austriæ Sorba fructum

fructum antea nobis incognitum in foro primum venalem vidimus.

N. Sorba sed præcipuè immatura valde astringunt, unde fluxui cujuscunque generis conveniunt, & vomitum etiam sistunt. Pueris quibus ob dentitionem alvus fuit commodè exhibentur.

Sorghum v. Melica.

Speculum Veneris Ger. majus Park. Avicularia Sylvii quibusdam J. B. Onobrychis arvensis, sive Campanula arvensis erecta C. B. In Germania, Italia & Gallia Narbonensi inter segetes passim.

Spartum max. maritimum Hollandicum spicâ secalinâ. In arenosis ad vicum Schevelingam, uno ab Haga Comitum milliari.

Spartium arborescens v. Genista Hispanica.

Staphylodendron J. B. Nux vesicaria Ger. Park. Pistacia 3 sive Sylvestris C. B. The Bladder-nut Tree. In clivis maritimis Regni Neapolitani propè Salernum.

Stella leguminosa v. Glaux peregrina annua.

Stoebe Salamantica prima Clusii Park. Salmanticensis prior Clusio, sive Jacea intybacea J. B. argentea major Ger. major foliis Cichoraceis, mollibus lanuginosis C. B. Circa Monspelium passim, nec minus frequens in Sicilia & Italia.

Stoebe caliculis argenteis C. B. argentea minor Ger. Salamantica argentea sive tertia Clusii Park. Scabiosa squammata argentea J. B. In Italia propè Tropiam Calabriae urbeculam.

Stoebe major caliculis non splendentibus C. B. Austriaca elatior Park. Centaurii majoris species tenuifolia J. B. In Germania, Italia & Gallia Narbonensi frequens.

Stoechas citrina Germanica latiore folio J. B. Elichryson sive Stoechas citrina latifolia C. B. Amarantus luteus latifolius Ger. In sterilioribus propè Rhenum supra Coloniam Agrippinam plurima.

N. Hujus flores vino decocti & poti lumbricos ventris expellunt, quod ego experientia verum esse didici. Trag.

Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis J. B. Elichrysum sive Stoechas citrina angustifolia C. B. Stoechas citrina sive Amarantus luteus Ger. Chrysocome sive coma aurea & Stoechas citrina vulgaris Park. Circa Monspelium & alibi in Gallia Narbonensi vulgarissima.

Stoechas citrina altera tenuifolia sive Italica J. B. Elichrysum foliis oblongis, Stoechadi citrinae similis Dod. In montibus Liguria non procul Gavia oppido, & alibi in Italia.

Stoechadi



## CATALOGUS STIRPIUM

*Stœchadi citrinæ affinis, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappos evanescentibus* *J. B. Elichryson sylv. angustifolium capitulis conglobatis* *C. B. Stœchas citrina altera odora* *Park.* In saxis & rupium fissuris circa Monspelium variis in locis.

*Stœchas citrina altera odora* *Park. v. Chrysocome.*

*Stœchas sive Spica hortulana* *Ger. vulgaris* *Park. purpurea* *C. B. St. Arabica vulgò dicta* *J. B. In sylva Grammontia & alibi circa Monspelium, itémque medio circiter itinere inter Monspelium & Arelaten.*

N. 1. *Stœchas Arabica* præcipui usûs est in affectibus capitis ac nervorum, sc. in vertigine, Apoplexia, Paralyfi ac Lethargo: in morbis pectoris idem præstat quod *Hyssopus*. Insuper urinam & menses ciet, venenis resistit, affectibus hypochondriacis succurrit. Extrinsecus in lotionibus capitis, suffitu, &c. *Schrod.*

2. *Stœchadis citrinæ flores* diuretici sunt & vulnerarii; usus præcip. in obstructione urinæ, epatis, lienis, mensium; coagulatum sanguinem resolvunt, catarrhos exiccant, menses nimios sistunt, lumbricos fugant: Commendantur & imprimis ad exiecandas defluxiones acres pulmonum, &c. Extrinsecus faciunt ad emolliendam uteri duritiem (in balneo) lendes abigunt (in lixivio) capitis defluxiones siccant & discutunt (suffitu.) *Schrod.*

*Styrax arbor* *Ger. J. B. St. arbor vulgaris* *Park. Styrax folio mali cotonei* *C. B. Circa Tusculum in sepibus & sylvis copiose: ubi & Cæsalpinus eam observavit.*

N. *Styrax cephalicus* imprimis est & nervinus; medetur tussi, catarrhis, raucedini, gravedini; vulvæ præclusæ duritiæ laboranti extra & intra datus convenit. Immiscetur cardiacis & lætificantibus, alvum leniter mollit si cum *Terebinthinâ* in forma Catapotii assumatur. Miscetur utiliter malagmatis discutientibus & acopis. *Schrod. è Diosc.*

*Suber latifolium* *J. B. Ger. Park. II, sive latifolium perpetuò virens* *C. B. The broad-leaved Cork-tree. D. Willughby* hanc arborem observavit itinere à Neapoli ad Romam.

N. 1. Cortex tritus ex aqua calida potus sanguinis fluxum sistit. Eiusdem cinis ad idem valet. Usus ejus est ad anchoralia navium, piscantium tragulas, cadorum obturamenta, sceminarum calceatum hybernium, alvearia, &c.

2. Detrahendis corticibus hæc est ratio. Quà stipes telluri committitur, circumscinditur ad lignosam usque materiam, pariterque in summis humeris antequam in brachia dividat sese: mox à summo ad imum finditur detrahiturque

hiturque cortex. Non explanantur aqua sed igni, nec demuntur cortices nisi tertio mox anno. Quod si paucis diebus à tonsura largi imbres supervenerint, arbor interit : quod rarò evenit nimirum regione calida & sicca, & temporum observatione rarò fallente. *Clus. è Quinquerano.*

Sumach v. *Rhus.*

*Symphytum maculosum* v. *Pulmonaria maculosa.*

*Sysirinchium majus* *Ger. Clus. Park.* majus flore luteâ maculâ notato *C. B.* *Iridi bulbosæ* affine *Sysirinchium majus* *J. B.* In lingua illa quæ Portum Messanensem à Freto Siculo dividit, & in insula ad Prom. Pachynum, utrobique copiosè.

T

**T** *Amarix* v. *Myrica.*

*Tanacetum inodorum* *Park.* non odorum *Ger.* montanum inodorum minore flore *C. B.* album *J. B.* In colle *la Bassie* propè Genevam & ad Rhodani ripas.

N. Hæc planta florem habet radiatum *Bellidis* majoris æmulum, ideoque cum nec odorem *Tanaceti* habeat, rectius ad *Bellides* refertur, & *Bellis leucanthemos Tanaceti* folio à *D. Morrifono* denominatur.

*Tarton-raire* Gallo-provinciæ *Lob. Ger. Massiliensium* *Park.*

*Massil. Sanamunda* : *Clusii J. B. Thymelæa* foliis candidantibus, *Serici* instar mollibus *C. B.* In rupibus maritimis non longè à Salerno.

*Telephium Scorpioides* *J. B. v. Scorpioides.*

*Terræ glandes* v. *Chamæbalanus* leguminosa.

*Terebinthus* *Ger. J. B.* vulgaris *C. B.* angustiore folio vulgarior *Park.* Circa *Monspelim* : invenimus eam & in *Etruria.*

N. 1. *Terebinthi* folia, fructus, cortex (tradente *Dioscoride*) quâ pollent adstringendi vi, ad eadem ad quæ *Lentiscus* conveniunt. Ejus fructus esculentus est, at stomacho noxius, urinam verò ciet & excalefacit. Est & ad excitandam venerem aptissimus : ex vino verò potius contra *Phalangiorum* morsus prodest.

2. Species sunt *Gallæ*, magnitudine *Avellanæ*, intus cavæ, provenientes ex excrescentiis foliorum *Terebinthorum* masculorum. Has colligunt *Rustici Thraciæ* & *Macedoniæ*, ac carè vendunt ad tingenda serica subtilia diversis coloribus in urbe *Bource.* Colligunt a. vere



vere quo tempore nisi colligerentur, in longitudinem semipedalem excrescerent ad formam cornu. *Bellon.*

3. Quæ pro Resina terebinthina in officinis habetur vel Laricis resina est vel abietis, nam vera terebinthina ad nos hodie non adfertur, Botanicorum unanimi sententiâ. Resinæ autem vires & usus vide sub Pinu.

Teucrium *C. B.* majus vulgare *Park.* latifolium *Ger.* Teucrium multis *J. B.* In Sicilia & Italia perquam familiare.

Teucrium Baticum *Ger.* Baticum & Creticum Clusii *J. B.*

Teucrium Creticum & Teucrium Baticum *Park.* nam putamus hæc duo non differre specie. Teucr. peregrinum folio sinuoso *C. B.* & Teucrium Creticum incanum *C. B.* Propè Syracusas, in insula ad Promont. Pachynum, circa *Puzallu*, & alibi in Sicilia. Invenit *D. Wollughby* in itinere à Neapoli ad Romam.

N. Ut facie sic viribus cum Chamædry convenit. Veteres lienem absumendi validam vim ei attribuunt.

Teucrium majus Pannonicum *v.* Chamædry falsa maxima.

Alpinum cisti flore *v.* Chamædry.

Thaliætrum angustissimo folio *Park.* pratense angustiss. folio *C. B. Prodr.* Ad fluvium Lycum propè Augustam Vindellicorum in Germania.

Thaliætrum majus Hispanicum *Ger. emac.* majus album Hispanicum *Park.* maj. folliculis angulosis, caule lævi *J. B.* 4. sive majus florum staminulis purpurascentibus *C. B.* In sylvosis Juræ montis circa *Thuri*.

Thapsia latifolia Hispanica *Park.* latifolia Clusii *Ger.* Thapsia Clusii latifolia, flore luteo, semine lato, similis Sefeli Pelloponnensi Lobelii *J. B.* An Thapsia sive Turbith Garganicum semine latissimo *ejusdem*? Messanæ pro Turbith utuntur hac planta, ut rectè notat Imperatus. *v. J. B.* Messanæ in lingua sæpius memorata.

N. Hæc planta violenter admodum purgat, ideoque in ea exhibenda cauto opus est. Messanenenses, ut dictum, pro Turbith eâ utuntur, cujus vires notæ. *v.* Schroderum & alios.

Thlaspi clypeatum hieracifolium majus *Park.* biseutatum asperum hieracifolium & majus *C. B.* clypeatum Lobelii *Ger.* Lunaria biseutata *J. B.* In Germania, Italia, Sicilia & Gallia variis in locis.

Thlaspi minus clypeatum *Ger.* clyp. minus Serpylli folio *Park.* clyp. Serpylli folio *C. B.* Lunaria peltata minima, quibusdam ad Thlaspi referenda *J. B.* Circa Monspelium sed rarius.

Thlaspi

- Thlaspi* Candiae *Ger.* umbellatum *Creticum Iberidis folio C. B.* *Creticum* quibusdam flore rubente *J. B.* In sylvis montosis propè Salernum in Regno Neapolitano, & Viterbum in Etruria.
- Thlaspi* umbellatum arvense amarum *J. B.* umbellatum arvense *Iberidis folio C. B. Park.* *Thl.* amarum *Ger.* Inter fegetes in monte Saleva, & circa *Thuri* duabus à Geneva leucis copiose.
- Thlaspi* umbellatum *Nasturtii folio Monspeliacum C. B. Park.* umbellatum *Narbonense Ger.* umbellatum, tenuiter diviso folio, amarum. *Narbonense Lobelii J. B.* In agris *Castri novi* *Monspelio* vicinis, & alibi circa *Monspelum*.
- Thlaspi* spinosum *Ger.* spinosum fruticosum *Park. C. B.* *Leucoium spinosum*, sive *Thlaspi spinosum* aliis *J. B.* In summis rupibus montis *Lupi*, tribus *Monspelio* leucis distantis.
- Thlaspi.* capsulis sublongis incanum *J. B.* fruticosum incanum *Ger. C. B.* incanum *Mechliniense Park.* In agro Romano abundat, ad hyemem usque florens.
- Thlaspi* *Narbonense Centunculi* angusto folio *Ad. Narbonense Lobelii Ger.* *Nasturtium* vel *Thlaspi maritimum J. B.* *Thlaspi.* *Alysson dictum maritimum C. B.* Ad Mare *Mediterraneum* ubique ferè.
- Thlaspi* minus quibusdam, aliis *Alysson minus J. B.* *Thl.* *Alysson dictum campestre minus C. B.* *Thlaspi arvense minus luteum Park.* *Thlaspi Græcum Lob.* Circa *Genevam* in glareosis passim, atque etiam circa *Moguntiam*, & *Monspel.*
- Thlaspi oleraceum Tab.* rotundifolium *Ger.* arvense perfoliatum majus *C. B. Park.* *Bursa pastoris*, foliis *Perfoliatæ J. B.* Circa *Bresciam* in Italia & *Genevam* in Gallia.
- Thlaspi* *Alpinum* minus capitulo rotundo *C. B. Park.* *petræum minus Ger. emac.* *petræum myagryodes Pona.* In rupibus humidioribus montium *Juræ* & *Salevæ*.
- Thora* *Valdensis Ger.* *Phthora* folio *Cyclamini J. B.* *Aconitum pardalianches II*, seu *Thora minor C. B. Park.* itémque *I*, seu *Thora major eorundem.* Non enim concessimus has duas specie differre. In altissimis jugis montis *Juræ* propè *Thuri*.
- Thymelæa Ger. Park.* foliis *Lini C. B.* *Monspeliaca J. B.* In Italia & Gallia *Narbonensi*, agris depressioribus, inter alios frutices passim.
- N. Hujus plantæ fructum coccum seu Granum *Gnidium* vocant herbarii peritiores. Ast *Officinis nostris Mezerei Germanici* baccae *Cocci Gnidii* appellantur, monente *Schrodero.* *Cocco Gnidio* vis ardens est & fauces adurens.

Undè



Undè mirum nobis videtur quod scribit Clusius, Fructu Thymelææ maturo & rubro Perdices & aviculas avidissimè vesci.

Thymelæa minor Cordi *J. B.* Thymelææ affinis facie externa *C. B.* Thymelæa minor five Cneorum Matthioli *Park.* In Germania circa Basileam & alibi.

Thymelæa quædam incana Genevensis. In sylvosis rupibus ad latera montis Salevæ ex parte quæ Genevam respicit, è saxorum fissuris.

Thymelæa tomentosa *v.* Sanamunda.

foliis candicantibus *v.* Tarton-raire.

Thymum Creticum *Ger.* Creticum five Antiquorum *J. B.* Thymus capitatus, qui Dioscoridis *C. B.* Thymum legitimum capitatum *Park.* In saxosis propè Syracusas.

Thymum durius *Ger.* durius vulgare *Park.* vulgare rigidius folio cinereo *J. B.* vulgare folio tenuiore *C. B.* In Gallia Narbonensi vix alia communior planta.

N. Usus hujus herbæ præcip. in affectibus Tartareis, (1.) Pulmonum, ut Asthmate, tussi. (2.) Artuum, ut Podagræ: omnia viscera reserat, appetitum excitat. Extrinsecus in tumoribus frigidis, sugillationibus, inflationibus ventriculi, doloribus arthriticis. *Schrod.*

Tithymalus folio longo glauco, caule rubro, seminibus verrucosis. Propè Messanam. Elatior & major est multo Tithymalo verrucoso vulgari.

Tithymalus arboreus *Park.* dendroides *J. B.* dendroides ex codice Cæsareo *Ger.* dendroides, Italis *Tithymalo arboreo Lob.* myrtifolius arboreus *C. B.* Sed cur appellat myrtifolium, cum folia ejus magis accedant ad Mezereon Germanicum? In montosis non longè à Massa propè Salernum, & alibi in Italia, ubi in magnum & lignosum fruticem adulescit.

Tithymalus non acris flore rubro *J. B.* Esula five Pityusa III, i. e. Tithymalus montanus non acris *C. B.* qui huc refert Esulam dulcem Tragi, & Pityusam, five Esulam minorem alteram floribus rubris *Lob. Ger. Park.* Planta quam volumus optimè descripta est à J. Bauhino: olim nobis missa fuit Londino sub titulo *Apios tuberosa radice.*

Tithymalus myrsinites *Lob. J. B. Park.* myrtifolius latifolius *Ger.* Figura quam Gerardus exhibet pro Tith. myrtifolio latifolio, Parkinsonus dat pro myrsinite incano. Tith. myrsinites latifolius *C. B.* Juxta arcem Rhegii in Calabria.

Tithymalus myrsinites angustifolius *C. B. Ger.* Parkinsonus hujus iconem ponit pro Tithymalo myrsinite *Lob.* Verùm hæc duæ plantæ specificè inter se differunt: hæc enim minor est,

est, sed tamen erectior priore: Folia habet angustiora & crebriora; bene etiam respondet figuræ Lobelianæ. Invenimus propè Massiliam ubi & Tragacantham, juxta mare.

*Tithymalus pineus* Ger. foliis Pini, fortè Dioscoridis *Pityusa* C. B. *Pityusa*. *Tithymalus pineus*, sive *Esula minor* Park.

*Tithymalo cyparissiae* similis, *Pityusa* multis J. B. *Crepidines* fabulosæ fluminum & vicini colles frequentius hunc alunt, inquit J. B. quod & nobis experientia confirmat, nam in locis similibus sæcüs Rhenum copiosum vidimus.

*Tithymalus Amygdaloides* sive *characias* J. B. *characias* II, sive *rubens peregrinus* C. B. *characias* *Monspeliensium* Ger. *Park*. In saxosis circa *Monspelim*, quin & in Italia circa *Lericium*, & alibi sæpius nobis conspectus.

*Tithymalus ferratus* *Dalechampii* J. B. *characias ferratus* Ger. *characias* folio ferrato C. B. *char. ferratus* *Monspeliensium* Park. In Gallia *Narbonensi* passim & copiose; circa *Nemausum*, *Monspelim*, &c.

*Tithymalus verrucosus* J. B. *verrucosus* *Dalechampii* Park. *myrsinites*, fructu verrucæ simili C. B. Circa pagum *Thuri* duabus à Geneva leucis, quin & in Germania aliquoties eum invenimus.

*Tithymalus magnus multicaulis*, sive *Esula major* J. B. *Pityusa* sive *Esula* II. j. e. *Tithymalus palustris fruticosus* C. B. *Esula major Germanica* Ger. *Park*. In Germania ad Rhenum copiosissime; circa *Genevam* quoque & in planis campis agri *Lugdunensis*, per quos *Genevâ* *Lugdunum* iter est.

*Tithymalus palustris Pisanus*. An *Tithym. myrsinites* incanus herbariorum? Frequens in paludibus Pisanis, unde non dubito hanc esse quam intelligit *Cæsalpinus* per suum *Tithymalum palustrem*. Folia ejus hirsuta sunt, & ad *Tithymali characiæ amygdaloides nostratis* folia accedunt.

*Tordylium minus* v. *Caucalis minor* pulchro semine.

*Trachelium parvum* folio *Bellidis* subrotundo. Radix ei alba, simplex, lignosa, annua: Caulis erectus, striatus: Folia alternatim posita, subrotunda, sine pediculis caulibus adnexa. Flores *Trachelii majoris*. Circa *Messanam*.

*Trachelium Alpinum* &c. v. *Echium Alpinum* luteum.

*Tragacantha* C. B. vera Park. *Massiliensis* J. B. *Tragacantha*, sive *Spina hirci* Ger. Ad latera montis *Ætnæ*; 14 supra *Cataniam* miliaribus, propè nivis repositoria. Circa *Massiliam* ad maris litus. Fortè tamen *Massiliensis* ab *Ætnææ* specie differt.

N. E radice hujus plantæ incisa, vel (ut alii volunt) sponte sua exudat gummi *Tragacantha* pariter dictum, cujus usus præcip. ad tussim inveteratam, fauces exasperatas; re-



tusas voces, cæterâsque destillationes, cum melle sit linctus, subditurve linguæ ut lique scat) contra renum dolorem & vesicæ rosiones (in passo vel brodio) in dysenteria. Extrinsicus ad dysenteriam in clysteribus, ad rubedinem & acres destillationes oculorum (soluta in aqua rosacea vel lacte) ad palpebrarum scabritiem. Dof. ʒj. *Schrod.*

Tragium *v.* Androsæmum foetidum.

Tragorchis *v.* Orchis.

Tragopogon perenne, sive Scorzonera fol. angustis incanis, floribus dilutè purpureis. In insula ad Prom. Pachynum.

Tragos sive Uva marina major herbariorum *Lob.* Uva marina major *Ger.* Tragos sive Uva marina major *J. B.* Polygonum bacciferum maritimum majus *C. B.* In Sicilia prope *Punto Cerciolo*, ubi humanam altitudinem æquat. Polygonum bacciferum sive Uva marina major *Park.*

Tragos sive Uva marina minor *J. B.* Uva marina minor *Ger.* Polygonum bacciferum maritimum minus *C. B.* Polygonum bacciferum minus, sive Uva marina minor *Park.* In arenosis litoribus propè montem Ceti & Frontignanam, atque etiam in saxosis collibus vicinis.

Tribulus terrestris *J. B. Ger. Park.* terrest. ciceris folio, fructu aculeato *C. B.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi passim. Seriùs & sub Autumnum floret.

Trifolium bituminosum *Ger.* Asphaltites sive bituminosum *Park.* bitumen redolens *C. B.* Asphaltites sive bituminosum odoratum *J. B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi, in saxosis collibus non procul à mari.

Trifolium Alpinum argenteum *Park.* Alpinum argenteum, Perfici flore *C. B.* In præruptis altissimorum montium max. Carthusianorum cœnobio imminetium.

† Trifolium capitulis globosis sine pediculis caulibus adnatis. Circa Messanam Siciliæ metropolin alteram. Hanc speciem nuper invenimus in agro Suffolcienfi.

Trifolium cochleatum echinatum, peltatum, orbiculatum, &c. *v. Medica.*

Trifolium fragiferum sive vesicarium floribus nitidis rubellis. Circa Liburnum portum & alibi in Italia. Non longè ab- simile est, imò fortè idem Trifolio folliculaceo sive vesicario minori purpureo *J. B.*

Trifolium fruticans *v. Polemonium.*

Trifolium pratense album à Fuchsio depictum sive mas *J. B.* Alii Botanici speciem hanc cum Trifolio albo vulgari confundunt, à quo tamen diversissima est. Circa Genevam in pascuis & ad agrorum margines.

Trifolium stellatum *C. B.* stellatum Monspelienfium *Park.* stellatum purpureum Monspeffulanum *J. B.* Ad radices Vesuvii

Vesuvii montis copiosè ; nec minùs circa Messanà in Sicilia, & Monspelim in Gallia Narbonensi.

Trifolium annuum erectum capitulis è glumis acerosis conflatis. Hanc speciem in Regno Neapolitano ad maris litus collegi, cùm Messanà Neapolin redirem.

Trifolium minus *J. B. C. B. Park.* minus vulgare *Ger.* Ad mare propè Monspelim. Omnibus suis partibus nostrate minus est.

Tubera *J. B. Park.* Tuber *C. B.* Tuberæ terræ *Ger. Truffles.* Tartufali *the Italians call them.* Hæc quamvis è terra ipsi nunquam eruimus, quia tamen tum in Lombardia tum alibi in Italia & Gallia ex agris vicinis petita nobis in cibis apposita sunt, noluimus omittere. Sunt autem tubera magno hodie in pretio apud gulæ proceres, tum saporis gratiâ, tum maximè quòd Veneris incentiva sint.

N. Ratio seu modus quo (ut nobis relatum est) rustici tubera exquirunt, aut si vis venantur, perridiculus est ; Porcellum scilicet funiculo ad alterum pedem alligato præ se agunt in pascua ubi horum proventum esse nôrunt, qui ubi ad locum venit in quo tuber latitat, odore mox id percipit, rostróque è terra eruit, erutum qui insequuntur furripiunt, & ad alia indaganda porcellum abigunt.

Tussilago Alpina *Ger. emac.* Alpina minor folio rotundo *J. B.* II, five Alpina rotundifolia glabra *C. B.* Alpina folio glabro *Park.* In Alpibus Stiriacis primò, post in monte Jura eam invenimus.

Tussilago Alpina folio longo *J. B.* Alpina folio oblongo *Park.* IV, five Alpina folio oblongo *C. B.* In montis Juræ partibus altissimis *Thuri* & *Dole* dictis. Hæc planta Alismati Matthioli five Plantagini Alpinæ dictæ persimilis est, non tamen eadem, & ad *Doronica* potius quàm ad *Tussilagine*s referri debet.

Typha minor *J. B.* minima *Park.* palustris minor *C. B.* Hanc plantam in eodem loco in quo olim Lobelius, nimirum ad flu. *Arve* propè Genevam inveni. Cùm primò eam observavi perexigua fuit, clavâ gracili, unde minimè tum dubitavi quin distincta species esset : postea verò caput cylindraceum clavatum in tantam intumuit crassitiem, ut meritò dubitaverim, annon ipsius parvitas loco potius (siquidem extra aquam crevit) quàm plantæ naturæ imputanda esset.



## V

**V** Accaria Ger. v. Lychnis segetum rubra.  
Vaccinia v. Vitis Idæa.

Valeriana rubra Dodonæi Ger. Park. rubra C. B. latifolia rubra J. B. Ocymastrum Valerianthon Lob. Messanæ in muris antiquis: in Italiæ quoque locis plurimis è muris & saxis erumpit.

Valeriana rubra angustifolia C. B. J. B. Ubi J. Bauhinus eam invenit ibi & nos quoque, nimirum Nantux Sabaudorum, in colle extra portam quâ iter Lugdunum, ad dextram. Provenit quoque copiosè in rupibus montis Lupi.

Valeriana Mexicana Ger. Indica five Mexicana Park. peregrina seu Indica J. B. Valerianella echinata C. B. Circa Messanam Siciliæ copiosè.

Valeriana Alpina J. B. XI, five Alpina altera C. B. Alpina major five latifolia Park. In monte Salevæ supra Carthusianorum cœnobium.

Valeriana Alpina altera foliis integris, inodora, An Alpina prima C. B. ? In montibus circa Genevam copiosè.

Valeriana pumila supina serpyllifolia. In rupibus maritimis Regni Neapolitani. Ostensa mihi fuit postea Venetiis à Joanne Maria Ferro pharmacopœo botanico peritissimo, pro Caprifolio n. d. rectius tamen meo judicio ad Valerianas refertur.

Verbascum latis Salviæ foliis C. B. Matthioli Ger. sylv. salvifolium exoticum folio rotundiore J. B. Salvia fruticosa lutea latifolia, five Verbascum sylvestre quartum Matthioli Park. Circa Tauromenium in Sicilia.

Verbascum angusto Salviæ folio C. B. Ger. Monspeliense flore luteo hiantè J. B. Salvia fruticosa lutea angustifolia, five Phlomos lychnitis Dioscoridis Clusio Park. In collibus saxosis circa Monspelim.

Verbascum crispum & sinuatum J. B. laciniatum Park. nigrum VI, five nigrum folio Papaveris corniculati; & Cam. C. B.

In

In Italia ad vias passim. J. Bauhino circa Monspelium; nos illud ibi non observavimus.

Vermicularis v. Sedum.

Veronica saxatilis J. B. fruticans serpyllifolia Ger. fortè, Alpina frutescens C. B. malè, non enim fruticat hæc. minor Alpina Park. qui distinguit Alpinam suam minorem à Veronica fruticante. Pro Veronica min. Alpina ponit figuram fruticantis serpyllifoliæ Ger. proque fruticante sua aliam exhibet iconem: & meâ quidem sententiâ, rectè separat Veronicam fruticantem Clusii ab Alpina minima serpyllifolia Ponæ. Nostra hæc de qua agimus non omnino fruticat, sed exigua est & herbacea semper. Attende descriptionem J. B. In summis jugis montis Juræ circa Thuiri.

Veronica saxatilis parva caulibus nudis. In pascuis in summitate montis Juræ. An planta hæc à quoquam descripta sit mihi nondum est compertum.

Vicia sylvatica maxima Piso sylvestri similis. J. B. In sylvis in ascensu montis Salevæ, ab eo latere quod Genevam spectat.

Vicia seu Lathyrus gramineus flore coccineo. Ad radices montis Vesuvii non longè à mari: necnon circa Genevam inter segetes.

Vicia maritima multiflora alba Messanenſis. In Sicilia circa Messanam & alibi ad maris litus.

† Vicia luteo flore sylvestris J. B. Circa Liburnum & alibi in Italia inter segetes.

Victorialis longa Clus. Allium Alpinum J. B. Alpinum latifolium, seu Victorialis Ger. anguinum Park. IX, five montanum latifolium maculatum C. B. In summis jugis altissimorum montium max. Carthusianorum cœnobio proximorum & velut imminetium.

Vinca pervinca v. Clematis daphnoides.

Viola bulbosa v. Leucoium bulbosum.

Viola martia lutea Ger. Park. J. B. martia VII, five Alpina rotundifolia lutea C. B. In suprema parte montis Juræ circa Thuiri.

Viola lunaris longioribus filiquis Ger. lunaria III, five major filiquâ oblongâ C. B. Lunaria major filiquâ longiore J. B. In montibus Saleva & Jura, sed parcius.

Viola matronalis flore purpureo Ger. matronalis, five Hesperis hortensis C. B. Hesperis J. B. Cùm à Salerno Neapolin iter facerem, hanc in pratis observavi.

Vilnaga J. B. Matth. Lob. Vilnaga, Gingidium appellatum Park. Gingidium Hispanicum Ger. Gingid. umbellâ



## CATALOGUS STIRPIUM

bellâ longâ C. B. In pratis quibusdam non longè à *Miravalle*, secus viam quæ *Monipelio Frontignan*am ducit; copiosè etiam in *Etruriæ* agris, & circa *Cataniam* *Siciliæ*.

N. *Pediculi* seu *umbellarum radii* pro *dentiscalpiis* multis in usum veniunt, præcipuè *Hispanis*, ob rigiditatem suam & suaveolentiam: undè & nostratibus *Spanish Pick-tooth* appellatur.

*Vitex* v. *Agnus castus*.

*Vitis* *Idæa* foliis carnofis & velut punctatis, five *Idæa* radix *Dioscoridis* C. B. Radix *Idæa* putata, & *Uva* urfi J. B.

*Uva* urfi *Galen*i *Clusio* *Park*. *Vaccinia* urfi, five *Uva* urfi apud *Clusium* *Ger. emac*. In montibus *Saleve* & *Jura* *Genevæ* vicinis, itémque in colle *La Bassie*.

*Vitis* *Idæa* v. *Diospyros*.

*Ulmaria* major v. *Barba capræ*.

*Unifolium* v. *Monophyllum*.

*Uva* crispa *Ger. Dod. Lob. crispa*, five *Grossularia* J. B.

*Grossularia* vulgaris *Park*. *Grossularia* simplici acino, vel spinosa sylvestris C. B. Per totam *Helvetiam* in sepibus vulgarissima. In *Sicilia* studiose in hortis colitur, & pro planta rara, ostensa nobis fuit. Amat enim frigidos tractus; in calidioribus minùs frequens est.

N. *Uvæ* crispæ immaturæ refrigerant, undè febricitantibus & cholericis utiliter exhibentur, sitim sedant; astringunt quoque, unde ad omne ventris profluvium & hæmorrhagiam quancunque conducunt; *Urinam* insuper ciere, & calculo aut arenulis laborantibus prodesse dicuntur. *Saccharo* conditæ gratâ suâ aciditate appetentiam conciliant, & febriles ardores restinguunt. Concinantur & in placentas cupediarum & scitamentorum vicè; vulgò *Tartas* vocant.

*Uva* marina v. *Tragos*.

*Urfi* v. *Vitis* *Idæa*.



Xylen

---

X

**X** Ylon v. Gossipium.

Xeranthemum *J. B.* Jacea Oleæ folio, flore minore  
*C. B.* Ptarmica Imperati sive minor *Park.* Ptarmica Imperati. An Ptarmicæ Austriacæ species *Clus.?*  
*cur. post.* Geremac. ? Primò eam observavimus in *Arni*  
fluminis alveo propè Florentiam ; postea etiam circa Mont-  
pelium.

---

Z

**Z** Acyntha v. Cichorium verrucarium.

*Zea monococcus v. Briza.*

*Zizipha sylvestria J. B. Ziziphus sive Jujuba syl-*  
*vestris Park. Jujuba sylvestris C. B. In rupibus ad*  
*Tropiam Calabriae urbem copiosè.*

---



*Explicatio Nominum abbreviatorum.*

**A** D. & Ad. Lob. Adversaria Penæ & Lobelii.  
C. B. Caspari Bauhini Pinax.  
C. B. Prod. Caspari Bauhini Prodrromus.  
Cæs. Cæsalpinus.  
Cam. Camerarius.  
Cat. Ang. Catalogus Plantarum Angliæ.  
Clus. & Clus. hist. Caroli Clusii historia.  
Col. Fabius Columna.  
Dod. Dodonæus.  
Fuch. Leonardus Fuchsius.  
Ger. & Ger. emac. Jo. Gerardi historia emaculata à  
Tho. Johnson.  
Gesn. Conradus Gesnerus.  
Hort. Pat. Hortus Medicus Patavinus.  
J. B. Joannes Bauhinus Caspari frater.  
Lob. ob. Lobelius in Observationibus. Lob. ico.  
Idem in Iconibus à Plantino editis.  
Lon. Adamus Lonicerus.  
Lugd. Historia Lugdunensis.  
Matth. Matthiolus in Dioscoridem.  
Park. Jo. Parkinsoni Theatrum Botanicum.  
Park. parad. Ejusdem Paradisus terrestris seu Hortus.  
Schrod. Schroderus in Pharmacopœa Medico-chy-  
mica.  
Tab. Tabernæmontanus.  
Thal. Thalius in Hircynia.  
Trag. Hieronymi Tragi historia.

Nota hæc † cuicunque plantæ præfigitur indicat  
illam in Anglia sponte provenire.

F I N I S.